

# СЛУЖБЕНИ Гласник



РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

[www.sglasnik.com](http://www.sglasnik.com)

ISSN 0353-8389  
COBISS.SR-ID 17264898

Београд, 11. мај 2017.  
Година LXXIII – број 45

Цена овог броја је 414,94 динара  
Годишња претплата је 37.400 динара

## ПРАВИЛНИК

### О ЛИСТИ ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ПРОПИСУЈУ И ИЗДАЈУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА



Издавач ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“ Београд, Јована Ристића 1

Директор и главни и одговорни уредник др Јелена Триван

Уредник др Миодраг Ђорђевић

Технички уредник Игор Ђорђевић

Редакција 30-60-333; 30-60-334; 30-60-550

Огласи: правна лица 30-60-339; неважеће исправе 30-60-308; наплата огласа 30-60-538; факс 30-60-596; e-mail: [tender@sglasnik.com](mailto:tender@sglasnik.com)

Претплата 30-60-588 и 30-60-359; Продаја 30-60-578, факс 30-60-393

(ПИБ: СР100002782) (МАТИЧНИ БРОЈ: 07453710) (ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-14944-58)

(За директне и индиректне кориснике буџета 840-236723-96)

Штампа: ЈП „Службени гласник“, Штампарија „Гласник“, Лазаревачки друм 13–15

Copyright © ЈП Службени гласник, 2017

Свако умножавање и дистрибуција забрањена је. Сва права задржава ЈП „Службени гласник“ по Закону о ауторском и сродним правима и Закону о објављивању закона и других прописа и аката.



860014817043-14


## НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЕДИЦИЈА КОМЕНТАРИ

# КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Са судском праксом и регистром појмова

**Зоран Р. Томић**

**НОВО!**



ЦЕНА:  
2.970,00  
РСД

Ово издање представља коментар одредаба Закона о општем управном поступку, објављеног у „Службеном гласнику РС“, број 18 од 1. марта 2016. године.

Нови ЗУП усклађен је са уставним нормама и међународним стандардима, и његови основни циљеви су следећи: поједностављење и убрзање опште управне процедуре; осавремењивање процесних механизма ЗУП-а; делотворније задовољење јавног интереса и појединачних интереса грађана и правних лица у управним стварима – лакше и потпуније остварење и заштита како законитости, тако и слобода и права грађана у процесу непосредне примене прописа у целини управне материје и номотехничко побољшање и језичко поједностављивање при формулацији чланова и логичнија систематизација законских одредаба.

У односу на претходни ЗУП, у новом ЗУП-у налази се низ новина, од којих истичемо: знатно проширење процесног предмета ЗУП-а, који осим стандардног управног акта обухвата и управне уговоре, управне радње и пружање јавних услуга; увођење нових начела сразмерности, предвидивости и приступа подацима и заштите података; уређење комуникације између органа и странака у поступку (нпр. правила о електронском општењу), посебно обавештавања; успостављање нових правних средстава, попут жалбе код поступања другостепених органа и приговора; измењени и допуњени су посебни случајеви уклањања управних аката.

Аутор је и у овом издању, у много случајева, пружио системско тумачење одредаба ЗУП-а. Приликом коментарисања већине института конкретизоване су норме и упућује се на релевантну управносудску праксу. Осим тога, указано је и на низ спорних ситуација које се могу појавити у пракси.

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; [prodaja@slglasnik.com](mailto:prodaja@slglasnik.com) или on-line: [www.slglasnik.com](http://www.slglasnik.com) и [www.klubglasnik.net](http://www.klubglasnik.net)

# ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1669

На основу члана 43. став 3, члана 46. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – УС, 106/15 и 10/16 – др. закон),

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 27. марта 2017. године, донео је

## ПРАВИЛНИК

### о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

#### Члан 1.

Овим правилником утврђује се Листа лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (у даљем тексту: Листа лекова).

Листа лекова из става 1. овог члана одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

#### Члан 2.

Листу лекова из члана 1. став 1. овог правилника чине:

1) А. Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта (у даљем тексту: Листа А);

2) А1. Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи А (у даљем тексту: Листа А1);

3) Б. Лекови који се примењују у току амбулантног односно болничког лечења у здравственим установама (у даљем тексту: Листа Б);

4) Ц. Лекови са посебним режимом (у даљем тексту: Листа Ц);

5) Д. Лекови који немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији – нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета (у даљем тексту: Листа Д).

Лекови из става 1. овог члана разврстани су у групе према анатомско-терапијско-хемијској класификацији лекова (АТЦ) и то:

Листа А састоји се из 14 група лекова,

Листа А1 састоји се из 12 група лекова,

Листа Б састоји се из 12 група лекова,

Листа Ц састоји се из 4 групе лекова,

Листа Д састоји се из 14 група лекова.

#### Члан 3.

Листа А, Листа А1, Листа Б и Листа Ц садрже:

– следеће податке о леку:

- 1) шифра јединствене класификације лека – ЈКЛ,
- 2) шифра лека анатомско-терапијско-хемијска – АТЦ,
- 3) интернационално незаштићено име лека – ИНН,
- 4) заштићено име лека,
- 5) фармацеутски облик лека – ФО,
- 6) паковање и јачина лека,
- 7) назив произвођача лека,
- 8) држава производње лека,
- 9) цена лека на велико за паковање,
- 10) дефинисана дневна доза – ДДД,
- 11) цена лека на велико по ДДД,
- 12) партиципација осигураног лица,
- 13) индикација,
- 14) напомена;

– следеће податке о дијететском производу:

1) шифра (додељује Републички фонд за здравствено осигурање, у даљем тексту: Републички фонд),

2) шифра анатомско-терапијско-хемијска – АТЦ,

3) интернационално незаштићено име – ИНН,

4) заштићено име,

5) фармацеутски облик – ФО,

6) паковање и јачина,

7) назив произвођача,

8) држава производње,

9) цена на велико за паковање,

10) партиципација осигураног лица,

11) индикација,

12) напомена;

Листа Д садржи следеће податке о леку:

1) шифра лека (додељује Републички фонд),

2) шифра лека анатомско-терапијско-хемијска – АТЦ,

3) интернационално незаштићено име лека – ИНН,

4) фармацеутски облик лека – ФО,

5) јачина лека,

6) индикације.

#### Члан 4.

За одређене лекове са Листе лекова, утврђује се ограничење у прописивању у односу на:

1) медицинску дијагнозу утврђену у складу са Међународном класификацијом болести – Десета ревизија (МКБ-10);

2) мишљење лекара одговарајуће специјалности (које важи до наредне контроле код лекара специјалисте);

3) мишљење три лекара одговарајуће специјалности референтне здравствене установе (које важи до наредне контроле код тих лекара специјалиста у референтној здравственој установи);

4) мишљење надлежне стручне комисије Републичког фонда за одобравање употребе одређеног лека, коју образује и именује директор Републичког фонда (у даљем тексту: Комисија РФЗО);

5) број паковања лека који се могу прописати на један лекарски рецепт.

При увођењу новог лека у терапију, на један лекарски рецепт може се прописати највише једно паковање лека.

Изузетно од става 2. овог члана, за лекове из групе имуносупресивних лекова (АТЦ класификација: L04) на један лекарски рецепт може се прописати више од једног паковања лека.

#### Члан 5.

За лекове са Листе А, утврђује се партиципација коју плаћају осигурана лица у фиксном износу од 50 динара за сваку количину издатог лека која је једнака или мања од количине лека у паковању на Листи лекова.

За лекове са Листе А1, утврђује се партиципација у процентуалном износу од 10% до 90% од цене лека на мало, коју плаћају сва лица.

За ампулиране лекове са Листе Б, који се апликују у здравственим установама које обављају здравствену делатност на примарном нивоу, утврђује се партиципација у износу од 50 динара по једном налогу, коју плаћају осигурана лица.

За лекове са Листе А и Листе А1, који се користе у току болничког лечења, осигурана лица не плаћају партиципацију у фиксном и процентуалном износу.

За лекове са Листе Б, Листе Ц и Листе Д, Републички фонд обезбеђује средства у пуном износу од цене лека.

#### Члан 6.

За лекове са Листе лекова које је осигурано лице набавило у иностранству, у складу са општим актом Републичког фонда, утврђује се партиципација у износу од 20% од динарског износа цене лека по једном паковању.

#### Члан 7.

Партиципацију за лекове са Листе А и Листе Б из члана 5. ст. 1. и 3. овог правилника не плаћају:

1) ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата;

2) слепа лица и трајно непокретна лица, као и лица која остварују новчану накнаду за туђу помоћ и негу другог лица, у складу са законом;

3) деца, ученици и студенти до краја прописаног школовања, а најкасније до навршених 26 година живота;

4) жене у току трудноће, порођаја и 12 месеци после порођаја.

#### Члан 8.

Лекови са Листе А и Листе Б из члана 5. ст. 1. и 3. овог правилника обезбеђују се у пуном износу без плаћања партиципације:

1) привремено расељеним лицима са територије АП Косово и Метохија, којима је то својство утврдио надлежни републички орган;

2) осигураницима из члана 22. ст. 1. и 4. Закона о здравственом осигурању као и члановима уже породице осигураника из члана 22. став 1. тач. 7)–9) и 11) и став 4. Закона о здравственом осигурању;

3) осигураницима из чл. 17. и 23. Закона о здравственом осигурању као и члановима њихових породица, чији су приходи испод износа утврђених у складу са одредбама подзаконског акта којим је регулисан садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и партиципација.

#### Члан 9.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, бр. 65/15, 71/15 – исправка, 104/15, 24/16, 57/16, 61/16 – исправка, 78/16, 89/16, 101/16 и 11/17).

#### Члан 10.

Овај правилник, по добијању сагласности Владе, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим дела Правилника којим су утврђени лекови: NIFUROKSAZID ALKALOID (JKЛ 3126000), KREON 25000 (JKЛ 1121163), BISOPROLOL ATB (JKЛ 1107501 и JKЛ 1107502), AMLO-GAL (JKЛ 1402139 и JKЛ 1402142), AMLODIPIN SANDOZ (JKЛ 1402874 и JKЛ 1402876), LIZINOPRIL ATB (JKЛ 1103873 и JKЛ 1103874), EPRI (JKЛ 1104666, JKЛ 1104667 и JKЛ 1104668), AMOXI-CILLIN REMEDICA (JKЛ 1021912), CEFALEXIN REMEDICA (JKЛ 1321124), ZINNAT (JKЛ 1321956), ESBESUL (JKЛ 1026131), GILE-STRА (JKЛ 1328501), GILESTRA DUO (JKЛ 1328502), BLOKMAX ZA DECU (JKЛ 3162101), VICTANYL (JKЛ 9087205), LYRICA (JKЛ 1084742), PRAGIOLA (JKЛ 1084104, JKЛ 1084105, JKЛ 1084108, JKЛ 1084131, JKЛ 1084134 и JKЛ 1084143), ESCITALOPRAM SANDOZ (JKЛ 1072624 и JKЛ 1072626), ELICEA Q-TAB (JKЛ 1072007), SYMBICORT TURBOHALER (JKЛ 7114610), DUOESP SPIRO-MAX (JKЛ 7114714 и JKЛ 7114713), AMINOFILIN RETARD (JKЛ 1114293), XYZAL (JKЛ 1058047), PREMIUM UNIVERZAL MIX (N003939), GLUCOPHAGE XR (JKЛ 1043000), INDAPAMID SR ALKALOID (JKЛ 1103444), NEBIVOLOL SANDOZ (JKЛ 1107638), DIPILEN (JKЛ 1402847 и JKЛ 1402848), DUTANOR (JKЛ 1134311), OPRYMEA SR (JKЛ 1085054 и JKЛ 1085056), који се примењује по истеку 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника.

01/2 број 450-1391/17-2

У Београду, 27. марта 2017. године

**Управни одбор**  
**Републичког фонда за здравствено осигурање**

Председник,  
**Вања Мандић, с.р.**



Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje / Jacona leka	Naziv proizlascata leka	Drzava proizvođaje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2157101	A01AB08	amikazonol	DAKTANOL	oradni gel	suba, 1 po 40 g 2%	Celenta s.d.	Republika Srbija	244,10	0,2 g	61,03	50,00		
1029083	A01AB17	metronidazol	ORVAGIL D	film tableta	blistar, 20 po 400 mg	Galenika s.d.	Republika Srbija	225,40	2 g	56,35	50,00	1. Infekcije usne (puni paradentalni apsesi-K12.2 (gingivitis-K05).	
1129450	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezistentna kapsula, tvrd	blistar, 15 po 20 mg	Zdravje s.d.	Republika Srbija	238,20	20 mg	15,89	50,00	Zollinger-Ellisonov sindrom (trajno) (E16.9).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu psihosocijalnog nalaza
1122846	A02BC01	omeprazol	ORTANOL	gastrorezistentna kapsula, tvrd	blistar, 14 po 20 mg	Ušir d.o.o. u saradnji sa Saniboz Pharmaceuticals d.d.	Republika Srbija	222,30	20 mg	15,88	50,00	Zollinger-Ellisonov sindrom (trajno) (E16.9).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu psihosocijalnog nalaza
1122857	A02BC01	omeprazol	OMEPROZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrd	blistar, 14 po 20 mg	Remedica Ltd	Kipar	222,30	20 mg	15,88	50,00	Zollinger-Ellisonov sindrom (trajno) (E16.9).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu psihosocijalnog nalaza
1122835	A02BC01	omeprazol	OMEPROZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrd	boca, 15 po 20 mg	Hemofarm s.d.	Republika Srbija	238,20	20 mg	15,98	50,00	Zollinger-Ellisonov sindrom (trajno) (E16.9).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu psihosocijalnog nalaza
1122867	A02BC02	paniprazol	PANIPRAZOL	gastrorezistentna tableta	blistar, 14 po 40 mg	Zdravje s.d. Balkapharma Dupleks Adria LTD - Astra EHF	Republika Srbija	135,80	40 mg	9,70	50,00	Zollinger-Ellisonov sindrom (trajno) (E16.9).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu psihosocijalnog nalaza
1122820	A02BC02	paniprazol	NOLI PAZA	gastrorezistentna tableta	blistar, 14 po 40 mg	Kika, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	135,80	40 mg	9,70	50,00	Zollinger-Ellisonov sindrom (trajno) (E16.9).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu psihosocijalnog nalaza
1122821	A02BC02	paniprazol	NOLI PAZA	gastrorezistentna tableta	blistar, 28 po 40 mg	Kika, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	271,70	40 mg	9,70	50,00	Zollinger-Ellisonov sindrom (trajno) (E16.9).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu psihosocijalnog nalaza
1122180	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrd	blistar, 14 po 30 mg	Hemofarm s.d.	Republika Srbija	222,30	30 mg	16,89	50,00	Zollinger-Ellisonov sindrom (trajno) (E16.9).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu psihosocijalnog nalaza
1122181	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrd	blistar, 28 po 15 mg	Hemofarm s.d.	Republika Srbija	229,70	30 mg	16,41	50,00	Zollinger-Ellisonov sindrom (trajno) (E16.9).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu psihosocijalnog nalaza
1122859	A02BC06	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrd	blistar, 7 po 20 mg	Kika, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	121,10	30 mg	25,95	50,00	Zollinger-Ellisonov sindrom (trajno) (E16.9).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu psihosocijalnog nalaza

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastučen ime leka	FD	Pakovanje / jedinica leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućeg lica	Indikacija	Napomena
1122982	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastroprotektivna kapsula, tvrd	blistar, 14 po 20 mg	Kika, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	242,30	30 mg	25,96	50,00	Zollinger-Elisonov sindrom (E16.B)	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa i endokrinologa na osnovu rečnikobazirane i bazisa
1122981	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastroprotektivna kapsula, tvrd	blistar, 28 po 20 mg	Kika, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	484,60	30 mg	25,96	50,00	Zollinger-Elisonov sindrom (E16.B)	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa i endokrinologa na osnovu rečnikobazirane i bazisa
1122983	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastroprotektivna kapsula, tvrd	blistar, 7 po 40 mg	Kika, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	163,20	30 mg	17,49	50,00	Zollinger-Elisonov sindrom (E16.B)	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa i endokrinologa na osnovu rečnikobazirane i bazisa
1122984	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastroprotektivna kapsula, tvrd	blistar, 14 po 40 mg	Kika, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	326,20	30 mg	17,48	50,00	Zollinger-Elisonov sindrom (E16.B)	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa i endokrinologa na osnovu rečnikobazirane i bazisa
1122985	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastroprotektivna kapsula, tvrd	blistar, 28 po 40 mg	Kika, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	652,30	30 mg	17,47	50,00	Zollinger-Elisonov sindrom (E16.B)	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa i endokrinologa na osnovu rečnikobazirane i bazisa
1124301	A03FA01	metoklopramid	KLOMOTOL	tableta	blistar, 30 po 10 mg	Generis a.d.	Republika Srbija	145,00	30 mg	14,50	50,00		
3124300	A03FA01	metoklopramid	KLOMOTOL	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 100 ml (6 mg/6 ml)	Calenika a.d.	Republika Srbija	86,30	30 mg	25,89	50,00		
1124303	A03FA01	metoklopramid	REGLAU	tableta	blistar, 40 po 10 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa Smerck-Aventis, Francuska	Republika Makedonija	193,30	30 mg	14,50	50,00		
1124532	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	firm tableta	10 po 4 mg	Slavimed d.o.o.	Republika Srbija	975,00	16 mg	390,00	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radu i hemiterapiju	
1124534	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	firm tableta	10 po 8 mg	Slavimed d.o.o.	Republika Srbija	1.569,50	16 mg	313,90	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radu i hemiterapiju	
1124533	A04AA01	ondansetron	ONDA	firm tableta	blistar, 15 po 8 mg	Manek S.A. - Plant B	Grička	2.354,30	16 mg	313,91	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radu i hemiterapiju	
1124100	A04AA02	granisetron	RASETRON	firm tableta	blistar, 10 po 1 mg	Zdravte a.d., Activis LTD	Republika Srbija; Malt	2.283,30	2 mg	456,66	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radu i hemiterapiju	
1124104	A04AA02	granisetron	RASETRON	firm tableta	blistar, 5 po 2 mg	Zdravte a.d., Activis LTD	Republika Srbija; Malt	3.185,20	2 mg	633,04	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radu i hemiterapiju	



Lista A- lekovi koji se propisuju u izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Novi proizvođač leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
112717	A05AA02	ursodeoksikolina kislina	URSODIOL	kapsula, tvrd	blister, 100 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	2.379,90	0,75 g	71,31	50,00	1. Primarna biljna ciroza difuzivnog tipa u zadržanoj i stanoci koja obuhvata zdravstvenu opasnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologipatologa.
112718	A05AA02	ursodeoksikolina kislina	URSODIOL	kapsula, tvrd	blister, 50 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.188,50	0,75 g	71,31	50,00	1. Primarna biljna ciroza difuzivnog tipa u zadržanoj i stanoci koja obuhvata zdravstvenu opasnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologipatologa.
312750	A06AD11	laktuloza	PORTALAK	sirup	1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 30%	Bellupo Ljekovi i Kozmetika d.d.	Hrvatska	435,80	6,7 g	8,75	50,00	1. Potpoređenene encefalopatije (K72); 2. Prevencija terapija opstrukcije zadržana opasnostima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologipatologa.
312753	A06AD11	laktuloza	LAKTULOZA	sirup	boca, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	435,80	6,7 g	8,75	50,00	1. Potpoređene encefalopatije (K72); 2. Prevencija terapija opstrukcije zadržana opasnostima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologipatologa.
312830	A07AX03	infliksimab	ENTERCERYL	ovajna supozitorija	bočica, 1 po 90 ml (200 mg/5 ml)	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	247,50	600 mg	41,25	50,00	1. Primarna biljna ciroza difuzivnog tipa u zadržanoj i stanoci koja obuhvata zdravstvenu opasnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologipatologa.
312930	A07AX03	infliksimab	INFURIXASZID ALKALOID	ovajna supozitorija	boca sačiena, 1 po 90 ml (200mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Makedonija	247,50	600 mg	41,25	50,00	1. Primarna biljna ciroza difuzivnog tipa u zadržanoj i stanoci koja obuhvata zdravstvenu opasnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologipatologa.
112940	A07DA03	loperamid	LOPERAMID	tableta	blister, 20 po 2 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	120,80	10 mg	30,16	50,00	1. Primarna biljna ciroza difuzivnog tipa u zadržanoj i stanoci koja obuhvata zdravstvenu opasnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologipatologa.
112950	A07EA06	lufenonid	BUDOSAN	gastroenterostentna kapsula, tvrd	blister, 100 po 3 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	8.330,80	3 mg	273,82	50,00	1. Primarna biljna ciroza difuzivnog tipa u zadržanoj i stanoci koja obuhvata zdravstvenu opasnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi do 12 meseci u toku 12 meseci ili gastroenterologa, a u nastavak terapije po 12 meseci u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obuhvata zdravstvenu opasnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
112980	A07EC01	salisalazin	SALAZOPYRINLEN	gastroenterostentna tableta	boca plastina, 100 po 500 mg	Kemvel AB	Švedska	1.082,70	2 g	43,31	50,00	1. Primarna biljna ciroza difuzivnog tipa u zadržanoj i stanoci koja obuhvata zdravstvenu opasnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
112980	A07EC02	mesalazin	5-ASA	gastroenterostentna tableta	blister, 100 po 250 mg	Stavamed d.o.o.	Republika Srbija	934,90	1,5 g	68,09	50,00	1. Primarna biljna ciroza difuzivnog tipa u zadržanoj i stanoci koja obuhvata zdravstvenu opasnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
512980	A07EC02	mesalazin	5-ASA	supozitorija	blister, 30 po 250 mg	Stavamed d.o.o.	Republika Srbija	878,40	1,5 g	195,28	50,00	1. Primarna biljna ciroza difuzivnog tipa u zadržanoj i stanoci koja obuhvata zdravstvenu opasnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
112153	A09AA02	pankreatin	KREON 25.000	gastroenterostentna kapsula, tvrd	kontejner plastini, 20 po 300 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	604,40	4 kapsule	120,88	50,00	1. Poremećaji egzokrine funkcije pankreasa uzrokovani cirozom žučnog (E84)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili pulmonologa zdravstvene ustanove koja obuhvata zdravstvenu opasnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
112154	A09AA02	pankreatin	KREON 25.000	gastroenterostentna kapsula, tvrd	kontejner plastini, 50 po 300 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	1.511,00	4 kapsule	120,88	50,00	1. Poremećaji egzokrine funkcije pankreasa uzrokovani cirozom žučnog (E84)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili pulmonologa zdravstvene ustanove koja obuhvata zdravstvenu opasnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
1121155	A10AA02	pankreatin	KRECON 25 000	gastroenterološka kapsula, tvrd	konjerna plastika, 100 po 300 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	3.021,90	4 kapsule	120,88	50,00	1. Povećati egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (CF). 2. Stabilitetna pankreatična (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvantitativnim ili kvalitativnim ili odgovarajućim morfološkim i histološkim metodama, uz podržavanje pacijenta (ITM - 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zavisno od uzroka koji je uzrokovao pankreatičnu insuficijenciju. Lek se koristi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121153	A09AA02	pankreatin	KRECON 25000	gastroenterološka kapsula, tvrd	kulja, 20 po 300 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	694,40	4 kapsule	120,88	50,00	1. Povećati egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (CF). 2. Stabilitetna pankreatična (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvantitativnim ili kvalitativnim ili odgovarajućim morfološkim i histološkim metodama, uz podržavanje pacijenta (ITM - 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zavisno od uzroka koji je uzrokovao pankreatičnu insuficijenciju. Lek se koristi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121159	A09AA02	pankreas prašak	EUROBICOL 25 000	gastroenterološka kapsula, tvrd	bobica smeđena, 100 po (274, 05 - 329, 875 mg)	Laboratoires Mayoly Spindler	Francuska	3.021,90	4 kapsule	120,88	50,00	1. Povećati egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (CF). 2. Stabilitetna pankreatična (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvantitativnim ili kvalitativnim ili odgovarajućim morfološkim i histološkim metodama, uz podržavanje pacijenta (ITM - 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zavisno od uzroka koji je uzrokovao pankreatičnu insuficijenciju. Lek se koristi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121152	A09AA02	pankreatin	KRECON 10 000	gastroenterološka kapsula, tvrd	konjerna plastika, 100 po 150 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	1.192,20	6 kapsula	71,53	50,00	1. Povećati egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (CF). 2. Stabilitetna pankreatična (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvantitativnim ili kvalitativnim ili odgovarajućim morfološkim i histološkim metodama, uz podržavanje pacijenta (ITM - 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zavisno od uzroka koji je uzrokovao pankreatičnu insuficijenciju. Lek se koristi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
0041559	A10AB01	insulin humani	ACT RAPID PENFILL	rastvor za injekciju u ubušku	ubušak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Production S.A.S	Danska, Francuska	2.384,10	40 i.j.	63,04	50,00	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.	
0041425	A10AB01	insulin humani	HUMULIN R	rastvor za injekciju u ubušku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S., Eli Lilly and Co. S.P.A.	Francuska, Italija	2.384,10	40 i.j.	63,04	50,00	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.	
0041563	A10AB01	insulin humani	INSULIN RAPID SOLOSSTAR	rastvor za injekciju, pen sa ubuškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.384,10	40 i.j.	63,04	50,00	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.	





Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041507	A10AE04	insulin deglo	HUMALOG	rastvor za injekciju u bocku	uložak, 5 po 3 ml (100 IJ/ml)	Lilly France Eli Lilly SAS P.A.	Francuska, Njemačka	3,422.80	40 IJ	81.27	50.00		<p>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom glikemije na intenzivnoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikoziliran hemoglobin veći od 7%, HbA1c &gt; 7%) u koji se uvodi intenzivna terapija insulinom analogima (4-5 doza dnevno. Kombinacija bazalnog i brzo delujućeg insulina). Ova terapija treba biti uspostavljena u bolnici ili pod nadzorom stručnjaka. Ova terapija se koristi na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju nezadovoljavajućeg postprandijalnog hiperglikemije, glikemija veća od 10mmol/l, 2h posle obroka i povećane glikemijske varijabilnosti. Kombinacija se koristi za navedeni period od 6 meseci.</p> <p>Postprandijalna hiperglikemijata epizoda se uviđa na jeknu od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemije epizoda uzorkom uzetom za 1-2 sata nakon obroka;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemije epizoda uzorkom uzetom na osnovu loga sa lek. uvodi u terapiju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemije epizode uzorkom uzetom u kretanju pacijenta, odnosno specijalnim izveštajem na osnovu loga sa lek. uvodi u terapiju.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa i interniste i podataka koji je daju da u specijalističkom savetuju uvodi i dokumentuje napunjenost pregled bolesnika uslova za uvođenje ovog leka u terapiju</p>
0041532	A10AB06	insulin aspart	NOVO RAPID	rastvor za injekciju	bockov. 1 po 10 ml (100 IJ/ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	2,935.80	40 IJ	105.43	50.00		<p>Pacijenti na terapiji subkutano insulinom intenzivnom terapijom insulinske pumpe na osnovu mišljenja endokrinologa i interniste ili pedijatra</p>
0041527	A10AE06	insulin aspart	NOVO/CSAPID FLEXPEN	rastvor za injekciju	pen. se uložak, 5 po 3 ml (100 IJ/ml)	Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Production S.A.S	Danska, Francuska	3,758.30	40 IJ	100.25	50.00		<p>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom glikemije na intenzivnoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikoziliran hemoglobin veći od 7%, HbA1c &gt; 7%) u koji se uvodi intenzivna terapija insulinom analogima (4-5 doza dnevno. Kombinacija bazalnog i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim naponama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju nezadovoljavajućeg postprandijalnog hiperglikemije, glikemija veća od 10mmol/l, 2h posle obroka i povećane glikemijske varijabilnosti. Kombinacija se koristi za navedeni period od 6 meseci.</p> <p>Postprandijalna hiperglikemijata epizoda se uviđa na jeknu od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemije epizoda uzorkom uzetom za 1-2 sata nakon obroka;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemije epizode uzorkom uzetom na osnovu loga sa lek. uvodi u terapiju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemije epizode uzorkom uzetom u kretanju pacijenta, odnosno specijalnim izveštajem na osnovu loga sa lek. uvodi u terapiju.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa i interniste i podataka koji je daju da u specijalističkom savetuju uvodi i dokumentuje napunjenost pregled bolesnika uslova za uvođenje ovog leka u terapiju</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i jedinica leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041549	A10AD06	insulin glazin	APIDRA	rešor za injekciju	bočica 1 po 10 ml (100 j./ml)	SanoF-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.347,20	40 j.	93,89	50,00		Pacijenti na terapiji subkutanom insulinom izdaju se pomoću insulinske pumpe: na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra
0041556	A10AD06	insulin glazin	APIDRA SOLOSTAR	rešor za injekciju	pen sa ulaskom: 5 po 3 ml (100 j./ml)	SanoF-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	3.432,60	40 j.	91,27	50,00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom glikemije na inzulinskoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilni hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c > 7%) u koje se uvodi inzulinska terapija insulinim analogama 4-5 dana dnevno. Kombinacija kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg odnosa biološkog analoga, koji su uvedeni u terapiju u zavisnosti od njihove propisanih napomena ili za pacijente na terapiji dugodjelujućim, odnosno biološkim analogom kao dodatna terapija u slučaju nezadovoljavajućeg postavljanja analoga. Hiperglikemije: glikemija veća od 9 mmol/l, što može dovesti do potrebe za korekcijom od strane insulina i kombinacijom pacijenta u terapiji. Postoperativna hiperglikemijska epizoda se uteruje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postoperativne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatima za zametnoliku glikemije (memorija izlaza aparata) i verifikovan mlazom u katoru pacijenta, odnosno specijalnim brzoizlazačem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. - podatak o nivou glikemije u toku postoperativne hiperglikemijske epizode utvrđen u ventilovan i katoru pacijenta, odnosno specijalnim brzoizlazačem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalnom ovetstaju izvori i dokumentuje razmenom na pred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
0041557	A10AC01	insulin srednje delujućeg dejstva (humani izotini)	INSULINARD PENFILL	suspencija za injekciju u ulošku	(za NovoPen) 5 po 3 ml (100 j./ml)	Novo Nordisk AS/ Novo Nordisk Production S.A.S	Danska, Francuska	2.542,20	40 j.	87,79	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra
0041428	A10AC01	insulin humani	HUMULIN NPH	suspencija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 j./ml)	Uly France S.A.S; Eli Lilly S.P.A.	Francuska, Italija	2.542,20	40 j.	87,79	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra
0041564	A10AC01	humani insulin	INSULINARD BAZAL SOLOSTAR	suspencija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 j./ml)	SanoF-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.542,20	40 j.	87,79	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra
0041558	A10AD01	insulin humani	NOVOTARD 30 PENFILL	suspencija za injekciju u ulošku	(za NovoPen) 5 po 3 ml (100 j./ml)	Novo Nordisk AS/ Novo Nordisk Production S.A.S	Danska, Francuska	2.223,40	40 j.	69,29	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra
0041555	A10AD01	insulin humani	INSULINARD COMB 25 SOLOSTAR	suspencija za injekciju, pen sa uloškom	5 po 3 ml (100 j./ml)	SanoF-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.223,40	40 j.	59,29	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra
0041427	A10AD01	insulin humani	HUMULIN NM3	suspencija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 j./ml)	Uly France S.A.S; Eli Lilly S.P.A.	Francuska, Italija	2.223,40	40 j.	59,29	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra



Lista A-lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FO	Pakovanje i jacinma leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućica	Indikacija	Napomena
0041503	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 25	suspencija za injekciju u vensku	ubizak, 5 po 3 ml (100 i/jl i/ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska, Italija	3.469,90	40 i/j	92,53	50,00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom glikemije na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikovani hemoglobin veći od 7%, HbA1c &gt; 7%) u kojih postizanju povoljne pozadnjačine hiperglikemijske epizode uspeva od 50%. Za postizanje povoljne pozadnjačine hiperglikemijske epizode u toku poslednjih 6 meseci potrebno je uspostaviti kontrolu koncentracije insulina u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hiperglikemijska, odnosno postiznondijabeta hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hiperglikemijske, odnosno postiznondijabeta hiperglikemijske epizode uviden aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ključnog aparata), verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hiperglikemijske epizode uviden aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ključnog aparata), verifikovan nalaz u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste i predajeta koji je dužan da u specijalističkom izveštaju uvodi i dokumentaciju spornosti napred propisanih doza za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lekovi Humalog Mix 25 i Humalog Mix 25 KvikiPen mogu se koristiti kao alternativni humanim insulinima u prvih 12 terapijskih na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
0041504	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 50	suspencija za injekciju u vensku	ubizak, 5 po 3 ml (100 i/jl i/ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska, Italija	3.469,90	40 i/j	92,53	50,00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom glikemije na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikovani hemoglobin veći od 7%, HbA1c &gt; 7%) u kojih postizanju povoljne pozadnjačine hiperglikemijske epizode uspeva od 50%. Za postizanje povoljne pozadnjačine hiperglikemijske epizode u toku poslednjih 6 meseci potrebno je uspostaviti kontrolu koncentracije insulina u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hiperglikemijska, odnosno postiznondijabeta hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hiperglikemijske, odnosno postiznondijabeta hiperglikemijske epizode uviden aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ključnog aparata), verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hiperglikemijske epizode uviden aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ključnog aparata), verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste i predajeta koji je dužan da u specijalističkom izveštaju uvodi i dokumentaciju spornosti napred propisanih doza za uvođenje ovog leka u terapiju.</p>

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Značeno ime leka	FD	Pakovanje i jedna leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
00415.28	A1DA06	Insulin aspart	NOVOMIX 30 FLESPEN	suspenzija za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i/1 ml)	Novo Nordisk A/S i Novo Nordisk Production S.A.S	Danska, Francuska	3.759,30	40 j.	100,25	50,00		<p>1. Samo za pacijente sa nesloživojivom kontrolom glikemije na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilni hemoglobin veći od 7%, HbA1c &gt; 7%) u kojima postojaju pojedinačne pogoršane hiperglikemije (glikemija veća od 5 mmol/l, 2h posle obroka) ili povećane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i porodičnu anketnu korekciju doziranja insulina. Kompletan se pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemija epizoda se uvođe na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske, odnosno podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode u toku poslednjih 6 meseci (glikozilni hemoglobin veći od 7%, HbA1c &gt; 7%) u kojima postojaju pojedinačne pogoršane hiperglikemije (glikemija veća od 5 mmol/l, 2h posle obroka) ili povećane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i porodičnu anketnu korekciju doziranja insulina. Kompletan se pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</li> <li>- podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode u toku poslednjih 6 meseci (glikozilni hemoglobin veći od 7%, HbA1c &gt; 7%) u kojima postojaju pojedinačne pogoršane hiperglikemije (glikemija veća od 5 mmol/l, 2h posle obroka) ili povećane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i porodičnu anketnu korekciju doziranja insulina. Kompletan se pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</li> </ul> <p>2. Za lečenje dece se dijabetsom tip 1 lek se može koristiti kao alternativu humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
00415.55	A1DA04	Insulin glargin	LANTUS SCLIOSTAR	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i/1 ml)	Sanoil-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	5.212,40	40 j.	139,00	50,00		<p>Samo za pacijente sa nesloživojivom kontrolom dijabetisa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilni hemoglobin veći od 7%, HbA1c &gt; 7%) u kojima postojaju pojedinačne hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i porodičnu anketnu korekciju doziranja insulina i korijajmske pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijska epizoda se uvođe na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode u toku poslednjih 6 meseci (glikozilni hemoglobin veći od 7%, HbA1c &gt; 7%) u kojima postojaju pojedinačne pogoršane hiperglikemije (glikemija veća od 5 mmol/l, 2h posle obroka) ili povećane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i porodičnu anketnu korekciju doziranja insulina. Kompletan se pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</li> <li>- podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode u toku poslednjih 6 meseci (glikozilni hemoglobin veći od 7%, HbA1c &gt; 7%) u kojima postojaju pojedinačne pogoršane hiperglikemije (glikemija veća od 5 mmol/l, 2h posle obroka) ili povećane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i porodičnu anketnu korekciju doziranja insulina. Kompletan se pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</li> </ul> <p>2. Za lečenje dece se dijabetsom tip 1 lek se može koristiti kao alternativu humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>



Lista A-lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućica	Indikacija	Napomena
0041696	A10AED4	insulin glargin	TOUJEO	ostvori se injekciju u peni sa uloškom i peni sa uloškom	peni sa uloškom Solostar 3 po 1,5ml (300 IU/ml)	Sanoft-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	4.372,30	40 l.j.	129,55	50,00		<p>Samo za odrasle pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom glikozilacije na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikozilacija hemoglobina veći od 7%, HbA1c &gt; 7%), u koji periodički uvođene hipoglikemijske ( glikemija manja od 3,5 mmola/l ) i pored adekvatne korekcije obnavlja insulina i kontroliše se pacijenta u narednom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijske epizode se uvođe na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podstak o noću glikemije u toku hipoglikemijske epizode</li> <li>- podstak o noću glikemije u toku hipoglikemijske epizode uvođen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija i noćni aparat) i verifikovan nabazom u kratkom pacijenta, odnosno specializiranim na osnovu toga se lek uvođi u terapiju.</li> <li>- podstak o noću glikemije u toku hipoglikemijske epizode uvođen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći i ne službe u kojem se prisustvu događa hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju.</li> <li>- podstak o noću glikemije u toku hipoglikemijske epizode uvođen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta.</li> <li>- podstak o noću glikemije u toku hipoglikemijske epizode uvođen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvođi na osnovu merjenja endokrinologa ili infermista koji je dužan da u specifičnom izveštaju uvođi i dokumentuje primenost i napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p>
0041650	A10AE06	insulin detemir	LEVEMIR FLEXPEN	rastvor za injekciju	peni sa uloškom 5 po 3 ml (100 IU/ml)	Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Production S.A.S	Danska, Francuska	5.856,30	40 l.j.	156,17	50,00		<p>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom glikozilacije na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikozilacija hemoglobina veći od 7%, HbA1c &gt; 7%), u koji periodički uvođene hipoglikemijske ( glikemija manja od 3,5 mmola/l ) i pored adekvatne korekcije obnavlja insulina i kontroliše se pacijenta u narednom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijske epizode se uvođe na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podstak o noću glikemije u toku hipoglikemijske epizode uvođen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija i noćni aparat) i verifikovan nabazom u kratkom pacijenta, odnosno specializiranim na osnovu toga se lek uvođi u terapiju.</li> <li>- podstak o noću glikemije u toku hipoglikemijske epizode uvođen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći i ne službe u kojem se prisustvu događa hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju.</li> <li>- podstak o noću glikemije u toku hipoglikemijske epizode uvođen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specializiranim izveštaju na osnovu toga se lek uvođi u terapiju.</li> <li>- podstak o noću glikemije u toku hipoglikemijske epizode uvođen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specializiranim izveštaju na osnovu toga se lek uvođi u terapiju.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvođi na osnovu merjenja endokrinologa ili infermista koji je dužan da u specifičnom izveštaju uvođi i dokumentuje primenost i napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p>
1043060	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	firm tableta	blister: 30 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	80,90	2 g	10,79	50,00		
1043062	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	firm tableta	blister: 30 po 1000 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	124,50	2 g	8,90	50,00		
1043070	A10BA02	metformin	TEFOR	firm tableta	blister: 30 po 500 mg	Calentia a.d.	Republika Srbija	80,90	2 g	10,79	50,00		
1043071	A10BA02	metformin	TEFOR	firm tableta	teglja: 30 po 850 mg	Calentia a.d.	Republika Srbija	99,90	2 g	7,59	50,00		

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / jacinje leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Meroprema
1043107	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	30 po 1000 mg	Merck S.L., Merck KGaA, Merck KGaA & Co. WIERK SPIRITUAL, Parnar Lyon	Francuska, Španija, Nemačka, Austrija, Francuska	124.50	2 g	8.30	50.00		
1043116	A10BA02	metformin	METFOODIAB	film tableta	blistar, 30 po 500 mg	Zdravlje a.d. Aravis UK Limited, Balkanpharma-Dupnitsa Dupnitsa ad	Republika Srbija, Velika Britanija, Bugarska	80.90	2 g	10.79	50.00		
1043117	A10BA02	metformin	METFOODIAB	film tableta	blistar, 30 po 1000 mg	Zdravlje a.d. Balkanpharma-Dupnitsa ad	Republika Srbija, Bugarska	124.50	2 g	8.30	50.00		
1042332	A10BB01	glibenklamid	MANNIL 3.5	tableta	blistar, 30 po 3.5 mg	Berlin-Chemie (Menarini group)	Nemačka	97.40	7 mg	6.49	50.00		
1042076	A10BB09	gliklazid	GLIKOSAN	tableta	blistar, 30 po 80 mg	Solvamed d.o.o.	Republika Srbija	181.90	60 mg	4.55	50.00		
1042070	A10BB09	gliklazid	GLIDRAL	tableta	blistar, 30 po 80 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	191.90	60 mg	4.65	50.00		
1042065	A10BB09	gliklazid	CIPRIAN	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blistar, 30 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	181.90	60 mg	4.55	50.00		
1042311	A10BB12	glinapeptid	AMARYL	tableta	blistar, 30 po 2 mg	Sancofi Winthrop Industrie, Sancofi S.P.A.	Francuska, Italija	81.40	2 mg	2.71	50.00		
1042312	A10BB12	glinapeptid	AMARYL	tableta	blistar, 30 po 3 mg	Sancofi Winthrop Industrie, Sancofi S.P.A.	Francuska, Italija	137.00	2 mg	3.04	50.00		
1042313	A10BB12	glinapeptid	AMARYL	tableta	blistar, 30 po 4 mg	Sancofi Winthrop Industrie, Sancofi S.P.A.	Francuska, Italija	152.20	2 mg	2.54	50.00		
1042830	A10BB12	glinapeptid	LIMERAL	tableta	blistar, 30 po 1 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	104.40	2 mg	6.96	50.00		
1042831	A10BB12	glinapeptid	LIMERAL	tableta	blistar, 30 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	81.40	2 mg	2.71	50.00		
1042832	A10BB12	glinapeptid	LIMERAL	tableta	blistar, 30 po 3 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	137.00	2 mg	3.04	50.00		
1042833	A10BB12	glinapeptid	LIMERAL	tableta	blistar, 30 po 4 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	152.20	2 mg	2.54	50.00		
1042834	A10BB12	glinapeptid	LIMERAL	tableta	blistar, 30 po 6 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	376.60	2 mg	4.19	50.00		
1042000	A10BB12	glinapeptid	MEGLIMID	tableta	blistar, 30 po 1 mg	Kika Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	104.40	2 mg	6.96	50.00		
1042001	A10BB12	glinapeptid	MEGLIMID	tableta	blistar, 30 po 2 mg	Kika Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	81.40	2 mg	2.71	50.00		
1042004	A10BB12	glinapeptid	MEGLIMID	tableta	blistar, 30 po 3 mg	Kika Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	137.00	2 mg	3.04	50.00		



Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1042003	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID	tableta	blistar, 30 po 4 mg	Kika Tovarna Zdravi d.d	Slovenija	152,20	2 mg	2,54	50,00		
1042314	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	tableta	blistar, 30 po 1 mg	Борнафтек D.D.	Bosna i Hercegovina	104,40	2 mg	6,98	50,00		
1042315	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	tableta	blistar, 30 po 2 mg	Борнафтек D.D.	Bosna i Hercegovina	81,40	2 mg	2,71	50,00		
1042316	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	tableta	blistar, 30 po 3 mg	Борнафтек D.D.	Bosna i Hercegovina	137,00	2 mg	3,04	50,00		
2055087	A11CC06	hoksidifenol	VICANTOL LIJE	ovakni žep	bočica, 1 po 10 ml (20000 L) ml	Merck KGaA	Nemacka	132,80	20mca	0,53	50,00		
1052075	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIJUM KARBONAT ALKALOID	tableta	kegla, 50 po 1 g	Alembid a.d.	Republika Makedonija	351,20	3 g	21,07	50,00		
2055247	A12BA01	kalcijum-bisod	KALI CHLORIDI	ovakni prašak	keca, 10 po 1g	Ufar d.o.o.	Republika Srbija	124,80	3g	37,44	50,00		Uz diuretike Henlelove petlje nakon bolničkog lečenja, na osnovu mišljenja o odgovornosti i kod presedivosti ili konzultacije na specijalitetu
1083115	B01AA03	varfarin	FARRIN	tableta	blistar, 30 po 5 mg	Calentia a.d.	Republika Srbija	116,90	7,5 mg	6,86	50,00		
1082000	B01AC05	lileksidin	TKLLODIX	8 m tableta	blistar, 30 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	248,70	0,5 g	19,58	50,00		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugaljnu stenta (i) grata, a obaveza zdravstvene ustanove na sekucijomom i tokcijomomiku, završavanje zebite, za period od 12 meseci nepovratno podle upravljanje stenta (i) grata. Lek se koristi u terapiji sekundarnog prevencije kod osoba koje imaju obimnu koronarnu aterosklerozu, a na osnovu mišljenja lekarskog istraživača ili neurologičarskooboljavanja.
3085073	B03AB05	gvozdje (iii) hidroksid polimekani kompleks	FERRUM SANDOZ	sirup	1 po 100 ml (50 mg/5 ml)	Lek farmaceutička družba d.d. u saradnji sa Vifor Inc. Švajcarska	Slovenija	240,40	80 mg	21,64	50,00		
3085072	B03AB05	gvozdje (iii) hidroksid polimekani kompleks	REFERUM	sirup	boca staklena, 100 ml (50 mg/5 ml)	Stavamed d.o.o.	Republika Srbija	240,40	80 mg	21,64	50,00		
3085074	B03AB05	gvozdje (iii) hidroksid polimekani kompleks	REFERUM	sirup	boca staklena, 100 ml (100 mg/5 ml)	Stavamed d.o.o.	Republika Srbija	435,50	80 mg	24,10	50,00		
3085050	B03AB09	gvozdje (iii)- proteinatski kompleks	LEGOFER	ovakni rastvor	boca staklena, 1 po 150 ml (90 mg/15 ml)	Alembid a.d. u saradnji sa Italfarmaco S.p.A. Italija	Republika Makedonija	287,90	-	-	50,00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
1105140	B03BB01	beta metasolin	FOLINAK	tableta	komipnjar za tablete, 20 po 5 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	119,20	0,4 mg	0,48	50,00		Lek se u terapiji uvodi na osnovu pražnjenja nitemiste u ginekologiji.
1081050	B03BB01	beta metasolin	FOLINACN	tableta	blister, 20 po 5 mg	JCL D.O.O. BEČERAD-SIPOCI	Republika Srbija	119,20	0,4 mg	0,48	50,00		Lek se u terapiji uvodi na osnovu pražnjenja nitemiste u ginekologiji.
1081021	B03BB01	beta metasolin	FOLIKUS	tableta	blister, 20 po 5 mg	Ave Pharmaceuticals d.o.o.	Republika Srbija	119,20	0,4 mg	0,48	50,00		Lek se u terapiji uvodi na osnovu pražnjenja nitemiste u ginekologiji.
1102252	C01AA05	digoxin	DILACOR	tableta	blister, 20 po 0,25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	83,70	0,25 mg	4,19	50,00		
1101130	C01BC02	propratenon	PROPAFEBI	flm tableta	blister, 50 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	324,50	0,3 g	12,98	50,00		Lek se u terapiji uvodi na osnovu pražnjenja nitemiste u kardologiji.
1101131	C01BC03	propafenon	PROPAFEBI	flm tableta	blister, 50 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	701,00	0,3 g	14,03	50,00		Lek se u terapiji uvodi na osnovu pražnjenja nitemiste u kardologiji.
1101140	C01BD01	amiodaron	AMIODARON	tableta	blister, 60 po 200 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	996,60	0,2 g	9,48	50,00		Lek se u terapiji uvodi na osnovu pražnjenja nitemiste u kardologiji.
1101140	C01BD01	amiodaron	SEDACORON	tableta	blister, 60 po 200 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemacka	473,80	0,2 g	9,48	50,00		Lek se u terapiji uvodi na osnovu pražnjenja nitemiste u kardologiji.
1101254	C01BD01	amiodaron	CORADARONE	tableta	blister, 30 po 200 mg	Sanoel Winthrop Industrie	Francuska	284,30	0,2 g	9,48	50,00		Lek se u terapiji uvodi na osnovu pražnjenja nitemiste u kardologiji.
1102101	C01DA02	glicerinolnitrat	NITROGLUCERIN	sublingvalna tableta	bocka, staklena, 40 po 0,5 mg	Jakec BD, Beograd a.d.	Republika Makedonija	134,80	2,5 mg	18,83	50,00		
1102060	C01DA08	isosorbid dinitrat	ISOSORB RETARD	kapulula sa procajenim odelobitajem, tvrd	blister, 60 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	226,00	60 mg	11,30	50,00		
1102082	C01DA06	isosorbid dinitrat	CORNILAT	tableta	blister, 20 po 20 mg	Calentia a.d.	Republika Srbija	81,00	60 mg	12,15	50,00		
1102150	C01DA14	isosorbid mononitrat	MONIZOL	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	116,60	40 mg	7,77	50,00		
1102152	C01DA14	isosorbid mononitrat	MONIZOL	tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	189,40	40 mg	6,31	50,00		
1102202	C01DA14	isosorbid mononitrat	MONOSAN	tableta	blister, 30 po 20 mg	Slovenski d.o.o.	Republika Srbija	116,60	40 mg	7,77	50,00		
1102200	C01DA14	isosorbid mononitrat	MONOSAN	tableta	blister, 30 po 40 mg	Stuudamed d.o.o.	Republika Srbija	189,40	40 mg	6,31	50,00		
1102171	C01DA14	isosorbid mononitrat	ISOCARD	tableta sa procajenim odelobitajem	blister, 60 po 80 mg	Belupo lekovi, kozaubak a.d.	Hrvatska	740,50	40mg	8,87	50,00		



Lista A- lekovi koji se propisuju u izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastareno ime leka	FO	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1102522	C01DX12	molsidomin	LOPION FORTE	tableta	blistar, 30 po 4 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	183,80			50,00	Angina pektoris koja ne reaguje na uobičajeno doziranje nifedipina.	
1102520	C01DX12	molsidomin	LOPION	tablete	blistar, 30 po 2mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	127,80			50,00		
1102521	C01DX12	molsidomin	LOPION RETARD	tableta sa produženim oslobađanjem	blistar, 20 po 6 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	282,80			50,00	Teška ozbiljna angina pektoris koja ne reaguje na uobičajene doze nifedipina	
1103432	C02AB02	metildopa (metemet)	METHYLDOPA	8m tableta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	172,00	2 g	68,80	50,00	Hipertenzija u trudnoći (O11, O13, O15).	Lek se u terapiji koristi na osnovu mišljenja vinterniste i karakologa # ginekologa.
1103811	C02KX01	bosentan	TRACLEER	8m tableta	blistar, 56 po 125mg	Aziolan Pharmaceuticals LTD	Švajcarska	163.234,80	0,25 g	5.831,96	50,00	Pužna arterijska hipertenzija uzročena sa kongenitalnim sistemom pulmonalnim krvotom i Escherichovom fibrozijom (I27.8).	Samoznači lek, se koristi u terapiji na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane usklade tendencijom rasta zadržavane zadržite.
1400410	C03AA03	hidrotolazid	DNINORM	tableta	blistar, 20 po 25 mg	Savamed d.o.o.	Republika Srbija	106,20	25 mg	6,28	50,00		
1400442	C03CA01	furosemid	LASIX	8m tableta	blistar, 12 po 40 mg	Sanoel-Veritrop Industrie	Francuska	68,50	40 mg	4,96	50,00	Terapija starije koja se karakteriše retencijom tečnosti i zadržavanjem blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapije ili kao adjuvantna terapija.	
1400473	C03CA01	furosemid	BELUPO	tableta	blistar, 20 po 40 mg	Bekupo Lijekovi Kozmetika d.d.	Hrvatska	99,10	40 mg	4,96	50,00	Terapija starije koja se karakteriše retencijom tečnosti i zadržavanjem blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapije ili kao adjuvantna terapija.	
1400541	C05CA05	bumetanid	BURNEX	tableta	blistar, 20 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	214,40	1 mg	10,67	50,00		
1400440	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	tableta	blistar, 40 po 25 mg	Galentia a.d.	Republika Srbija	288,10	75 mg	22,43	50,00		
1400441	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	tableta	blistar, 30 po 100 mg	Galentia a.d.	Republika Srbija	576,30	75 mg	14,41	80,00		
1401290	C03EA...	mekkizamid, ambard	LOMETAZID	tableta	blistar, 30 po 5 mg +10 mg	Galentia a.d.	Republika Srbija	146,60	1 tableta	4,96	50,00		
1400400	C03EA01	ambard	HEMOPRES	tableta	blistar, 40 po 50 mg + 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	178,80	1 tableta	4,42	50,00		
1107182	C07AA05	propranolol	PROPRANOLOL	tableta	50 po 40 mg	Galentia a.d.	Republika Srbija	135,70	0,16 g	10,86	50,00		
1107095	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	8m tableta	blistar, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	156,80	0,15 g	7,84	50,00		
1107750	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	8m tableta	blistar, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	76,70	0,15 g	8,11	50,00		
1107751	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	8m tableta	blistar, 66 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	151,40	0,15 g	8,11	50,00		
1107580	C07AB02	metoprolol	CORVITOL 50	tableta	blistar, 30 po 50 mg	Berlin-Chemie AG	Nemacka	81,10	0,15 g	8,11	50,00		
1107582	C07AB02	metoprolol	CORVITOL 100	tableta	blistar, 30 po 100 mg	Berlin-Chemie AG	Nemacka	156,80	0,15 g	7,84	50,00		
1107170	C07AB03	atenolol	PRINORM	tableta	14 po 100 mg	Galentia a.d.	Republika Srbija	89,10	75 mg	6,31	50,00		
1107550	C07AB03	atenolol	ATENOLOL	tableta	14 po 100 mg	Jugovmedija a.d.	Republika Srbija	99,10	75 mg	6,31	50,00		

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućeg lica	Indikacija	Meroprema
1107552	C07AB03	atenolol	ATENOLOL	tableta	blistar, 20 po 50 mg	Jugonemesta a.d.	Republika Srbija	78,80	75 mg	5,51	50,00		
1107500	C07AB03	atenolol	ATENOLOL	tableta	blistar, 14 po 100 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	98,10	75 mg	5,31	50,00		
1107042	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blistar, 30 po 2,5 mg	PharmAS d.o.o.	Republika Srbija	102,80	10 mg	13,68	50,00		
1107020	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blistar, 30 po 5 mg	PharmAS d.o.o.	Republika Srbija	145,90	10 mg	9,73	50,00		
1107021	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blistar, 30 po 10 mg	PharmAS d.o.o.	Republika Srbija	254,30	10 mg	8,48	50,00		
1107023	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	firm tableta	blistar, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	145,90	10 mg	9,73	50,00		
1107022	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	firm tableta	blistar, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	254,30	10 mg	8,48	50,00		
1107026	C07AB07	bisoprolol	BYOL	firm tableta	blistar, 30 po 5 mg	Ufri d.o.o. u saradnji sa Smedez Pharmaceuticals d.d. Slovenija	Republika Srbija	102,80	10 mg	13,68	50,00		
1107027	C07AB07	bisoprolol	BYOL	firm tableta	blistar, 30 po 5 mg	Ufri d.o.o. u saradnji sa Smedez Pharmaceuticals d.d. Slovenija	Republika Srbija	145,90	10 mg	9,73	50,00		
1107025	C07AB07	bisoprolol	BYOL	firm tableta	blistar, 30 po 10 mg	Ufri d.o.o. u saradnji sa Smedez Pharmaceuticals d.d. Slovenija	Republika Srbija	254,30	10 mg	8,48	50,00		
1107035	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	firm tableta	blistar, 30 po 2,5 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	102,80	10 mg	13,68	50,00		
1107036	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	firm tableta	blistar, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	145,90	10 mg	9,73	50,00		
1107037	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	firm tableta	blistar, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	254,30	10 mg	8,48	50,00		
1107041	C07AB07	bisoprolol	BILKORFD	tableta	blistar, 30 po 5 mg	Niche Generics Limited	Irska	145,90	10 mg	9,73	50,00		
1107040	C07AB07	bisoprolol	BILKORFD	tableta	blistar, 30 po 10 mg	Niche Generics Limited	Irska	254,30	10 mg	8,48	50,00		
1107046	C07AB07	bisoprolol	BISPROL	firm tableta	blistar, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	145,90	10 mg	9,73	50,00		
1107049	C07AB07	bisoprolol	BISPROL	firm tableta	blistar, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	254,30	10 mg	9,48	50,00		
1107005	C07AB07	bisoprolol	CONCOR COR	firm tableta	blistar, 30 po 1,25mg	Merck S.L. Merck KGaA & Co. MERK SPITTL. Merck KGaA, Austrija/Nemacka	Španija	201,30	10 mg	53,68	50,00		
1107050	C07AB07	bisoprolol	SCBYCOR	firm tableta	30 po 2,5mg	Kita tovarna Zdravje d.d.	Slovenija	102,80	10 mg	13,68	50,00		
1107051	C07AB07	bisoprolol	SCBYCOR	firm tableta	30 po 5mg	Kita tovarna Zdravje d.d.	Slovenija	145,90	10 mg	9,73	50,00		
1107052	C07AB07	bisoprolol	SCBYCOR	firm tableta	30 po 10mg	Kita tovarna Zdravje d.d.	Slovenija	254,30	10 mg	8,48	50,00		
1107501	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ATE	firm tableta	blistar, 30 po 5 mg	S.C. Ambicrete S.A.	Rumunija	145,90	10 mg	9,73	50,00		



Lista A. Lekovi koji se propisuju u izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1107502	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ATB	firm tableta	blistar, 30 po 10 mg	S.C. Andrićke S.A.	Rumunija	254,30	10 mg	8,48	50,00		
1107525	C07AG02	karvedilol	KARVILEKS	tableta	blistar, 30 po 12,5 mg	Zdravka a.d.	Republika Srbija	138,90	37,5 mg	13,89	50,00	Srčana insuficijencija (ISB)	Lek se vodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107559	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tablete	blistar, 30 po 12,5 mg	Hemofarm A.D.	Republika Srbija	138,90	37,5 mg	13,89	50,00	Srčana insuficijencija (ISB)	Lek se vodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107559	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blistar, 30 po 25 mg	Hemofarm A.D.	Republika Srbija	214,10	37,5 mg	10,71	50,00	Srčana insuficijencija (ISB)	Lek se vodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107673	C07AG02	karvedilol	CORVOL	tableta	blistar, 28 po 6,25 mg	Kika Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	162,40	37,5 mg	34,80	50,00	Srčana insuficijencija (ISB)	Lek se vodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107675	C07AG02	karvedilol	CORVOL	tablete	blistar, 28 po 12,5 mg	Kika Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	128,90	37,5 mg	13,89	50,00	Srčana insuficijencija (ISB)	Lek se vodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107833	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blistar, 30 po 12,5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	138,90	37,5 mg	13,89	50,00	Srčana insuficijencija (ISB)	Lek se vodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107834	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blistar, 30 po 25 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	214,10	37,5 mg	10,71	50,00	Srčana insuficijencija (ISB)	Lek se vodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107828	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	tableta	blistar, 28 po 6,25 mg	Pika Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	162,40	37,5 mg	34,80	50,00	Srčana insuficijencija (ISB)	Lek se vodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107828	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	tableta	blistar, 28 po 12,5 mg	Pika Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	128,90	37,5 mg	13,89	50,00	Srčana insuficijencija (ISB)	Lek se vodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107827	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	tablete	blistar, 28 po 25 mg	Pika Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	198,90	37,5 mg	10,71	50,00	Srčana insuficijencija (ISB)	Lek se vodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107824	C07BB07	bisoprolol hidrohlorid	TENSEC plus	firm tableta	blistar, 30 po 15 mg + 12,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	198,90	1 tableta	6,32	50,00	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (IH); u velikoj se meri koristi za lečenje podjednakoim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, prilikom nedovoljno efekata.	
1402140	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tablete	blistar, 20 po 5 mg	Celentica a.d.	Republika Srbija	51,30	5 mg	2,57	50,00	1. Arterijska hipertenzija (IH); 2. Arterijska hipertenzija (IH); 111; 112; 113; 115 )	
1402141	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blistar, 20 po 10 mg	Celentica a.d.	Republika Srbija	62,10	5 mg	1,55	50,00	1. Arterijska hipertenzija (IH); 111; 112; 113; 115 ) 2. Arterijska hipertenzija (IH); 111; 112; 113; 115 )	
1402138	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tablete	blistar, 30 po 5 mg	Celentica a.d. Beograd	Republika Srbija	77,00	5 mg	2,57	50,00	1. Arterijska hipertenzija (IH); 2. Arterijska hipertenzija (IH); 111; 112; 113; 115 )	
1402142	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blistar, 30 po 10 mg	Celentica a.d. Beograd	Republika Srbija	93,20	5 mg	1,55	50,00	1. Arterijska hipertenzija (IH); 2. Arterijska hipertenzija (IH); 111; 112; 113; 115 )	

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućih lica	Indikacija	Markovana
1402146	C09CA01	ambodipin	AMLODIPIN	tableta	blistar, 20 po 5 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	51,30	5 mg	2,57	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402147	C09CA01	ambodipin	AMLODIPIN	tableta	blistar, 20 po 10 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	69,10	5 mg	1,55	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402950	C09CA01	ambodipin	AMLODIPIN	tableta	blistar, 30 po 5 mg	M.D. Novi d.o.o.	Republika Srbija	77,00	5 mg	2,57	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402951	C09CA01	ambodipin	AMLODIPIN	tableta	blistar, 30 po 10 mg	M.D. Novi d.o.o.	Republika Srbija	93,20	5 mg	1,55	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402962	C09CA01	ambodipin	AMLODIPIN	tableta	blistar, 20 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	51,30	5 mg	2,57	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402966	C09CA01	ambodipin	AMLODIPIN ALKALOID	tableta	blistar, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	77,00	5 mg	2,57	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402933	C09CA01	ambodipin	AMLODIPIN ALKALOID	tableta	blistar, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	93,20	5 mg	1,55	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402952	C09CA01	ambodipin	TENOX	tableta	blistar, 30 po 5 mg	Kriha Tovarna Zdrav d.d.	Slovenija	77,00	5 mg	2,57	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402953	C09CA01	ambodipin	TENOX	tableta	blistar, 30 po 10 mg	Kriha Tovarna Zdrav d.d.	Slovenija	93,20	5 mg	1,55	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402900	C09CA01	ambodipin	CARDIPINE	tableta	blistar, 20 po 5 mg	Ave Pharmaceuticals d.o.o.	Republika Srbija	51,30	5 mg	2,57	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402001	C09CA01	ambodipin	CARDIPINE	tableta	blistar, 20 po 10 mg	Ave Pharmaceuticals d.o.o.	Republika Srbija	62,10	5 mg	1,55	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402966	C09CA01	ambodipin	CARDIPINE	tableta	blistar, 30 po 5 mg	Ave Pharmaceuticals d.o.o.	Republika Srbija	77,00	5 mg	2,57	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402902	C09CA01	ambodipin	CARDIPINE	tableta	blistar, 30 po 10 mg	Ave Pharmaceuticals d.o.o.	Republika Srbija	93,20	5 mg	1,55	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402976	C09CA01	ambodipin	VAZOTAL	tableta	blistar, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	77,00	5 mg	2,57	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402977	C09CA01	ambodipin	VAZOTAL	tableta	blistar, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	93,20	5 mg	1,55	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402974	C09CA01	ambodipin	AMLODIPIN SANDOZ	tableta	blistar, 30 po 5 mg	Lek. Farmaceutika Društvo d.d.	Slovenija	77,00	5 mg	2,57	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402975	C09CA01	ambodipin	AMLODIPIN SANDOZ	tableta	blistar, 30 po 10 mg	Lek. Farmaceutika Društvo d.d.	Slovenija	93,20	5 mg	1,55	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402481	C09CA06	infedipin	NIFEDIPIN	tableta sa probavnom obojavanjem	blistar, 30 po 20 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	170,20	30 mg	8,51	50,00	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402703	C09DA01	verapamil	VERAPAMIL	8/m tableta	blistar, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	69,50	0,24 g	13,90	50,00		

Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FO	Pakovanje / jačina leka	Način proizvodnje leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Način davanja
1402704	C09DA01	verapamil	VERAPAMIL	firm tableta	biser, 50 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	157,20	0,24 g	9,43	50,00		
1402721	C09DA01	verapamil	IZOPAMIL	firm tableta	biser, 45 po 80 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	141,50	0,24 g	9,43	50,00		
1402130	C09DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	obložena tableta	biser, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	69,50	0,24 g	13,90	50,00		
1402121	C09DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	obložena tableta	biser, 30 po 80 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	94,30	0,24 g	9,43	50,00		
1402250	C09DB01	nitbazem	CORTIAZEM RETARD	firm tableta sa modifikovanim oslobađanjem	biser, 30 po 90 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	208,30	0,24 g	18,80	50,00		
1402203	C09DB01	nitbazem	DILTIAZEM ALKALOID	tableta sa produženim oslobađanjem	biser, 30 po 90 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	209,30	0,24 g	18,80	50,00		
1103632	C09AA01	kaptopril	ZORKAPRIL	tableta	bočica plastična, 40 po 12,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	77,40	50 mg	7,74	50,00		
1103630	C09AA01	kaptopril	ZORKAPRIL	tableta	biser, 40 po 25 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	134,70	50 mg	6,74	50,00		
1103631	C09AA01	kaptopril	ZORKAPRIL	tableta	bočica plastična, 40 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	259,40	50 mg	6,74	50,00		
1103220	C09AA01	kaptopril	KATOPIL	tableta	biser, 40 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	134,70	50 mg	6,74	50,00		
1103222	C09AA01	kaptopril	KATOPIL	tableta	biser, 40 po 80 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	269,40	50 mg	6,74	50,00		
1103579	C09AA02	tenalapril	PRILENAP	tableta	biser, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	150,90	10 mg	5,03	50,00		
1103579	C09AA02	tenalapril	PRILENAP	tableta	biser, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	302,10	10 mg	5,04	50,00		
1103970	C09AA02	tenalapril	ENALAPRIL	tableta	biser, 20 po 5 mg	Jugocemefila a.d.	Republika Srbija	62,80	10 mg	6,28	50,00		
1103971	C09AA02	tenalapril	ENALAPRIL	tableta	biser, 20 po 10 mg	Jugocemefila a.d.	Republika Srbija	100,60	10 mg	5,03	50,00		
1103972	C09AA02	tenalapril	ENALAPRIL	tableta	biser, 70 po 20 mg	Jugocemefila a.d.	Republika Srbija	201,40	10 mg	5,04	50,00		
1103179	C09AA02	tenalapril	ENALAPRIL ZORKAPRILIE ACTIVUS	tableta	biser, 30 po 10 mg	Zdravite a.d.	Republika Srbija	150,90	10 mg	5,03	50,00		

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastuđeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Meromerna
1103176	C09AA02	enabipril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	biser, 30 po 20 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	302.10	10 mg	6.04	50.00		
1103687	C09AA02	enabipril	ENATENS	tableta	biser, 20 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	100.80	10 mg	6.05	50.00		
1103688	C09AA02	enabipril	ENATENS	tableta	biser, 20 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	201.40	10 mg	6.04	50.00		
1103686	C09AA02	enabipril	ENALAPRIL	tableta	strp, 20 po 10 mg	Remedica Ltd	Kipar	100.80	10 mg	5.03	50.00		
1103685	C09AA02	enabipril	ENALAPRIL	tableta	strp, 20 po 20 mg	Remedica Ltd	Kipar	201.40	10 mg	5.04	50.00		
1103204	C09AA02	enabipril	ENAP	tableta	biser deljiv na pojedinačne doze, 20 po 3mg	Kris D.D.	Švedska	62.80	10 mg	6.28	50.00		
1103200	C09AA02	enabipril	ENAP	tableta	biser deljiv na pojedinačne doze, 20 po 10mg	Kris D.D.	Švedska	100.80	10 mg	5.03	50.00		
1103202	C09AA02	enabipril	ENAP	tableta	biser deljiv na pojedinačne doze, 20 po 20mg	Kris D.D.	Švedska	201.40	10 mg	5.04	50.00		
1103688	C09AA02	enabipril	ENATENS	tableta	biser, 30 po 10 mg	Pharmawiss d.o.o.	Republika Srbija	150.90	10 mg	5.03	50.00		
1103687	C09AA02	enabipril	ENATENS	tableta	biser, 30 po 20 mg	Pharmawiss d.o.o.	Republika Srbija	302.10	10 mg	5.04	50.00		
1103675	C09AA03	lanopril	LIZINOPRIL	tableta	20 po 5 mg	Jugomedija a.d.	Republika Srbija	58.70	10 mg	6.97	50.00		
1103675	C09AA03	lanopril	LIZINOPRIL	tableta	20 po 10 mg	Jugomedija a.d.	Republika Srbija	81.90	10 mg	4.10	50.00		
1103677	C09AA03	lanopril	LIZINOPRIL	tableta	20 po 20 mg	Jugomedija a.d.	Republika Srbija	218.30	10 mg	5.46	50.00		
1103665	C09AA03	lanopril	SKOPRYL	tableta	biser, 20 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd, Alkaloid Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	81.90	10 mg	4.10	50.00		
1103666	C09AA03	lanopril	SKOPRYL	tableta	biser, 20 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd, Alkaloid Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	218.30	10 mg	6.46	50.00		
1103667	C09AA03	lanopril	SKOPRYL	tableta	biser, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd, Alkaloid Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	122.90	10 mg	4.10	50.00		

Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jacinina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Marketa
110369	C09AA03	fenopril	SKOPRYL	tableta	blistar, 30 po 20 mg	Alvaloid d.o.o. Beograd, Republika Srbija	Republika Srbija	327,40	10 mg	5,46	50,00		
110350	C09AA03	fenopril	IRUMED	tableta	blistar, 30 po 5 mg	Bektap, Lijekovi i Kosmetika d.o.o. Hrvatska	Hrvatska	89,50	10 mg	8,97	50,00		
110351	C09AA03	fenopril	IRUMED	tableta	blistar, 30 po 20 mg	Bektap, Lijekovi i Kosmetika d.o.o. Hrvatska	Hrvatska	327,40	10 mg	5,46	50,00		
110367	C09AA03	fenopril	LIZOPRIL	tableta	blistar, 20 po 5 mg	Bosnalijek D.D. Bosna i Hercegovina	Bosna i Hercegovina	59,70	10 mg	5,97	50,00		
110366	C09AA03	fenopril	LIZOPRIL	tableta	blistar, 20 po 10 mg	Bosnalijek D.D. Bosna i Hercegovina	Bosna i Hercegovina	81,90	10 mg	4,10	50,00		
110365	C09AA03	fenopril	LIZOPRIL	tableta	blistar, 20 po 20 mg	Bosnalijek D.D. Bosna i Hercegovina	Bosna i Hercegovina	248,90	10 mg	5,46	50,00		
1103673	C09AA03	fenopril	LIZOPRIL ATB	tableta	blistar, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotik S.A. Rumunija	Rumunija	122,90	10 mg	4,10	50,00		
1103674	C09AA03	fenopril	LIZOPRIL ATB	tableta	blistar, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotik S.A. Rumunija	Rumunija	327,40	10 mg	5,46	50,00		
1103680	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL PHARMAS	tableta	blistar, 28 po 2,5 mg	Pharmas d.o.o. Republika Srbija	Republika Srbija	110,60	2,5 mg	3,95	50,00		
1103681	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL PHARMAS	tableta	blistar, 28 po 5 mg	Pharmas d.o.o. Republika Srbija	Republika Srbija	192,50	2,5 mg	3,44	50,00		
1103011	C09AA05	ramipril	RAMITENS	tableta	blistar, 28 po 2,5 mg	PharmSwiss d.o.o. Republika Srbija	Republika Srbija	110,60	2,5 mg	3,95	50,00		
1103010	C09AA05	ramipril	RAMITENS	tableta	blistar, 28 po 5 mg	PharmSwiss d.o.o. Republika Srbija	Republika Srbija	192,50	2,5 mg	3,44	50,00		
1103024	C09AA05	ramipril	RAMITENS	tableta	blistar, 30 po 2,5 mg	PharmSwiss d.o.o. Republika Srbija	Republika Srbija	116,50	2,5 mg	3,96	50,00		
1103019	C09AA05	ramipril	RAMITENS	tableta	blistar, 30 po 5 mg	PharmSwiss d.o.o. Republika Srbija	Republika Srbija	206,30	2,5 mg	3,44	50,00		
1103722	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	28 po 2,5 mg	Sandoz-Aventis S.P.A. Italija	Italija	112,60	2,5 mg	3,95	50,00		
1103723	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	28 po 5 mg	Sandoz-Aventis S.P.A. Italija	Italija	192,50	2,5 mg	3,44	50,00		

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastüčeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Meropenem
1103724	C09AA05	temipril	TRITACE	tableta	28 po 10 mg	Sandoz-Aventis S.P.A.	Italija	276.10	2,5 mg	3,47	50,00		
1103912	C09AA05	temipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 1,25 mg	Zdravlje a.d. Balkanpharma-Dupnitsa ad. Actavis LTD. Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	88.00	2,5 mg	6,29	50,00		
1103913	C09AA05	temipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Zdravlje a.d. Balkanpharma-Dupnitsa ad. Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	110.80	2,5 mg	3,95	50,00		
1103983	C09AA05	temipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 5 mg	Zdravlje a.d. Balkanpharma-Dupnitsa ad. Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	192.50	2,5 mg	3,44	50,00		
1103982	C09AA05	temipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravlje a.d. Balkanpharma-Dupnitsa ad. Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	276.10	2,5 mg	2,47	50,00		
1103251	C09AA05	temipril	AMPREL	tableta	blister, 28 po 1,25 mg	Kika, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	88.00	2,5 mg	6,29	50,00		
1103255	C09AA05	temipril	AMPREL	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Kika, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	110.80	2,5 mg	3,95	50,00		
1103259	C09AA05	temipril	AMPREL	tableta	blister, 28 po 5 mg	Kika, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	192.50	2,5 mg	3,44	50,00		
1103285	C09AA05	temipril	AMPREL	tableta	blister, 28 po 10 mg	Kika, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	276.10	2,5 mg	2,47	50,00		
1103256	C09AA05	temipril	AMPREL	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Kika, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	118.50	2,5 mg	3,95	80,00		
1103260	C09AA05	temipril	AMPREL	tableta	blister, 30 po 5 mg	Kika, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	206.50	2,5 mg	3,44	50,00		
1103264	C09AA05	temipril	AMPREL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Kika, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	295.80	2,5 mg	2,47	50,00		
1103286	C09AA05	temipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Herafirm A.D.	Republika Srbija	110.80	2,5 mg	3,95	50,00		
1103287	C09AA05	temipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Herafirm A.D.	Republika Srbija	192.50	2,5 mg	3,44	50,00		
1103285	C09AA05	temipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 10 mg	Herafirm A.D.	Republika Srbija	276.10	2,5 mg	2,47	50,00		
1103026	C09AA05	temipril	CORACE	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Actavis LTD. Actavis EHF. Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Island; Bugarska	110.80	2,5 mg	3,95	50,00		



Lista A- lekovi koji se propisuju izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jacinma leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103025	C09BA02	ramipril	CORACE	tableta	blister, 28 po 5mg	Acevis, LTD: Acevis EHF, Balkinpharm, Duprlisa AD	Malta, Island; Bugarska	192,50	2,5 mg	3,44	50,00		
1401593	C09BA02	enalapril hidrohlorid	PRILENAPH	tablete	blister, 30 po (10 mg + 25 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	299,70	1 tableta	8,97	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401498	C09BA02	enalapril hidrohlorid	PRILENAPH-L	tableta	blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	225,80	1 tableta	7,52	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401594	C09BA02	enalapril hidrohlorid	ENAPENS PLUS	tablete	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	254,00	1 tableta	12,70	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401595	C09BA02	enalapril hidrohlorid	ENAPENS PLUS	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	381,00	1 tableta	12,70	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401682	C09BA02	enalapril hidrohlorid	ENAPRIL HCT	tablete	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Zdravje a.d.	Republika Srbija	391,00	1 tableta	12,70	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401683	C09BA02	enalapril hidrohlorid	ENAPRIL HCT	tableta	blister, 30 po (20 mg + 6 mg)	Zdravje a.d.	Republika Srbija	340,00	1 tableta	11,33	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401140	C09BA02	enalapril hidrohlorid	ENAP-H	tableta	blister, 20 po (10mg+25mg)	Kris D.D.	Slovenija	179,40	1 tableta	8,97	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401175	C09BA02	enalapril hidrohlorid	ENAP-HL 20	tableta	blister, 20 po (10mg+12,5mg)	Kris D.D.	Slovenija	150,40	1 tableta	7,52	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401178	C09BA02	enalapril hidrohlorid	ENAP-HL 20	tableta	30 po (30mg+12,5mg)	Kika, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	254,00	1 tableta	12,70	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A. lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / jacinna leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućih lica	Indikacija	Napomena
1401171	C09BA03	kanopril, hidrohlorid	LIZOPRIL H	tableta	blister, 20 po (10 mg + 12,5 mg)	Bosnalijek d. d.	Bosna i Hercegovina	143,90	1 tableta	7,18	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401172	C09BA03	kanopril, hidrohlorid	LIZOPRIL H	tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	Bosnalijek d. d.	Bosna i Hercegovina	270,90	1 tableta	13,55	60,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401182	C09BA03	kanopril, hidrohlorid	SKORRYL PLUS	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Avaloid d.o.o. Beograd; Avaloid ud Slojone	Republika Srbija; Republika Makedonija	406,30	1 tableta	13,54	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401922	C09BA03	kanopril, hidrohlorid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg)	Belluco i lekovi i kozmetika d. d.	Hrvatska	216,40	1 tableta	7,18	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401923	C09BA03	kanopril, hidrohlorid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (20 mg + 25 mg)	Belluco i lekovi i kozmetika d. d.	Hrvatska	468,30	1 tableta	15,28	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401131	C09BA05	ramipril, hidrohlorid	AMPRIL HD	tableta	28 po (6 mg + 25 mg)	Kika, Tovarna Zdravi, d. d.	Slovenija	162,80	1 tableta	5,91	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401913	C09BA05	ramipril, hidrohlorid	TRITACE COMP	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Sandoz-Aventis S.P.A.	Italija	132,80	1 tableta	4,78	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401915	C09BA05	ramipril, hidrohlorid	TRITACE COMP LS	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Sandoz-Aventis S.P.A.	Italija	132,80	1 tableta	4,78	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401909	C09BA05	ramipril, hidrohlorid	VINACE PLUS L	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 25 mg)	Zdravje d.d. Actavis LTD., Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	162,80	1 tableta	5,91	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401931	C09BA05	ramipril, hidrohlorid	PRILINDA PLUS	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	132,80	1 tableta	4,78	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (10/111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	



List A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućeg fonda	Indikacija	Napomena
11041932	C09BA05	temipril hidrohlorid	PRILINDA PLUS	tableta	blistar, 28 po 6 mg i 25 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	162,80	1 tableta	6,61	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 ; I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
11041130	C09BA05	temipril hidrohlorid	AMPRILOL HL	tablete	blistar, 28 po 2,5 mg i 12,5 mg	Kika, Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	133,80	1 tableta	4,78	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 ; I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103929	C09BA05	temipril hidrohlorid	CORACE PLUS	tableta	blistar, 28 po 2,5 mg i 12,5 mg	Actavis LTD, Actavis BHP, Balkanpharma- Doprifca AD	Malta, Island; Bugarska	133,80	1 tableta	4,78	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 ; I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103927	C09BA05	temipril hidrohlorid	CORACE PLUS	tableta	blistar, 28 po 6 mg i 25 mg	Actavis LTD, Actavis BHP, Balkanpharma- Doprifca AD	Malta, Island; Bugarska	162,80	1 tableta	6,61	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 ; I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1104612	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blistar, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	294,90	30 mg	11,73	50,00	Porodična forma hipolipidemije ( E78.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Kijke za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog centra Srbije
1104513	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blistar, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	134,40	30 mg	13,44	50,00	Porodična forma hipolipidemije ( E78.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Kijke za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog centra Srbije
1104493	C10AA01	simvastatin	VASLIP	film tableta	blistar, 28 po 10 mg	Kika, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	126,40	30 mg	13,44	50,00	Porodična forma hipolipidemije ( E78.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Kijke za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog centra Srbije
1104491	C10AA01	simvastatin	VASLIP	film tableta	blistar, 28 po 20 mg	Kika, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	218,90	30 mg	11,73	50,00	Porodična forma hipolipidemije ( E78.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Kijke za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog centra Srbije
1104492	C10AA01	simvastatin	VASLIP	film tableta	blistar, 28 po 40 mg	Kika, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	358,00	30 mg	9,62	50,00	Porodična forma hipolipidemije ( E78.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Kijke za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog centra Srbije
1104510	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blistar, 30 po 10 mg	Aktaloid d.o.o.	Republika Srbija	134,40	30 mg	13,44	50,00	Porodična forma hipolipidemije ( E78.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Kijke za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog centra Srbije
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blistar, 30 po 20 mg	Aktaloid d.o.o.	Republika Srbija	294,50	30 mg	11,73	50,00	Porodična forma hipolipidemije ( E78.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Kijke za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog centra Srbije
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blistar, 30 po 40 mg	Aktaloid d.o.o.	Republika Srbija	384,80	30 mg	9,62	50,00	Porodična forma hipolipidemije ( E78.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Kijke za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog centra Srbije
1104713	C10AA01	simvastatin	SMVASTATIN TEVA	film tableta	blistar, 28 po 10 mg	Teva Pharma S.L.U.	Španija	125,40	30 mg	13,44	50,00	Porodična forma hipolipidemije ( E78.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Kijke za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog centra Srbije

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje / pakma leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104714	C10AA01	simvastatin	SIMVASTATIN TEVA	film tableta	blistar, 28 po 20mg	Teva Pharma S.L.U.	Španja	218,90	30 mg	11,73	50,00	Porodna forma hiperlipidemije ( E7B.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu merjenja kinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog kliničkog centra Srbije
1104715	C10AA01	simvastatin	SIMVASTATIN TEVA	film tableta	blistar, 28 po 40mg	Teva Pharma S.L.U.	Španja	359,00	30 mg	9,62	50,00	Porodna forma hiperlipidemije ( E7B.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu merjenja kinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog kliničkog centra Srbije
1104482	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blistar, 30 po 20mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	286,50	30 mg	14,48	50,00	Porodna forma hiperlipidemije ( E7B.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu merjenja kinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog kliničkog centra Srbije
1104483	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blistar, 30 po 40mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	488,00	30 mg	12,20	50,00	Porodna forma hiperlipidemije ( E7B.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu merjenja kinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog kliničkog centra Srbije
1104485	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blistar, 30 po 20mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	288,50	30 mg	14,48	50,00	Porodna forma hiperlipidemije ( E7B.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu merjenja kinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog kliničkog centra Srbije
1104495	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blistar, 30 po 40mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	489,00	30 mg	12,20	50,00	Porodna forma hiperlipidemije ( E7B.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu merjenja kinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog kliničkog centra Srbije
1104725	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blistar, 30 po 10mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	243,30	20 mg	18,22	50,00	Porodna forma hiperlipidemije ( E7B.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu merjenja kinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog kliničkog centra Srbije
1104726	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blistar, 30 po 20mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	429,80	20 mg	14,33	50,00	Porodna forma hiperlipidemije ( E7B.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu merjenja kinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog kliničkog centra Srbije
1104737	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blistar, 30 po 40mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	489,10	20 mg	9,15	50,00	Porodna forma hiperlipidemije ( E7B.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu merjenja kinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog kliničkog centra Srbije
1104620	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blistar, 30 po 10mg	Kika, Tovarna Zdravj d.d.	Slovenija	243,30	20 mg	18,22	50,00	Porodna forma hiperlipidemije ( E7B.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu merjenja kinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog kliničkog centra Srbije
1104622	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blistar, 30 po 20mg	Kika, Tovarna Zdravj d.d.	Slovenija	429,80	20 mg	14,33	50,00	Porodna forma hiperlipidemije ( E7B.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu merjenja kinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog kliničkog centra Srbije
1104624	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blistar, 30 po 40mg	Kika, Tovarna Zdravj d.d.	Slovenija	488,10	20 mg	8,15	50,00	Porodna forma hiperlipidemije ( E7B.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu merjenja kinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog kliničkog centra Srbije
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blistar, 30 po 10mg	Medico Linc d.o.o.	Republika Srbija	243,30	20 mg	18,22	50,00	Porodna forma hiperlipidemije ( E7B.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu merjenja kinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog kliničkog centra Srbije
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blistar, 30 po 20mg	Medico Linc d.o.o.	Republika Srbija	429,80	20 mg	14,33	50,00	Porodna forma hiperlipidemije ( E7B.4 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu merjenja kinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog kliničkog centra Srbije

Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zasticevano ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104651	C10AA05	atorvastatin	ATORIP	firm tableta	biser, 30 po 10 mg	Celentis a.d.	Republika Srbija	243,30	20 mg	18,22	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104652	C10AA05	atorvastatin	ATORIP	firm tableta	biser, 30 po 20 mg	Celentis a.d.	Republika Srbija	429,90	20 mg	14,33	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104655	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	firm tableta	biser, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	243,30	20 mg	18,22	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104655	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	firm tableta	biser, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	429,90	20 mg	14,33	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104657	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	firm tableta	biser, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	488,10	20 mg	8,15	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104794	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	firm tableta	biser, 30 po 10 mg	Akabić d.o.o.Srbija	Republika Srbija	243,30	20 mg	18,22	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104795	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	firm tableta	biser, 30 po 20 mg	Akabić d.o.o.Srbija	Republika Srbija	429,90	20 mg	14,33	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104792	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	firm tableta	biser, 30 po 40 mg	Akabić d.o.o.Srbija	Republika Srbija	488,10	20 mg	8,15	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104619	C10AA05	atorvastatin	ATORVASTATIN KRKA	firm tableta	biser, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	243,30	20 mg	18,22	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104618	C10AA05	atorvastatin	ATORVASTATIN KRKA	firm tableta	biser, 30 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	429,90	20 mg	14,33	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104727	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	firm tableta	biser, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	199,90	10 mg	14,28	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104725	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	firm tableta	biser, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	492,90	10 mg	17,80	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104728	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	firm tableta	biser, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	814,40	10 mg	14,54	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104726	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	firm tableta	biser, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	1.056,30	10 mg	9,43	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastučenost imena leka	FO	Pakovanje / jacinna leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
110471	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	firm tableta	blistar, 30 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	528 10	10 mg	17,60	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se unosi u terapiju na osnovu merjenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličima Kliničkog centra Srbije
110472	C10AA07	rosuvastatin	ROSIHOL	firm tableta	blistar, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	872 90	10 mg	14,54	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se unosi u terapiju na osnovu merjenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličima Kliničkog centra Srbije
110473	C10AA07	rosuvastatin	ROSACTA	firm tableta	blistar, 30 po 5mg	Zdravko a.d., Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	214,20	10 mg	14,28	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se unosi u terapiju na osnovu merjenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličima Kliničkog centra Srbije
110474	C10AA07	rosuvastatin	ROSACTA	firm tableta	blistar, 30 po 10mg	Zdravko a.d., Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	528 10	10 mg	17,60	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se unosi u terapiju na osnovu merjenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličima Kliničkog centra Srbije
110475	C10AA07	rosuvastatin	ROSACTA	firm tableta	blistar, 30 po 20mg	Zdravko a.d., Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	872 90	10 mg	14,54	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se unosi u terapiju na osnovu merjenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličima Kliničkog centra Srbije
110476	C10AA07	rosuvastatin	ROSACTA	firm tableta	blistar, 30 po 40mg	Zdravko a.d., Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	1.131 80	10 mg	9,43	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se unosi u terapiju na osnovu merjenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličima Kliničkog centra Srbije
110477	C10AA07	rosuvastatin	MERTENIL	firm tableta	blistar, 30 po 10mg	Ceskon Richter Pl.	Mađarska	528 10	10 mg	17,60	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se unosi u terapiju na osnovu merjenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličima Kliničkog centra Srbije
110478	C10AA07	rosuvastatin	MERTENIL	firm tableta	blistar, 30 po 20mg	Ceskon Richter Pl.	Mađarska	872 90	10 mg	14,54	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se unosi u terapiju na osnovu merjenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličima Kliničkog centra Srbije
110479	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	firm tableta	blistar, 28 po 5mg	Lek Farmaceutička družba d.d	Slovenija	199 90	10 mg	14,28	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se unosi u terapiju na osnovu merjenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličima Kliničkog centra Srbije
110479	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	firm tableta	blistar, 28 po 10mg	Lek Farmaceutička družba d.d	Slovenija	492 90	10 mg	17,60	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se unosi u terapiju na osnovu merjenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličima Kliničkog centra Srbije
110479	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	firm tableta	blistar, 28 po 20mg	Lek Farmaceutička družba d.d	Slovenija	914,40	10 mg	14,54	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se unosi u terapiju na osnovu merjenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličima Kliničkog centra Srbije
110479	C10AA07	rosuvastatin	ROSWERA	firm tableta	blistar, 28 po 10mg	Kira Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	492 90	10 mg	17,60	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se unosi u terapiju na osnovu merjenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličima Kliničkog centra Srbije
110479	C10AA07	rosuvastatin	ROSWERA	firm tableta	blistar, 28 po 20mg	Kira Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	914,40	10 mg	14,54	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se unosi u terapiju na osnovu merjenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličima Kliničkog centra Srbije
110479	C10AA07	rosuvastatin	ROSWERA	firm tableta	blistar, 28 po 40mg	Kira Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	1.056 30	10 mg	9,43	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E7B.4.)	Lek se unosi u terapiju na osnovu merjenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličima Kliničkog centra Srbije

Lista A-lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104650	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blistar, 30 po 5mg	Hierofarm A.D. Vrsac	Republika Srbija	214,20	10mg	14,28	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104641	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blistar, 30 po 10mg	Hierofarm A.D. Vrsac	Republika Srbija	528,10	10mg	17,60	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104642	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blistar, 30 po 20mg	Hierofarm A.D. Vrsac	Republika Srbija	872,60	10mg	14,54	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104690	C10AA07	rosuvastatin	ROVAOSTIN	film tableta	blistar, 28 po 5mg	Actavis Ltd	Malta	199,90	10mg	14,28	90,00	Porodna forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104691	C10AA07	rosuvastatin	ROVAOSTIN	film tableta	blistar, 28 po 10mg	Actavis Ltd	Malta	492,90	10mg	17,60	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104692	C10AA07	rosuvastatin	ROVAOSTIN	film tableta	blistar, 28 po 20mg	Actavis Ltd	Malta	814,40	10mg	14,54	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104693	C10AA07	rosuvastatin	ROVAOSTIN	film tableta	blistar, 28 po 40mg	Actavis Ltd	Malta	1.056,30	10mg	9,43	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104686	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blistar, 30 po 10 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.	Nemacka; Slovenija	528,10	10 mg	17,60	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104687	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blistar, 30 po 20 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.	Nemacka; Slovenija	872,60	10 mg	14,54	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104688	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blistar, 30 po 40 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.	Nemacka; Slovenija	1.131,80	10 mg	9,43	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104670	C10AB08	ezetimibe	LIPANOR	kapsula, tvrda	blistar, 30 po 100 mg	Sandoz Viropharm Industrie	Francuska	357,60	0,1 g	11,92	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
1104480	C10AX06	ezetimib	EZOLETA	tableta	blistar, 30 po 10 mg	Kika, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	1.872,40	10 mg	62,41	50,00	Porodna forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti dijabetes i bolesti metaboličnog Kliničkog centra Srbije
4157100	D01AC02	mikonazol	DAKTANOL	krem	tuba, 1 po 30 g 2%	Galentia a.d.	Republika Srbija	193,10	-	-	50,00	-	-
4137000	D01AC02	mikonazol	ROJAZOL	krem	tuba, 1 po 30 g (20 mg/g)	Belupo, Lijekovni i kozmetika d.d.	Hrvatska	193,10	-	-	50,00	-	-
4150223	D06AX01	fusidinska kiselina	STANICID	maz	tuba, 1 po 10 g (2%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	399,00	-	-	50,00	-	-
4151050	D06BA01	salicilazn	SANADERM	krem	tuba, 1 po 50 g 1%	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	278,10	-	-	50,00	-	-

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućih lica	Indikacija	Napomena
4152075	D07AA02	hidrokortison kortizol	HYDROCORTISON	maz	tuba, 1 po 5 g 2,5%	Galenika a.d.	Republika Srbija	72,50	-	-	50,00		
4152182	D07AC04	fluocinolonesteroid	SINODERM	gel	tuba, 1 po 30 g (0,25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	130,30	-	-	50,00		
4152190	D07AC04	fluocinolonesteroid	SINODERM	krem	tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	85,30	-	-	50,00		
4152191	D07AC04	fluocinolonesteroid	SINODERM	maz	tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	85,30	-	-	50,00		
4152220	D07CC02	fluocinolonesteroid	SINODERM IN	krem	tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	116,00	-	-	50,00		
4152221	D07CC02	fluocinolonesteroid	SINODERM IN	maz	tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	116,00	-	-	50,00		
4159950	D11AH02	gimekrolimus	EUDEL	krem	tuba, 1 po 15 g (1%)	Meda Manufacturing, Meda Pharma GmbH & Co.KG	Francuska, Nemačka	1.704,20	-	-	50,00	Aluprijki dermatitis (L20)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa, zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
6137062	G01AF01	metronidazol	GRIVAGIL	vaginita	10 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	175,50	0,5 g	17,55	50,00	Vaginalna infekcija (N75)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
6137275	G01AF04	mikonazol	GRUDAKTANOL	vaginita	7 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	305,70	0,1 g	21,84	50,00	Vaginalna infekcija (N75)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
2141156	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMET RIN	oralne kap, mastur	botica sa kapilicom, 1 po 10 ml (0,25 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	100,30	0,2 mg	8,02	50,00	1. Neoznačen poboljšaj (O06); 2. Kvaranje posle poroda (C72);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
1152540	G03AA07	levonorgestrel, etinodiol	LEGRAVANI	8 m tableta	blister 1 po 21 (0,15 mg + 0,03 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	217,70	0,75 tabl.	7,78	50,00	Hormonska kontracepcija (Z30)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1104463	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kepsula, meka	blister 30 po 100 mg	Laboratoires Biens International, Biens Manufacturing Eastgum	Francuska, Belgija	576,70	300 mg	67,67	50,00	1. Primarni ili sekundarni sledeći uzrok pacifine ili topline menopauzalne insuficijencije (N97); 2. Pobora lične faze u toku MF kao u programi donacije oocita (N88); 3. Preteci poboljšaj (O20); 4. Prevremeni porođaj (D40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.





Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1048452	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	bister, 14 po 200 mg	Leiberoles Beigis International, Beigis Manufacturing Belgium	Francuska, Belgija	576,70	300 mg	61,79	50,00	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.	
1048781	G03FE01	progesteron, estradiol	CYCLIO-PROGESTOVA	obložena tableta	bister, 1 po 21 (0,5 mg + 2 mg + 2 mg)	Bayet-Weiniger GmbH & Co. KG	Nemacka	194,40	0,75 tabl.	6,94	50,00	1. Prihvatiti sekundarni sindrom, uzrok patološke ili fiziološke progesteronske insuficijencije (N97); 2. Poporna kašnjenje faze u toku MF kao i u programi davanja oocite (NRB); 3. Preleći poboljšati (O20.0); 4. Prevencija proclaj (O60).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048831	G03HA01	leprateron	ANDROCUR	tableta	bister, 50 po 50 mg	Dalipharma, Lille San, Bayer Menar GmbH & Co. KG	Francuska, Nemacka	2.385,90	0,1 g	94,83	50,00	Originalni uzastopno funkcionalni hiperandrogenizam (N97.14 I26.01).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zadržavanje ustimove koja obavlja zadržavanje dištnost na sekundarnom nivou.
1038900	G04BE05	aldometil	REVATIO	film tableta	bister, 80 po 20 mg	Pfizer PCN	Francuska	54.729,20	50 mg	1.933,68	50,00	Plazna hipertenzija (E27.0, E27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ili lekara zadržavanje uzastopno terapijom dva zadržavanje zabate
0044308	H01AC01	somatropin	NCRDITROPIN NCRDILET	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 30 i, (10 mg/1,5 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	23.006,50	2 lj.	1.533,77	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece. 2. Turneov sindrom ( O65 ), samo kod dece. 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečnim deficitom hormona rasta ( hipopituizizam ) 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusu zastoju u rasklaju ( P05.1 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044298	H01AC01	somatropin	NCRDITROPIN NCRDILET	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 45 i, (15 mg/1,5 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	34.508,80	2 lj.	1.533,77	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece. 2. Turneov sindrom ( O65 ), samo kod dece. 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečnim deficitom hormona rasta ( hipopituizizam ) ( E23.0 ). 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusu zastoju u rasklaju ( P05.1 ). 5. Usporeni rast kod dece u preporodu, uzled fizičnog zadržavanja ( R12-R19.9 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044242	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	pršak rastvarača za rastvor za injekciju	uložak, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml)	Pfizer, Manni, Leuven Belgium NV	Belgija	8.379,60	2 lj.	1.179,82	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece. 2. Turneov sindrom ( O65 ), samo kod dece. 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečnim deficitom hormona rasta ( hipopituizizam ) ( E23.0 ). 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusu zastoju u rasklaju ( P05.1 ). 5. Prader-Willi sindrom ( O87.1 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa.

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupnik imaleka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
0044241	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prášak i rastvarač za rastvor za injekciju	uložak 5 po 1 ml (5,3 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	46.698,10	2 lj.	1.179,83	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem i izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece. 2. Turneov sindrom ( C86 ), samo kod dece. 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficietom hormona rasta ( hipopituizizam ) ( E23.0 ). 4. Deca rođena mlađe za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterini zastoj u rasteđu ( P05.1 ). 5. Prader-Willi sindrom ( Q87.1 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.	
0044243	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prášak i rastvarač za rastvor za injekciju	uložak 1 po 1 ml (12 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	21.017,70	2 lj.	1.187,66	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem i izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece. 2. Turneov sindrom ( C86 ), samo kod dece. 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficietom hormona rasta ( hipopituizizam ) ( E23.0 ). 4. Deca rođena mlađe za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterini zastoj u rasteđu ( P05.1 ). 5. Prader-Willi sindrom ( Q87.1 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.	
0044239	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prášak i rastvarač za rastvor za injekciju	pen sa uškom, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	10.480,70	2 lj.	1.318,33	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem i izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece. 2. Turneov sindrom ( C86 ), samo kod dece. 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficietom hormona rasta ( hipopituizizam ) ( E23.0 ). 4. Deca rođena mlađe za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterini zastoj u rasteđu ( P05.1 ). 5. Prader-Willi sindrom ( Q87.1 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.	
0044236	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prášak i rastvarač za rastvor za injekciju	pen sa uškom, 1 po 1 ml (12 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	21.223,20	2 lj.	1.179,07	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem i izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece. 2. Turneov sindrom ( C86 ), samo kod dece. 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficietom hormona rasta ( hipopituizizam ) ( E23.0 ). 4. Deca rođena mlađe za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterini zastoj u rasteđu ( P05.1 ). 5. Prader-Willi sindrom ( Q87.1 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.	
0044266	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u uložak	uložak 1 po 1,5 ml (5mg), 5ml	Sandoz GmbH	Austrija	8.757,50	2 lj.	1.167,87	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem i izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece. 2. Turneov sindrom ( C86 ), samo kod dece. 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficietom hormona rasta ( hipopituizizam ) ( E23.0 ). 4. Deca rođena mlađe za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterini zastoj u rasteđu ( P05.1 ). 5. Prader-Willi sindrom ( Q87.1 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.	



Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDO	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguraniog lica	Indikacija	Napomena
0044664	H01AC01	somatotropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,5 ml (10mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	17.514,80	2 lj.	1.187,65	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece. 2. Turneov sindrom ( O66 ), samo kod dece. 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečnim deficietom hormona rasta ( hipopituizizam ) ( E23.0 ). 4. Deca rođena mlađa za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastežnju ( P05.1 ), 5. Prader - Willi sindrom ( Q97.1 ).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044681	H01AC01	somatotropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,5 ml (15mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	23.120,50	2 lj.	1.027,60	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece. 2. Turneov sindrom ( O66 ), samo kod dece. 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečnim deficietom hormona rasta ( hipopituizizam ) ( E23.0 ). 4. Deca rođena mlađa za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastežnju ( P05.1 ), 5. Prader - Willi sindrom ( Q97.1 ). 6. Urogenitalni rast kod dece u preobustavu usled hroničnog obojenja bubrega ( N19.2,N19.9).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044700	H01AC01	somatotropin	SAZEN	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,05 ml (5,83 mg/ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	13.803,90	2 lj.	1.632,62	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece. 2. Turneov sindrom ( O66 ), samo kod dece. 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečnim deficietom hormona rasta ( hipopituizizam ) ( E23.0 ). 4. Deca rođena mlađa za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastežnju ( P05.1 ).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044701	H01AC01	somatotropin	SAZEN	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,5 ml (6 mg/ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	27.607,80	2 lj.	1.533,77	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece. 2. Turneov sindrom ( O66 ), samo kod dece. 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečnim deficietom hormona rasta ( hipopituizizam ) ( E23.0 ). 4. Deca rođena mlađa za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastežnju ( P05.1 ).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044702	H01AC01	somatotropin	SAZEN	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 2,5 ml (6 mg/ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	42.871,10	2 lj.	1.432,37	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece. 2. Turneov sindrom ( O66 ), samo kod dece. 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečnim deficietom hormona rasta ( hipopituizizam ) ( E23.0 ). 4. Deca rođena mlađa za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastežnju ( P05.1 ).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
7045080	H01BA02	diazonijepiridin	MINIRIN	sojica za nos, rastvor	bočica sa 27 mg sumpom, 1 po 5 ml (100 mg/ml)	Ferring International Center SA	Švedska, Švajcarska	3.928,10	25 mg	196,46	50,00		

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Meroprema
1045081	H01BA02	clonazepam	MINIRN	tableta	bočica plastika, 30 po 0,2 mg	Fering AB; Fering International Center SA	Švedska; Svojizakca	3.878,30	0,4 mg	258,55	50,00		
1045084	H01BA02	clonazepam	MFURIN MELT	tableta	blister, 30 po 0,2 mg	Fering GmbH	Nemačka	1.885,50	240 mg	264,73	50,00		Samo za decu
1045082	H01BA02	clonazepam	MINIRN MELT	tableta	blister, 30 po 0,2 mg	Fering GmbH	Nemačka	3.949,10	240 mg	263,27	50,00		Samo za decu
1047143	H02AB02	diklofenak	DEKASON	tableta	blister, 50 po 0,5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	397,40	1,5 mg	23,94	50,00		
1047180	H02AB04	medvedjehizbon	NIRYPAN	tableta	blister, 20 po 6 mg	Union-Medic d.o.o Novi Sad	Republika Srbija	424,30	7,5 mg	19,89	50,00		
1047632	H02AB07	prednizon	PRONISON	tableta	20 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	305,00	10 mg	7,60	50,00		
1047511	H02AB07	prednizon	PREDNISON	tableta	blister, 10 po 5 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	60,50	10 mg	12,10	50,00		
1040050	H03AA01	levobrotan natrijum	TYORAL	tableta	blister, 50 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	138,30	150 mg	4,15	50,00		
1040030	H03AA01	levobrotan natrijum	EUTHYROX	tableta	50 po 25 mg	Merck KGaA	Nemačka	103,00	150 mg	12,36	50,00		
1040190	H03BA02	propifenazol	PTU	tableta	20 po 50 mg	Alliand a.d.	Republika Makedonija	145,50	0,1 g	14,55	50,00		
1040192	H03BA02	propifenazol	PTU	tableta	45 po 100 mg	Alliand a.d.	Republika Makedonija	705,30	0,1 g	15,67	50,00		
1040120	H03B602	flamazol	TIJASTAT	tableta	20 po 20 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	154,00	10 mg	3,86	50,00		
0341340	H04AA01	glukagon	GLUCAGEN HYPOKIT	pršak i rastvor za injekciju	bočica sa mešuricom i injektorom za injekciju, 1 po 1 ml (1 mg/ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	1.895,70	1 mg	1.895,70	50,00		
1023510	J01AA02	doksicilin	DOVICIN	kapsula	5 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	75,60	0,1 g	15,12	50,00		
1022515	J01AA02	doksicilin	DOKSICILIN	kapsula tvda	blister, 5 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	75,60	0,1 g	15,12	50,00		
1021145	J01CA04	amikacin	SMACILIN	kapsula tvda	blister, 16 po 250 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	94,50	1 g	23,63	50,00		
1021148	J01CA04	amikacin	SMACILIN	kapsula tvda	blister, 16 po 500 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	119,70	1 g	14,96	50,00		
3021145	J01CA04	amikacin	SMACILIN	pršak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	132,50	1 g	26,52	50,00		
1021961	J01CA04	amikacin	AMOKSICILIN	kapsula tvda	blister, 16 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	94,50	1 g	23,63	50,00		



Lista A- lekovi koji se propisuju izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje / jačina leka	Novi proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1021685	J01CA04	amoksisilin	AMOKSICILIN	kap. sol. tvrd.	biser, 16 po 500 mg	Hemofarm a.d	Republika Srbija	119,70	1 g	14,96	50,00		
1021912	J01CA04	amoksisilin	AMOKSICILIN REMEDICA	kap. sol. tvrd.	biser, 16 po 500mg	Remedica Ltd.	Kpar	119,70	1g	14,96	50,00		
1021687	J01CA04	amoksisilin	OSPAMOX DT	tableta za oralnu suspenziju	14 po 1000 mg	Sandoz GmbH	Austrija	266,50	1 g	18,32	50,00		
3021031	J01CA04	amoksisilin	OSPAMOX	prešak za oralnu suspenziju	1 po 60 ml (500 mg/5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	131,70	1 g	21,95	50,00		
1021686	J01CA04	amoksisilin	OSPAMOX DT	tableta za oralnu suspenziju	14 po 500 mg	Sandoz GmbH	Austrija	116,40	1 g	16,63	50,00		
3021147	J01CA04	amoksisilin	SINACILIN baby	prešak za oralnu suspenziju	1 po 100ml (250mg/5ml)	Celanis a d u reotokubranju	Republika Srbija	132,60	1g	26,52	50,00		
3021692	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	PANKLAV	prešak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31,25 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	244,00	1 g	97,60	50,00	1. Inekcija gornjegi donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Inekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Inekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa potezanim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na pojedini recepta
3021695	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	PANKLAV FORTE	prešak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	461,50	1 g	92,30	50,00	1. Inekcija gornjegi donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Inekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Inekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa potezanim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na pojedini recepta
3021698	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	PANKLAV 2X	prešak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	291,20	1 g	52,00	50,00	1. Inekcija gornjegi donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Inekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Inekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa potezanim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na pojedini recepta
3021699	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	PANKLAV 2X	prešak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	562,40	1 g	52,00	50,00	1. Inekcija gornjegi donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Inekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Inekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa potezanim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na pojedini recepta
3021697	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	AUGMENTIN	prešak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	291,20	1 g	52,00	50,00	1. Inekcija gornjegi donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Inekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Inekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa potezanim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na pojedini recepta
1021611	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po 600mg + 120mg	Hemofarm A.D Vrsac	Republika Srbija	531,10	1g	70,81	50,00	1. Inekcija gornjegi donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Inekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Inekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.

Lista A lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastüćeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1021610	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	kefika, 10 po (875mg+125mg)	Hemofarm A D Vrhac	Republika Srbija	254,30	1g	29,06	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
1021663	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	KLAVOPHAR	film tableta	strip, 14 po (875mg+125mg)	PHARMAS D.O.O	Hrvatska	366,00	1g	29,06	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
1021669	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	BETAKLAV	film tableta	strip, 10 po (500mg+125mg)	Kika tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	354,10	1g	70,81	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
1021670	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	BETAKLAV	film tableta	strip, 14 po (875mg+125mg)	Kika tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	495,70	1g	70,81	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
1021671	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	BETAKLAV	film tableta	strip, 20 po (875mg+125mg)	Kika tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	708,10	1g	70,81	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
1021673	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	BETAKLAV	film tablete	strip, 10 po (875mg+125mg)	Kika, Tovarna zdravil, d.d.	Slovenija	254,30	1g	29,06	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
1021674	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	BETAKLAV	film tableta	strip, 14 po (875mg+125mg)	Kika, Tovarna zdravil, d.d.	Slovenija	366,00	1g	29,06	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
1021675	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	BETAKLAV	film tableta	strip, 20 po (875mg+125mg)	Kika, Tovarna zdravil, d.d.	Slovenija	508,80	1g	29,06	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
3021669	J01CR02	amoksisilin, klavulamska kiselina	BETAKLAV	preparat za oralnu suspenziju	boca plasticka, 1 po 70ml (400mg/ml+67mg/ml)	Kika tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	291,20	1g	52,00	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na posebnim receptu.



Lista A- lekovi koji se propisuju izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3021570	J01CR02	amoksisilin kavolamska kiselina	BETAKLAV	prškati za oralnu suspenziju	boća plastika, 15 po 100ml (400mg/5ml + 5,7mg/5ml)	Kriatkovarna Zdravlje d.o.o.	Slovenija	416,00	1g	52,00	50,00	1. Infekcije gornjeg donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20-J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N50, N54, N56; N57; N59). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu. Samo za obolele sa porемеćenim sluhom gornje i donje polovine recepta
1021600	J01CR02	amoksisilin kavolamska kiselina	PANIKLAV	film tableta	boćica staklena, 15 po 375 mg 250 mg + 125 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	330,70	1g	88,19	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20-J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N50, N54, N56; N57; N59). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
1021601	J01CR02	amoksisilin kavolamska kiselina	PANIKLAV	film tableta	boćica staklena, 20 po 625 mg 600 mg + 125 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	708,10	1g	70,81	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20-J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N50, N54, N56; N57; N59). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
1021607	J01CR02	amoksisilin kavolamska kiselina	PANIKLAV ZX	film tableta	tegetica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	396,00	1g	29,06	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20-J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N50, N54, N56; N57; N59). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
1021566	J01CR02	amoksisilin kavolamska kiselina	AMOKSIKLAV ZX	film tableta	boćica, 10 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska društva d.d.	Slovenija	354,10	1g	70,62	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20-J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N50, N54, N56; N57; N59). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
1021567	J01CR02	amoksisilin kavolamska kiselina	AMOKSIKLAV ZX	film tableta	boćica, 10 po (875 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska društva d.d.	Slovenija	254,30	1g	28,08	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20-J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N50, N54, N56; N57; N59). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
1021560	J01CR02	amoksisilin kavolamska kiselina	AMOKSIKLAV	film tableta	boćica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska društva d.d.	Slovenija	531,10	1g	70,81	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20-J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N50, N54, N56; N57; N59). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
1021592	J01CR02	amoksisilin kavolamska kiselina	AUGMENTIN	film tableta	14 po (875 mg + 125 mg)	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	441,70	1g	38,06	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20-J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N50, N54, N56; N57; N59). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.
1021561	J01CR02	amoksisilin kavolamska kiselina	KLAVOBEL	film tableta	boćica, 14 po (500mg+125mg)	Balkan (Jedov) farmaceutika d.o.o.	Hrvatska	465,70	1g	70,81	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20-J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N50, N54, N56; N57; N59). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	Samo za decu.



Lista A lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupljeno ime leka	FD	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1021852	J01CE02	amoksisilin, karbamonska kiselina	KLAVOBEL BID	firm tableta	blistar, 14 po (875mg+125mg)	Galepho (Belvo) / Koornika d.d	Hrvatska	358.00	1g	29.06	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N50, N34, N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H68). Samo za decu.	
3321875	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	prstak za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	168.80	2 g	67.52	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urinarnog trakta (N30, N34, N36, N37). 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na penicilinske peniciline (E.Coli, H. influenzae, Proteus). Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđni recepta. Samo za decu.	
1321870	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	kapsula, tvrda	blistar, 16 po 250 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	147.00	2 g	73.50	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urinarnog trakta (N30, N34, N36, N37). 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na penicilinske peniciline (E.Coli, H. influenzae, Proteus). Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđni recepta.	
1321872	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	kapsula, tvrda	blistar, 16 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	222.10	2 g	55.53	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urinarnog trakta (N30, N34, N36, N37). 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na penicilinske peniciline (E.Coli, H. influenzae, Proteus). Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđni recepta.	
3321719	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSN	granule za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	168.80	2 g	67.52	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urinarnog trakta (N30, N34, N36, N37). 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na penicilinske peniciline (E.Coli, H. influenzae, Proteus). Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđni recepta. Samo za decu.	
1321710	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSN	kapsula, tvrda	blistar, 16 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	147.00	2 g	73.50	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urinarnog trakta (N30, N34, N36, N37). 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na penicilinske peniciline (E.Coli, H. influenzae, Proteus). Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđni recepta.	
1321711	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSN	kapsula, tvrda	blistar, 16 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	222.10	2 g	55.53	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urinarnog trakta (N30, N34, N36, N37). 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na penicilinske peniciline (E.Coli, H. influenzae, Proteus). Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđni recepta.	





Lista A-lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Novi proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1321010	J01DB01	cefaleks	CEFALEXIN ALKALOID	kapsole, tvrde	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid s.d.	Republika Makedonija	222.10	2g	55.53	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije ušnognog trakta (N30, N34, N36, N37, N39). 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na penicilinske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđni recepta.
3321012	J01DB01	cefaleks	CEFALEXIN ALKALOID	prešani za oralnu suzpenziju	bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Alkaloid s.d.	Republika Makedonija	168.80	2g	67.52	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije ušnognog trakta (N30, N34, N36, N37, N39). 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na penicilinske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđni recepta. Samo za decu.
1321124	J01DB01	cefaleks	CEFALEXIN REMEDICA	kapsole, tvrde	blister, 16 po 500mg	Remedica Ltd	Kipar	222.10	2g	55.53	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije ušnognog trakta (N30, N34, N36, N37, N39). 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na penicilinske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđni recepta. Samo za decu.
3321994	J01DB05	cefaleks	VALDOCEF	granule za oralnu suzpenziju	boja staklena, 1 po 100ml (250mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	246.80	2g	88.64	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije ušnognog trakta (N30, N34, N36, N37, N39). 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na penicilinske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđni recepta. Samo za decu.
3321905	J01DB06	cefaleks	VALDOCEF	kapsole, tvrde	500mg, ukupno 16 kom, blister, 2 po 8 kom	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	394.50	2g	98.83	50.00	1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02, J03). 2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N50). 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačena lokalizacije (N53, N54).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđni recepta.
1321976	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 250 mg	Medico Unid o.o.	Republika Srbija	331.00	0.5 g	66.20	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30, N34). 4. Lajmska bolest (A68.2).	Samo za decu.
1321977	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 500 mg	Medico Unid o.o.p	Republika Srbija	466.30	0.5 g	46.63	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30, N34). 4. Lajmska bolest (A68.2).	Samo za decu.
1321956	J01DC02	cefuroksim	ZINIVAT	film tableta	blister, 14 po 500mg	Glavo Operators UK Limited	Velika Britanija	652.80	0.5 g	46.63	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30, N34). 4. Lajmska bolest (A68.2).	Samo za decu.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1321951	J01DC19	cefprozil	CEFZIL	granule za oralnu suspenziju	bočica 1 po 60 ml (250 mg/5 ml)	Corden Pharma Labna S.P.A.	Italija	841,80	1 g	280,60	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03, J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L01-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30, N34); 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65-H69). Samo za decu. Samo za decu i odrasle sa poremećenim aktinom gutanja što je potrebno naznačiti na pojedini recepta.	
1321950	J01DC19	cefprozil	CEFZIL	film tableta	blistar: 10 po 500 mg	Corden Pharma Labna S.P.A.	Italija	1.309,90	1 g	261,98	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03, J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L01-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30, N34); 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65-H69). Samo za decu.	
1321621	J01DD08	cefiksim	PANCEF	granule za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	708,60	0,4 g	141,92	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03, J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65-H69); 3. Urinarna infekcije (N30, N10; N30, N34).	
1321623	J01DD08	cefiksim	PANCEF	granule za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	425,80	0,4 g	141,93	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03, J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65-H69); 3. Urinarna infekcije (N30, N10; N30, N34).	
1321620	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blistar: 10 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	524,20	0,4 g	52,42	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03, J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65-H69); 3. Urinarna infekcije (N30, N10; N30, N34).	
1321622	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blistar: 5 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	262,10	0,4 g	52,42	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03, J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65-H69); 3. Urinarna infekcije (N30, N10; N30, N34).	
1321625	J01DD15	cefepidolim	TRIDOX	prosjeak za oralnu suspenziju	bočica 1 po 84,5 g (40 mg/5 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	350,40	0,4 g	175,20	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03, J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65-H69); 3. Urinarna infekcije (N30, N10; N30, N34).	

Lista A- lekovi koji se propisuju izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Način proizvodnja leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1321521	J01DD13	cefprozilom	TRIDOX	firm tableta	blister: 10 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	320.80	0.4 g	128.24	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01.J03, J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42); 2. Zapaletjenje srednjeg uha (H65.H66); 3. Umrnane infekcije (N00, N10, N30, N34). Samo za decu.	
1321523	J01DD13	cefprozilom	TRIDOX	firm tableta	blister: 10 po 200 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	641.50	0.4 g	128.30	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01.J03, J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42); 2. Zapaletjenje srednjeg uha (H65.H66); 3. Umrnane infekcije (N00, N10, N30, N34). Samo za decu.	
3026210	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BAC TRIM	sup.	bockice 1 po 100 ml (200 mg + 40 mg)5 ml	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	156.50	1.92 g	62.76	50.00		
1026211	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BAC TRIM	tableta	blister: 20 po 400 mg + 80 mg)	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	176.10	1.92 g	35.22	50.00		
1026131	J01EE01	sulfametoksazolnim etofrim	ESBESUL	tableta	blister: 20 po (400mg +80mg).	Bozartjek, DD	Bosna i Hercegovina	152.80	1.92g	30.59	50.00		
1325152	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN	firm tableta	blister: 20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	244.20	1 g	49.84	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J18.0, J20, J32, J40, J41, J42) 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnicom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1, A48.2). 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08) 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (J40.0). Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta	
1325153	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN	tableta	20 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	403.30	1 g	40.33	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J18.0, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnicom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1, A48.2). 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (J40.0). Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.	
1325550	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN	firm tableta	blister: 16 po 250 mg	Jugomedija a.d.	Republika Srbija	196.30	1 g	49.83	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J18.0, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnicom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1, A48.2). 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (J40.0). Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta	
1325551	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN	firm tableta	blister: 16 po 500 mg	Jugomedija a.d.	Republika Srbija	322.50	1 g	40.33	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J18.0, J20, J32, J40, J41, J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnicom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1, A48.2). 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (J40.0). Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta	

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
332555	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN	granule za oralnu suspenziju	bočica 1 po 100 ml (125 mg/5 ml)	Jugoslovena Srbija	Republika Srbija	498,90	1 g	163,40	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06, J15.7; J16.0, J20, J22, J40, J41, J42 ) 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.5 ) 3. Bolest legionara ( A48.1, A48.2 ) 4. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ) 5. Infekcije mokraćnih puteva ( N04 ) 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na peniciline ( J40.0 )	Za indikaciju pod tačkom 6 potrebno je naznačiti na poleđini recepta Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja do je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
332553	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN	granule za oralnu suspenziju	bočica 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Jugoslovena Srbija	Republika Srbija	663,70	1 g	136,74	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06, J15.7; J16.0, J20, J22, J40, J41, J42 ) 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.5 ) 3. Bolest legionara ( A48.1, A48.2 ) 4. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ) 5. Infekcije mokraćnih puteva ( N04 ) 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na peniciline ( J40.0 )	Za indikaciju pod tačkom 6 potrebno je naznačiti na poleđini recepta Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja do je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
1325095	J01FA03	indekamicin	MACROPEN	film tableta	blister 16 po 400 mg	Kina Toverna Zdravlje d.d	Slovenija	260,70	1 g	49,73	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06, J15.7; J16.0, J20, J22, J40, J41, J42 ) 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.5 ) 3. Bolest legionara ( A48.1, A48.2 ) 4. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ) 5. Infekcije mokraćnih puteva ( N04 ) 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na peniciline ( J40.0 )	Za indikaciju pod tačkom 6 potrebno je naznačiti na poleđini recepta
3325096	J01FA03	indekamicin	MACROPEN	granule za oralnu suspenziju	bočica 115 ml po 175 mg/5 ml	Kina Toverna Zdravlje d.d	Slovenija	423,90	1 g	105,32	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06, J15.7; J16.0, J20, J22, J40, J41, J42 ) 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.5 ) 3. Bolest legionara ( A48.1, A48.2 ) 4. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ) 5. Infekcije mokraćnih puteva ( N04 ) 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na peniciline ( J40.0 )	Za indikaciju pod tačkom 6 potrebno je naznačiti na poleđini recepta
1325300	J01FA06	roksitromicin	ROXIMSAN	film tableta	blister 10 po 150 mg	Slovenska d.o.o.	Republika Srbija	418,90	0,3 g	83,78	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06, J15.7; J16.0, J20, J22, J40, J41, J42 ) 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.5 ) 3. Bolest legionara ( A48.1, A48.2 ) 4. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ) 5. Infekcije mokraćnih puteva ( N04 ) 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na peniciline ( J40.0 )	Za indikaciju pod tačkom 6 potrebno je naznačiti na poleđini recepta. Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja do je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
2325625	J01FA09	kloramfenicol	KLACID	granule za oralnu suspenziju	bočica 1 po 80 ml (125 mg/5 ml)	Abelve S.r.l.	Italija	318,70	0,5 g	106,23	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06, J15.7; J16.0, J20, J22, J40, J41, J42 ) 2. Infekcije srednjeg ota ( H65, H66 ) 3. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ) 4. Infekcije mokraćnih puteva ( N04 ) 5. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na peniciline ( J40.0 )	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
1325056	J01FA09	kloramfenicol	ZIMBAKTAR	film tableta	14 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	222,00	0,5 g	31,71	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06, J15.7; J16.0, J20, J22, J40, J41, J42 ) 2. Infekcije srednjeg ota ( H65, H66 ) 3. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ) 4. Infekcije mokraćnih puteva ( N04 ) 5. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na peniciline ( J40.0 )	Samo za decu.

Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FO	Pakovanje i jacinma leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325611	J01FA09	Karbenicim	FROMILD	firm tableta	biser, 14 po 500 mg	Kika Tovarna Zdravl d.d.	Slovenija	361.60	0.5 g	26.83	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20-J22, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 4. Infekcije sekulari odnakaodpalabnog creva sa Helicobacter pylori (K23). 5. Infekcije izazovane Mycobacterium (A31.). Samo za decu.	
1325651	J01FA09	Karbenicim	FROMILD UNO	tableta sa prosluženim obojedanjem	biser, 7 po 500 mg	Kika, Tovarna Zdravl, d.d.	Slovenija	200.80	0.5 g	28.89	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20-J22, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 4. Infekcije sekulari odnakaodpalabnog creva sa Helicobacter pylori (K23). 5. Infekcije izazovane Mycobacterium (A31.). Samo za decu.	
1325653	J01FA09	Karbenicim	FROMILD UNO	tableta sa prosluženim obojedanjem	biser, 14 po 500 mg	Kika, Tovarna Zdravl, d.d.	Slovenija	401.70	0.5 g	28.89	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20-J22, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 4. Infekcije sekulari odnakaodpalabnog creva sa Helicobacter pylori (K23). 5. Infekcije izazovane Mycobacterium (A31.). Samo za decu.	
1325675	J01FA09	Karbenicim	KIACID	firm tableta	biser, 14 po 500 mg	AubVie S.r.l.	Italija	361.60	0.5 g	26.83	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20-J22, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije sekulari odnakaodpalabnog creva sa Helicobacter pylori (K23). 5. Infekcije izazovane Mycobacterium (A31.). Samo za decu.	
1325677	J01FA09	Karbenicim	KIACID MR	firm tablete sa modifikovanim oslobadanjem	biser, 7 po 500 mg	AubVie S.r.l.	Italija	200.80	0.5 g	28.89	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20-J22, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije sekulari odnakaodpalabnog creva sa Helicobacter pylori (K23). 5. Infekcije izazovane Mycobacterium (A31.). Samo za decu.	
3325483	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prasilik za oralnu suspenziju	bocka staklena, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	136.20	0.3 g	102.15	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20, J22, J40, J41, J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije sekulari odnakaodpalabnog creva sa Helicobacter pylori (K23). 4. Infekcije izazovane Chlamydia-ma (A55, A56). 5. Negonakoin urethritis (N34.1). 6. Gonohis (N72). Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim alikom gutanja.	
3325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prasilik za oralnu suspenziju	bocka staklena, 1 po 30 ml (200 mg/6 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	244.30	0.3 g	61.09	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20, J22, J40, J41, J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije sekulari odnakaodpalabnog creva sa Helicobacter pylori (K23). 4. Infekcije izazovane Chlamydia-ma (A55, A56). 5. Negonakoin urethritis (N34.1). 6. Gonohis (N72). Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim alikom gutanja.	

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / jedinica leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325471	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 125	film tableta	blistar, 6 po 125 mg	Pika Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	398.10	0.3 g	169.24	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20, J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije koboza ili mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydiae-ns (A55, A56). 5. Neorganizovani urethritis (N34.1). 6. Cervicitis (N72). Samo za decu.	Samo za decu.
1325480	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	kapsula, tvrdi	blistar, 6 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	210.70	0.3 g	42.14	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20, J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije koboza ili mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydiae-ns (A55, A56). 5. Neorganizovani urethritis (N34.1). 6. Cervicitis (N72). Samo za decu.	Samo za decu.
1325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	film tableta	blistar, 3 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	192.50	0.3 g	39.50	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20, J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije koboza ili mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydiae-ns (A55, A56). 5. Neorganizovani urethritis (N34.1). 6. Cervicitis (N72). Samo za decu.	Samo za decu.
1325470	J01FA10	azitromicin	SUMAMED KAPSULE	kapsula, tvrdi	blistar, 6 po 250 mg	Pika Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	210.70	0.3 g	42.14	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20, J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije koboza ili mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydiae-ns (A55, A56). 5. Neorganizovani urethritis (N34.1). 6. Cervicitis (N72). Samo za decu.	Samo za decu.
1325472	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 500	film tableta	blistar, 3 po 500 mg	Pika Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	192.50	0.3 g	39.50	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20, J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije koboza ili mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydiae-ns (A55, A56). 5. Neorganizovani urethritis (N34.1). 6. Cervicitis (N72). Samo za decu.	Samo za decu.
1325541	J01FA10	azitromicin	AZIBIDT	film tableta	blistar, 3 po 500 mg	Štavnica d.o.o. u saradnji sa Pika Tovarima Zdravlja d.o.o. Slovenija	Republika Srbija	192.50	0.3 g	39.50	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20, J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije koboza ili mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydiae-ns (A55, A56). 5. Neorganizovani urethritis (N34.1). 6. Cervicitis (N72). Samo za decu.	Samo za decu.
1325572	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN	film tableta	blistar, 3 po 500 mg	Special Product's Line S.P.A.	Italija	192.50	0.3 g	39.50	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20, J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije koboza ili mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydiae-ns (A55, A56). 5. Neorganizovani urethritis (N34.1). 6. Cervicitis (N72). Samo za decu.	Samo za decu.
1325526	J01FF01	kloridamin	CLINDAMYCINAMP	film tableta	blistar, 12 po 300 mg	Chiropharm Chem Pharm.	Nemacka	261.50	1.2 g	87.17	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20, J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije koboza ili mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydiae-ns (A55, A56). 5. Neorganizovani urethritis (N34.1). 6. Cervicitis (N72). Samo za decu.	Samo za decu.



Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jacinna leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranih lica	Indikacija	Napomena
1329229	J01FF01	Mindamicin	CINDAMYCIN/MIP	film tableta	biseri, 12 po 600 mg	Chempasaar Chem. Pharm.	Nemačka	490.10	1.2 g	81.69	50.00		Samo za decu.
1329222	J01FF01	Mindamicin	CINDAMYCIN/MIP	film tableta	biseri, 30 po 600 mg	Chempasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1.225.20	1.2 g	81.69	50.00		Samo za decu.
1329450	J01MA02	Ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	tableta	10 po 250 mg	Jugomedija a.d.	Republika Srbija	170.80	1 g	69.24	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonella (A02), Shigellae (A03). 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcije respiratornog trakta izazvane uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7). 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39, N72). 5. Zapušeno srednjeg uha (H65).	
1329452	J01MA02	Ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	tableta	10 po 500 mg	Jugomedija a.d.	Republika Srbija	309.20	1 g	61.94	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonella (A02), Shigellae (A03). 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7). 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39, N72). 5. Zapušeno srednjeg uha (H65).	
1329451	J01MA02	Ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	tableta	20 po 250 mg	Jugomedija a.d.	Republika Srbija	341.20	1 g	69.24	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonella (A02), Shigellae (A03). 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7). 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39, N72). 5. Zapušeno srednjeg uha (H65).	
1329453	J01MA02	Ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	tableta	20 po 500 mg	Jugomedija a.d.	Republika Srbija	619.40	1 g	61.94	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonella (A02), Shigellae (A03). 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7). 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39, N72). 5. Zapušeno srednjeg uha (H65).	
1329490	J01MA02	Ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	film tableta	biseri, 10 po 250 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	170.80	1 g	69.24	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonella (A02), Shigellae (A03). 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcije respiratornog trakta izazvane uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7). 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39, N72). 5. Zapušeno srednjeg uha (H65).	

Lista A lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / pakma leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Meropema
1329402	J01MA02	Ciprofloksacin	CIPROFLOXAL	firm tableta	biser, 10 po 500 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	309,20	1 g	61,84	50,00	1. Zrazane bolasti oreva izazovane uzročnikom Salmonella (A02), Shigelle (A03). 2. Infekcije izazovane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazovana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7). 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N38; N72). 5. Zapažanje srednjeg uha (H66).	
1329410	J01MA02	Ciprofloksacin	MAROCEN	firm tableta	biser, 10 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	170,60	1 g	68,24	50,00	1. Zrazane bolasti oreva izazovane uzročnikom Salmonella (A02), Shigelle (A03). 2. Infekcije izazovane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazovana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7). 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N38; N72). 5. Zapažanje srednjeg uha (H66).	
1329411	J01MA02	Ciprofloksacin	MAROCEN	firm tableta	biser, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	309,20	1 g	61,84	50,00	1. Zrazane bolasti oreva izazovane uzročnikom Salmonella (A02), Shigelle (A03). 2. Infekcije izazovane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazovana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7). 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N38; N72). 5. Zapažanje srednjeg uha (H66).	
1329400	J01MA02	Ciprofloksacin	CITEPAL	firm tableta	biser, 10 po 250 mg	Alkaid d.o.o.	Republika Srbija	170,60	1 g	68,24	50,00	1. Zrazane bolasti oreva izazovane uzročnikom Salmonella (A02), Shigelle (A03). 2. Infekcije izazovane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazovana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7). 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N38; N72). 5. Zapažanje srednjeg uha (H66).	
1329401	J01MA02	Ciprofloksacin	CITEPAL	firm tableta	biser, 10 po 500 mg	Alkaid d.o.o.	Republika Srbija	309,20	1 g	61,84	50,00	1. Zrazane bolasti oreva izazovane uzročnikom Salmonella (A02), Shigelle (A03). 2. Infekcije izazovane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazovana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7). 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N38; N72). 5. Zapažanje srednjeg uha (H66).	
1329511	J01MA02	Ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN REMEDICA	firm tableta	biser, 10 po 250 mg	Remedica Ltd	Kipar	170,60	1 g	68,24	50,00	1. Zrazane bolasti oreva izazovane uzročnikom Salmonella (A02), Shigelle (A03). 2. Infekcije izazovane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazovana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7). 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N38; N72). 5. Zapažanje srednjeg uha (H66).	



Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje / jačina leka	Novi proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
132951D	J01MA02	Ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN REMEDIKA	firm tableta	blistar, 10 po 500 mg	Remedica Ltd	Kipar	309,20	1 g	61,84	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonelle (A02), Shigelle (A03). 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycobacterium pneumoniae J15.7. 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39; N72). 5. Zapažanje srednjeg uha (H66).	
132950G	J01MA02	Ciprofloksacin	CIPRINOL	firm tableta	blistar, 10 po 250 mg	Kika, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	170,60	1g	69,24	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonella (A02), Shigelle (A03). 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycobacterium pneumoniae J15.7. 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36; N37; N39; N72). 5. Zapažanje srednjeg uha (H66).	
132920I	J01MA02	Ciprofloksacin	CIPRINOL	firm tableta	blistar, 10 po 500 mg	Kika, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	309,20	1g	61,84	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonelle (A02), Shigelle (A03). 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycobacterium pneumoniae J15.7. 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36; N37; N39; N72). 5. Zapažanje srednjeg uha (H66).	
132920S	J01MA02	Ciprofloksacin	CIPRINOL	firm tableta	blistar, 10 po 750 mg	Kika, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	511,90	1g	68,25	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonella (A02), Shigelle (A03). 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycobacterium pneumoniae J15.7. 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36; N37; N39; N72). 5. Zapažanje srednjeg uha (H66).	
1132950	J01MA06	honioksalcin	URICIN	firm tableta	blistar, 20 po 400 mg	Stemmed d.o.o.	Republika Srbija	427,30	0,8 g	42,73	50,00		
113218I	J01MA06	honioksalcin	NOILICIN	firm tableta	blistar, 20 po 400mg	Kika, Tovarna, Zdravil, d	Slovenija	427,30	800 mg	42,73	50,00		
102969S	J04AB02	rimfampin	RIFAMOR	kapsule, tvrdak	blistar, 16 po 300 mg	Colentika s.d	Republika Srbija	387,60	0,9 g	49,70	50,00		
1329230	J05AB01	acetikvir	ACIKLOVIR	tableta	blistar, 25 po 200 mg	Zdravko d.d	Republika Srbija	601,40	4 g	64,12	50,00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster ( B02.3 ). 2. U približni bolovnik za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94.1). 3. Akutni herpes zoster izazvan virusom Herpes simplex (B02). 4. Herpes zoster (B02), Varicella (B01).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa pod nadzorom lekara. Lek se koristi tek nakon što je potvrđeno da je uzročnik infekcije virus Herpes zoster (B02). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja. 1. Klinike za infektivne i respirne bolesti Kliničkog centra Srbije 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra BiH. 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
132957Z	J05AE01	salkvinaur	INURPASE	firm tableta	120 po 500 mg	Roche Pharma S.A., F. Hoffmann - La Roche Ltd.	Švajcarska	32.412,30	1,8 g	979,37	50,00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328621	J05AF10	lopranvir, itonavir	ALUVIA	film tableta	bočica, 30 po 100 mg + 50 mg	Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG	Nemačka	7.928,80	-	-	50,00	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Kliničkog centra Srbije 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328622	J05AF10	lopranvir, itonavir	ALUVIA	film tableta	bočica, 30 po 100 mg + 50 mg	Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG	Nemačka	3.983,70	-	-	50,00	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Kliničkog centra Srbije 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328617	J05AE03	itonavir	NCRVIR	film tableta	bočica, 30 po 100 mg	Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG	Nemačka	2.442,10	1,2 g	976,84	50,00	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Kliničkog centra Srbije 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328620	J05AE07	fosamprenavir	FELZIR	film tableta	bočica, 80 po 800 mg	Glaxo Wellcome Operations - Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija, Španja	34.961,90	1,4 g	1.182,08	50,00	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Kliničkog centra Srbije 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328612	J05AE10	danunavir	PREZISTA	film tableta	bočica, 80 po 800 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	70.141,40	1,2 g	2.338,05	50,00	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Kliničkog centra Srbije 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328611	J05AF01	zidovudin	ZIDOSAN	kapsule, tvrde	bočica, 100 po 100 mg	Stemmed d.o.o.	Republika Srbija	8.407,50	0,6 g	504,45	50,00	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Kliničkog centra Srbije 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328605	J05AF02	zidovudin	VIDEX EC	gastroresistentna kapsula, tvrda	blister, 30 po 400 mg	Bristol Myers Squibb S.R.L. - Avca - Quimperbrough Limited	Italija, Velika Britanija	16.780,50	0,4 g	559,68	50,00	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Kliničkog centra Srbije 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328612	J05AF04	zidovudin	ZERIT	kapsula, tvrda	blister, 56 po 30 mg	Bristol Myers Squibb S.R.L. - Avca - Quimperbrough Limited	Italija, Velika Britanija	13.948,40	80 mg	664,21	50,00	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Kliničkog centra Srbije 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.



Lista A- lekovi koji se propisuju u izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FO	Pakovanje / Jedinica leka	Naziv proizlodaoca leka	Dzava proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DOD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućica	Indikacija	Napomena
1328578	J05AF05	tenofovir	ZEFFIX	film tableta	28 po 100 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Glaxo Wellcome Operations	Pojedna, velika Birmaja	5.084,10	0,3 g	548,40	50,00	1. Hepatitis B ( B16.2; B16.9 ), teške forme akutnog hepatisa B ( B18.1 ), subakutni hepatitis virusa hepatisa B ( B18.1 ), hronični hepatitis kompenzirani ( K74.6 ), dekompenzovana ciroza jetre ( K74.6 ) 2. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivni na hemodializi sa transplantiranim organima i detrima - sa obli hronične, oboljenja jetre izazvanih virusom hepatisa B ( B18.1 ), hronični hepatitis HBsAg - hronični hepatitis kompenzirani i dekompenzovana ciroza jetre, zrenaviti HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg- Hronična HBV infekcija: a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci b) prisutna replikacija virusa ( HBV DNA-PCR u titru > 10 000 kopije/ml serumne ) c) biopsijski povišena aktivnost transaminaza ( ALT ) > 2x iznad normalne vrednosti d) jedna kontaminacija iz preosetljivost na Zeffix	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa iz specializovano.
1328575	J05AF05	tenofovir	EPIVIR	film tableta	bockica plastika, 60 po 150 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Glaxo Wellcome Operations	Pojedna, velika Birmaja	8.980,30	0,3 g	288,34	50,00	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328530	J05AF06	abatacept	ZIAGEN	film tableta	biser, 60 po 300 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Glaxo Wellcome Operations	Pojedna, velika Birmaja	25.312,00	0,6 g	843,73	50,00	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328500	J05AF07	tenofovir	VIREAD	film tableta	bockica 30 po 245 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Glaxo Wellcome Operations	Iska	31.413,30	0,245 g	1.047,11	50,00	1. Hronični hepatitis B ( B16.2; B16.9; B18.1 ); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na prototipna antiretrovirna lekova ( B20; B21; B22; B23; B24 )	Za indikaciju pod tačkom 1 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojvođarske akademije (VMA) Za indikaciju pod tačkom 2 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.



Lista A lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
1328501	J05AF07	tenofovir	GILESTRA	film tableta	boca plastična, 30 po 245 mg	Remedica LTD	Kipar	19.761,30	0,245g	658,98	50,00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na prototipičke antiretrovirne lekove (B20; B21; B22; B23; B24);	Za indiciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropike bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac; 5. Vajromedicinske akademije (VMA).
1328980	J05AD01	nevirapin	VIRAMUNE	tableta	blister, 60 po 200 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	3.747,70	0,4 g	124,92	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropike bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328993	J05AG03	efavirenz	STOGRN	film tableta	boca plastična, 30 po 600 mg	Meck Sharp & Dohme	Holandija	22.046,70	600 mg	753,52	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropike bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328940	J05AR01	zidovudin, lamivudin	COMBIVIR	film tableta	blister, 60 po (300 mg + 150 mg)	Glaxo Operations UK Limited, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Velika Britanija, Poljska	18.395,60	2 tablete	613,19	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropike bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328901	J05AR02	abakavir, lamivudin	KIVEXA	film tableta	blister, 30 po (600 mg + 300 mg)	Glaxo Wellcome Operations, Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija, Španija	35.239,80	1 tableta	1.208,00	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropike bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328442	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	TRUVADA	film tableta	boca, 30 po (245mg+200mg)	Glaxo Sciences Ltd	Irsko	35.005,40	1 tableta	1.200,31	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropike bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328502	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	GILESTRA DUO	film tableta	boca plastična, 30 po (245 mg+200mg)	Remedica LTD	Kipar	25.977,90	1 tableta	845,60	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropike bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328960	J05AA09	zidovudin	ISENTRESS	film tableta	boca, 60 po 400 mg	Meck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	59.684,10	0,0 g	1.989,47	50,00	HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na prototipičke antiretrovirne lekove (B20; B21; B22; B23; B24);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropike bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje / Jedinica leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka po veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329657	J06AX08	maraviroc	CELESENTRI	film tableta	blister, 60 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemacka	77.349,60	0,6 g	6.195,67	50,00	HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju otkazani prvobitni virus za CCR5 koreceptor (B20, B21, B22, B23, B24).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropiske bolesti, Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti, Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti, Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti, Kliničkog centra Kragujevac.
1329658	J06AX08	maraviroc	CELESENTRI	film tableta	blister, 60 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemacka	77.349,60	0,6 g	2.678,29	50,00	HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju otkazani prvobitni virus za CCR5 koreceptor (B20, B21, B22, B23, B24).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropiske bolesti, Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti, Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti, Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti, Kliničkog centra Kragujevac.
1329659	J06AX12	raltegravir	TMCAY	film tableta	bočica, 30 po 50mg	Gilead Wellcome S.A.	Spanja	64.169,30	50mg	2.139,94	80,00	HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20, B21, B22, B23, B24).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropiske bolesti, Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti, Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti, Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti, Kliničkog centra Kragujevac.
1030223	L01CB01	etopozid	LASTEI CAP 25	kapsula	blister, 40 po 25 mg	Nippon Kyaku Co. Ltd	Japan	12.300,10	-	-	50,00	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za hematologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Univerzitetna dečja klinika, Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukam Čupić".	
1030222	L01CB01	etopozid	LASTEI CAP 60	kapsula	blister, 20 po 60 mg	Nippon Kyaku Co. Ltd	Japan	10.203,70	-	-	50,00	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za hematologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Univerzitetna dečja klinika, Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukam Čupić".	
1030285	L01XX05	hidroksikarbamid	LITALIR	kapsula, tvrdi	bočica, 100 po 500 mg	Coradin Pharma Lubna S.P.A.	Italija	2.087,50	-	-	50,00	Hronična mijeloproliferativna bolest (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za hematologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Univerzitetna dečja klinika, Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukam Čupić".
1030284	L01XX05	hidroksikarbamid	HIDROKSIKARBAMID	kapsula, tvrdi	blister, 100 po 500 mg	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate W.B.H	Nemacka	2.087,50	-	-	50,00	Hronična mijeloproliferativna bolest (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za hematologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Univerzitetna dečja klinika, Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukam Čupić".

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupljeno ime leka	FD	Pakovanje (jačina leka)	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1031043	L01XX11	estramustin	ESTRACYT	kapsule	100 po 140 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	12.556,70	-	-	50,00	Kardiovaskularni, humorni refraktorni, u skladu sa kontraindikacijama za primenu docetaxela, PS D-1 u 2	Lek se uvodi u terapiju na osnovu nalaza ili lekova slededh zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za urologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Institut za onkologiju Vojvodine, Klinika za onkologiju KC Vojvodine, Klinika za onkologiju KC NIS, KC Dragoljevac
3048812	L02AB01	megestrol	MEGACE	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)	Anderssonhecon (UK) PharmaSwiss d.o.o. Ljubljana	Velika Britanija Slovenija	6.045,90	160 mg	100,77	50,00	Terapija neovojnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa refraktoričnim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmak u malignu bolest i u hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormoni-refraktornu fazu, običkvano prethranjenje preko 2 meseca. PS D-2, kao i značajan gubitak težine ili značajan neovojni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
1048813	L02AB01	megestrol	MEGACE	tableta	boćica, 30 po 160 mg	Haupt Pharma Amareg GmbH, PharmaSwiss d.o.o.	Nemacka; Slovenija	4.894,80	160 mg	166,49	50,00	Terapija neovojnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa refraktoričnim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmak u malignu bolest i u hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormoni-refraktornu fazu, običkvano prethranjenje preko 2 meseca. PS D-2, kao i značajan gubitak težine ili značajan neovojni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
3048815	L02AB01	megestrol	MEGEXI	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	6.045,90	160 mg	100,77	50,00	Terapija neovojnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa refraktoričnim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmak u malignu bolest i u hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormoni-refraktornu fazu, običkvano prethranjenje preko 2 meseca. PS D-2, kao i značajan gubitak težine ili značajan neovojni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
1038895	L02BA01	tamoksifen	TAMOXIFEN	tableta	strip, 30 po 10 mg	Remedica Ltd	Kipar	220,80	20 mg	14,72	50,00		
1038901	L02BA01	tamoksifen	TAMOXIFEN SANDOZ	firm tableta	blister, 30 po 10 mg	Sulitas Pharma GmbH	Nemacka	220,80	20 mg	14,72	50,00		

Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039000	L02BA01	tamoksifen	TAMOKSIFEN SANDOZ	film tableta	biser, 30 po 20 mg	Solutes Pharma GmbH	Nemačka	470,30	30 mg	15,68	60,00		
1037076	L02BB03	bikalutamid	BICADEX	film tableta	biser, 28 po 50 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.042,10	50 mg	72,93	60,00	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analogne) ili hiruršku kastraciju (CS1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu najsveže bi lekova - urologa zadržavane uzdatove koje obavlja zdravstveni radnik na tercijarnom nivou
1037350	L02BB03	bikalutamid	BICALUTAMID PUNVA	film tableta	biser, 28 po 50 mg	Pika Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	2.042,10	50 mg	72,93	60,00	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analogne) ili hiruršku kastraciju (CS1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu najsveže bi lekova - urologa zadržavane uzdatove koja obavlja zdravstveni radnik na tercijarnom nivou
1037300	L02BB03	bikalutamid	BELANTIS	film tableta	biser, 30 po 50 mg	Stade Arzneimittel AG	Nemačka	2.188,00	50 mg	72,93	60,00	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analogne) ili hiruršku kastraciju (CS1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu najsveže bi lekova - urologa zadržavane uzdatove koje obavlja zdravstveni radnik na tercijarnom nivou



Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / pakma leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravanih lica	Indikacija	Napomena
L03B02	L03B02	anastrozol	TRASOLETTE	firm tableta	blistar, 28 po 1 mg	PharmSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.389,90	1 mg	49,64	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzalnim bolesnicima. PS O ili I, završeci suha, posele ili godine primene adjuvantne hormonske terapije. Simptomatični, kao i asimptomatski adjuvantnog lečenja. Trajanje 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzalnih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija lamksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzalnim bolesnicima, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podložne za primenu adjuvantne terapije lamksifenom. Ova bolesnica se mogu uključiti u klinička ispitivanja koja istražuju efikasnost od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzalne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri poqvak prvog relapsa bolesti na adjuvantno II sistemski primenjen 3. Kao prva linija sistemske II adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili hipertenzija) ili u kombinaciji sa tamoksifenom u kombinaciji u anamnezi ili prisutju neželjenih reakcija na tamoksifen (oboznažen medikamentna alergija hiperplazija ili polje endometrijuma, dokazani hipertenzijski, hipotenzijski, meteosensibilni, i drugi simptomi).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zadržavaneu obilnosti na tercijarnom nivou zadržavane zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zadržavane ustanove koja obavlja zadržavaneu obilnosti na sekundarnom ili tercijarnom nivou zadržavane zaštite.
L03B03	L03B03	anastrozol	AREMED	firm tableta	blistar, 28 po 1 mg	Remedica Ltd	Niger	1.389,90	1 mg	49,64	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzalnim bolesnicima. PS O ili I, završeci suha, posele ili godine primene adjuvantne hormonske terapije. Simptomatični, kao i asimptomatski adjuvantnog lečenja. Trajanje 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzalnih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija lamksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzalnim bolesnicima, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podložne za primenu adjuvantne terapije lamksifenom. Ova bolesnica se mogu uključiti u klinička ispitivanja koja istražuju efikasnost od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzalne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri poqvak prvog relapsa bolesti na adjuvantno II sistemski primenjen 3. Kao prva linija sistemske II adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili hipertenzija) ili u kombinaciji sa tamoksifenom u kombinaciji u anamnezi ili prisutju neželjenih reakcija na tamoksifen (oboznažen medikamentna alergija hiperplazija ili polje endometrijuma, dokazani hipertenzijski, hipotenzijski, meteosensibilni, i drugi simptomi).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zadržavaneu obilnosti na tercijarnom nivou zadržavane zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zadržavane ustanove koja obavlja zadržavaneu obilnosti na sekundarnom ili tercijarnom nivou zadržavane zaštite.





Lista A-lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućeg fonda	Indikacija	Napomena
1039371B	L02BG05	amastrozol	ALTRAVESA	firm tableta	bistar, 28 po 1mg	Cellpharm GmbH, Siegfried Genetec (Mabla) Ltd.; Hauptpharma Munster GmbH.; Studis Arzneimittel	Nemačka, Maika, Nemačka, Nemačka	1.389,80	1mg	49,84	80,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzalnih bolesnica, PS O i I, sekvestrajno, posle tri godine primene adjuvantne hormonalne terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovog se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzalnih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih se sa sprovođi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzalnih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podložne za primenu adjuvantne terapije inhibicije aromataze od početka adjuvantnog hormonalnog lečenja u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzalne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri počin prvog relapsa bolesti na adjuvantno II sistemski primenjen. 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI i embolija u anamnezi) ili pojava neželjenih reakcija na tamoksifen dokazani medikamentozna alopecija i hiperpigmentacija lica, pod endometrijuma dokazani histopatazijski. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ili lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.	
1039331	L02BG04	letrozol	FEMOZOL	firm tableta	bistar, 30 po 2,5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.114,90	2,5 mg	37,16	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzalnih bolesnica, PS O i I, sekvestrajno, posle tri godine primene adjuvantne hormonalne terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovog se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzalnih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih se sa sprovođi terapije tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzalnih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podložne za primenu adjuvantne terapije inhibicije aromataze od početka adjuvantnog hormonalnog lečenja u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzalne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri počin prvog relapsa bolesti na adjuvantno II sistemski primenjen. 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI i embolija u anamnezi) ili pojava neželjenih reakcija na tamoksifen dokazani medikamentozna alopecija i hiperpigmentacija lica, pod endometrijuma dokazani histopatazijski. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ili lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / pakma leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lici	Indikacija	Napomena
1093033	L02BG04	letrozol	LETROZOLE PHARMA SWISS	film tableta	blister, 28 po 2,5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.040,90	2,5 mg	37,16	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzalnim bolesnicama, PS O ili I, sekventno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije (tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog bolovanja ili do kraja 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzalnih žena, sa niskim rizikom za relapsa bolesti, kod kojih se ne sprovodi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzalnim bolesnicama, sa svakim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podvrgnute primeni adjuvantne terapije (tamoksifenom ili letrozolom), ali su podvrgnute sistemu tretmana od početka adjuvantnoj hormonskog bolovanja u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzalne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojava prvog relapsa bolesti na adjuvantno i sistemski primenjen tamoksifen. 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili hipertenzija). 4. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije na embolija u anamnezi ili pojava međuležnih reakcija na tamoksifen izazvana mešovitimne alogije. Hiperplazija kifi polu, endometrijalna dokazani histopatološki. 5. Postmenopauzalne bolesnice sa karcinomom dojke u sekundarnom ili tercijarnom nivou zloćudnosti.	
1093030	L02BG04	letrozol	LEZRA	film tableta	blister, 30 po 2,5mg	Zdravje u.d., S.C. Sardan-Pharma S.R.L.	Republika Srbija	1.114,90	2,5mg	37,16	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzalnim bolesnicama, PS O ili I, sekventno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog bolovanja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzalnih žena, sa niskim rizikom za relapsa bolesti, kod kojih se ne sprovodi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzalnim bolesnicama, sa svakim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podvrgnute primeni adjuvantne terapije (tamoksifenom ili letrozolom), ali su podvrgnute sistemu tretmana od početka adjuvantnoj hormonskog bolovanja u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzalne bolesnice sa karcinomom dojke, pri pojava prvog relapsa bolesti na adjuvantno i sistemski primenjen tamoksifen. 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili hipertenzija). 4. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije na embolija u anamnezi ili pojava međuležnih reakcija na tamoksifen izazvana mešovitimne alogije. 5. Postmenopauzalne bolesnice sa karcinomom dojke u sekundarnom ili tercijarnom nivou zloćudnosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu međuležnih reakcija ili lekova zloćudnosti u uzrastu koje obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zloćudnosti u uzrastu koje obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zloćudnosti sa šifom.	



Lista A. lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućica	Indikacija	Napomena
1099339	L02BG04	relorzel	SILETRIS	firm tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Tecnimed, Societate tehnice Medica S.A., Cetil Pharm GmbH, Haupt Pharma Munster GmbH	Portugalija Nemačka	1.114,90	2,5mg	37,16	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzalnih bolesnica, PS O i I, sekvent: jača, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja ili u drugom godišnjem ciklusu. Od ovog se izuzimaju bolesnice sa sekundarnim karcinomom dojke kod postmenopauzalnih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih se sa sprovođi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranih steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzalnih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podložne za primenu adjuvantne terapije i blokade progesterona za primenu adjuvantne terapije i blokade progesterona u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzalne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri počinju prvog relapsa bolesti na adjuvantno II sistemski tamoksifen. 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI) i koje imaju znakove ili pojave neželjenih reakcija na tamoksifen (obimna medijastinalna adenopatija i hepatička ili/ili pod endometrijalna dokazana histopatološki). Ponašanje: jača metrazija.	Lik se upotrebljava u terapiji na osnovu podjela tri lekova: zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu podjela lekova specijalnih zdravstvenih ustanove koje obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1099329	L02BG04	relorzel	AVOMIT	firm tableta	blister, 30 po 2,5mg	Teva Pharmaceuticals Wiesbaden Limited Company Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Pika Hrvatska d.o.o.	Madžarska, Izrael Hrvatska	1.114,90	2,5mg	37,16	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzalnih bolesnica, PS O i I, sekvent: jača, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja ili u drugom godišnjem ciklusu. Od ovog se izuzimaju bolesnice sa sekundarnim karcinomom dojke kod postmenopauzalnih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih se sa sprovođi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranih steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzalnih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podložne za primenu adjuvantne terapije i blokade progesterona za primenu adjuvantne terapije i blokade progesterona u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzalne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri počinju prvog relapsa bolesti na adjuvantno II sistemski tamoksifen. 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI) i koje imaju znakove ili pojave neželjenih reakcija na tamoksifen (obimna medijastinalna adenopatija i hepatička ili/ili pod endometrijalna dokazana histopatološki). Ponašanje: jača metrazija.	Lik se upotrebljava u terapiji na osnovu podjela tri lekova: zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu podjela lekova specijalnih zdravstvenih ustanove koje obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.



Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućeg lica	Indikacija	Napomena
1039002	L02BG04	letrozol	LORTANDA	firm tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Kika, Tovarna Zdrav d.d	Slovenija	1.114,90	2,5 mg	37,16	50,00	<p>Karcinom dojke:</p> <p>1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzalnih bolesnica, PS O II, sekvenca 1. iho, prve tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovdoga se uzimaju bolesnice sa:</p> <p>a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzalnim bolesnicama, sa niskim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu pridobre za primenu adjuvantne terapije i bićke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitor aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju od 5 godine;</p> <p>2. Rani metastatski karcinom dojke sa steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke, pri početku prvog relapsa bolesti na adjuvantno i i sistemski primenjen tamoksifen;</p> <p>3. Kao prva linija sistemske i adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolije u anamnezi) ili pojava neželjenih reakcija na tamoksifen (obimna i produljena alergija, hepatotoksičnost, poremećaji endometrija, oštećenje hepatotoksičnosti, poremećaji mehanizma).</p>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ili lekara zbiravljene ustanove koja obavlja zbiravljenu službu na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zbiravljene ustanove koja obavlja zbiravljenu službu na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039003	L02BG04	letrozol	LORTANDA	firm tableta	blister, 60 po 2,5 mg	Kika, Tovarna Zdrav d.d	Slovenija	2.229,80	2,5 mg	37,16	50,00	<p>Karcinom dojke:</p> <p>1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzalnih bolesnica, PS O II, sekvenca 1. iho, prve tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovdoga se uzimaju bolesnice sa:</p> <p>a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzalnih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovođiti terapija tamoksifenom do 5 godina;</p> <p>b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzalnim bolesnicama, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu pridobre za primenu adjuvantne terapije i bićke terapije u trajanju od 5 godina;</p> <p>2. Postmenopauzalne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri početku prvog relapsa bolesti na adjuvantno i i sistemski primenjen tamoksifen;</p> <p>3. Kao prva linija sistemske i adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolije u anamnezi) ili pojava neželjenih reakcija na tamoksifen (obimna i produljena alergija, hepatotoksičnost, poremećaji endometrija, oštećenje hepatotoksičnosti, poremećaji mehanizma).</p>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ili lekara zbiravljene ustanove koja obavlja zbiravljenu službu na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zbiravljene ustanove koja obavlja zbiravljenu službu na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastigeno ime leka	FO	Pakovanje / Jedinica leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućeg fonda	Indikacija	Napomena
1039004	L02B04	letrozol	LORTANDA	firm tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Kika, Tovarna Zdrav d.o.o.	Slovenija	3.344,70	2,5 mg	37,16	50,00	<p>Karcinom dojke:</p> <p>1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzalnim bolesnicama, PS O i I, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:</p> <p>a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzalnih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih se sa sprovođenjem terapije lamoksifenom do 5 godina;</p> <p>b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzalnim bolesnicama, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podložne za primenu adjuvantne terapije tamoksifenom. Kod ovih bolesnica se sa primenom inhibitora aromataze od početka adjuvantnog lečenja u trajanju do 5 godina.</p> <p>2. Postmenopauzalne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri poqiv prvog relapsa bolesti na adjuvantno II sistemski primenjen tamoksifen.</p> <p>3. Kao prva linija sistemske II adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili poqivu neželjenih reakcija na tamoksifen dokazane medikamentne alergije.</p> <p>Hyperplazija žlijezde endometrijuma dokazani histopatološki.</p> <p>ponavljajuće metostaze.</p>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane uslovove koja obaveja zadržavane obilnosti na tercijarnom nivou zadržavane zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara zadržavane zaštite, a nastavak terapije koja obaveja zadržavane obilnosti na sekundarnom ili tercijarnom nivou zadržavane zaštite.
1039006	L02B04	letrozol	LORTANDA	firm tableta	blister, 100 po 2,5 mg	Kika, Tovarna Zdrav d.o.o.	Slovenija	3.716,30	2,5 mg	37,16	50,00	<p>Karcinom dojke:</p> <p>1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzalnim bolesnicama, PS O i I, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:</p> <p>a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzalnih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih se sa sprovođenjem terapije lamoksifenom do 5 godina;</p> <p>b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzalnim bolesnicama, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod kojih se sa primenom inhibitora aromataze od početka adjuvantnog lečenja u trajanju do 5 godina.</p> <p>2. Postmenopauzalne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri poqiv prvog relapsa bolesti na adjuvantno II sistemski primenjen tamoksifen.</p> <p>3. Kao prva linija sistemske II adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili poqivu neželjenih reakcija na tamoksifen dokazane medikamentne alergije.</p> <p>Hyperplazija žlijezde endometrijuma dokazani histopatološki.</p> <p>ponavljajuće metostaze.</p>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane uslovove koja obaveja zadržavane obilnosti na tercijarnom nivou zadržavane zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara zadržavane zaštite, a nastavak terapije koja obaveja zadržavane obilnosti na sekundarnom ili tercijarnom nivou zadržavane zaštite.

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / pakma leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
1039332	L02BG04	letrozol	LETROZOL SANDOZ	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Sandoz Pharma GmbH	Nemacka	1.114,90	2,5 mg	37,16	50,00	<p>Karcinom dojke:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prvi steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u kombinaciji sa tamoksifenom, u kombinaciji sa letrozolom ili drugim selektivnim modulatorima estrogenih receptora (SME) u kombinaciji sa letrozolom ili drugim selektivnim modulatorima estrogenih receptora (SME) kao nastavak adjuvantne terapije. Kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke koji postmenopauznu žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih se sa sprovođi terapija letrozolom do 5 godina;</li> <li>ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke koji postmenopauznu žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih se sa sprovođi terapija letrozolom ili drugim selektivnim modulatorima estrogenih receptora (SME) u kombinaciji sa letrozolom ili drugim selektivnim modulatorima estrogenih receptora (SME) kao nastavak adjuvantne terapije. Kod svih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataza od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina.</li> </ol> </li> <li>Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojava prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen.</li> <li>Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili tromboza).</li> </ol> <p>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ili lekara zbravljene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijalista zbravljene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.</p>	
1039390	L02BG06	letrozol	LETROZOL SANDOZ	tableta	30 po 2,5 mg	Pfizer Italia S.p.A.	Italija	1.854,50	2,5 mg	55,15	50,00	<p>Karcinom dojke:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prvi steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u kombinaciji sa tamoksifenom, u kombinaciji sa letrozolom ili drugim selektivnim modulatorima estrogenih receptora (SME) u kombinaciji sa letrozolom ili drugim selektivnim modulatorima estrogenih receptora (SME) kao nastavak adjuvantne terapije. Kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke koji postmenopauznu žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih se sa sprovođi terapija letrozolom do 5 godina;</li> <li>ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke koji postmenopauznu žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih se sa sprovođi terapija letrozolom ili drugim selektivnim modulatorima estrogenih receptora (SME) u kombinaciji sa letrozolom ili drugim selektivnim modulatorima estrogenih receptora (SME) kao nastavak adjuvantne terapije. Kod svih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataza od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina.</li> </ol> </li> <li>Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojava prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen.</li> <li>Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili tromboza).</li> </ol> <p>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ili lekara zbravljene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijalista zbravljene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.</p>	



Lista A. lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje / Jedinica leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DOD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućeg fonda	Indikacija	Napomena
1093877	L02BG06	ek-sermestan	EXEDRAL 26	film tableta	biser, 30 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	1.654,50	25 mg	55,15	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzalnih bolesnica, PS O i I, sekvestrajno, posle tri godine primene adjuvantne hormonalne terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovog se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzalnih žena sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih se sa sprovođi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzalnih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podložne za primenu adjuvantne terapije i blokade terapije. Kod ovih bolesnica se sa primenjuje inhibitor aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzalne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri počinju prvog relapsa bolesti na adjuvantno II sistemski primenjen. 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaucomi, duboka venska tromboza, CVI i tromboza u anamnezi) ili pojava neželjenih reakcija na tamoksifen (obolozna medikamentna alergija i hepatička ili polu endometrijalna dokazani histopatološki). primenjuje metforminje.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ili lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koje obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1093405	L02BG06	ek-sermestan	ESZEPARAN	film tableta	biser, 30 po 25 mg	Kila, Tovarna Zdravil d.o.o.	Slovenija	1.654,50	25 mg	55,15	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzalnih bolesnica, PS O i I, sekvestrajno, posle tri godine primene adjuvantne hormonalne terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovog se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzalnih žena sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih se sa sprovođi terapije tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzalnih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podložne za primenu adjuvantne terapije i blokade terapije. Kod ovih bolesnica se sa primenjuje inhibitor aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzalne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri počinju prvog relapsa bolesti na adjuvantno II sistemski primenjen. 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaucomi, duboka venska tromboza, CVI i tromboza u anamnezi) ili pojava neželjenih reakcija na tamoksifen (obolozna medikamentna alergija, hiperparaliza ili polu endometrijalna dokazani histopatološki). primenjuje metforminje.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ili lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koje obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / Jedinica leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lici	Indikacija	Napomena
1014693	L04AA06	mikofenolna kiselina	CELLCEPT	film tableta	bister, 150 po 500 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	12.242,70	2 g	326,47	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0, Z94.1 i Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014694	L04AA06	mikofenolna kiselina	MICOLIFT	kapsula, tvrda	bister, 300 po 250 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	8.808,70	2 g	229,57	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0, Z94.1 i Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014695	L04AA06	mikofenolna kiselina	TRIXIN	kapsula, tvrda	bister, 100 po 250 mg	Pila Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	2.889,50	2 g	229,57	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0, Z94.1 i Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014260	L04AA06	mikofenolat natrijum	MYFORTIC	gastroresistentna tableta	bister, 120 po 180 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	13.687,80	2 g	913,19	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014261	L04AA06	mikofenolat natrijum	MYFORTIC	gastroresistentna tableta	bister, 120 po 360 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	27.216,30	2 g	912,54	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014270	L04AA10	sildenafil	PAPARLINE	obložena tableta	bister, 30 po 1 mg	Wyeth Pharmaceuticals Pfizer Ireland Pharmaceuticals	Velika Britanija	12.170,10	3 mg	1.217,01	50,00	Kod bolesti koje su popraćene bubrenom funkcijom kardena, kod pogoršane izražene bolesti dokazane na biopsijom materijalu ili ehokardiografiji, sa oštećenjem usporanje progresije kronične aortne hipertenzije (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014651	L04A418	everolimus	CERTICAN	tableta	bister, 90 po 0,25 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	10.536,10	1,5 mg	1.043,81	50,00	Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim i umerenim imunološkim rizikom koji su došli alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0, Z94.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zadržavane ustanove tercijarnog nivoa zadržavane zaštite.
1014652	L04A418	everolimus	CERTICAN	tableta	bister, 60 po 0,5 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	18.826,80	1,5 mg	981,78	50,00	Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim i umerenim imunološkim rizikom koji su došli alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0, Z94.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zadržavane ustanove tercijarnog nivoa zadržavane zaštite.
1014690	L04A01	ciklosporin	SANDIMMUN MEDRAL	kapsula, meka	bister, 50 po 25 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	3.178,70	0,25 g	636,74	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94.1). 2. Isključivo za nagle autorene bolesti, ukoliko postoji rezistencija na drugu imunosupresivnu lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014692	L04A01	ciklosporin	SANDIMMUN MEDRAL	kapsula, meka	bister, 50 po 50 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	6.088,00	0,25 g	909,80	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94.1). 2. Isključivo za nagle autorene bolesti, ukoliko postoji rezistencija na drugu imunosupresivnu lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014691	L04A01	ciklosporin	SANDIMMUN MEDRAL	kapsula, meka	bister, 50 po 100 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	11.956,20	0,25 g	592,81	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94.1). 2. Isključivo za nagle autorene bolesti, ukoliko postoji rezistencija na drugu imunosupresivnu lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.



Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FO	Pakovanje i jacinma leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
3014698	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	oseti rasvor	bočica 1 po 50 ml (100 mg/1 ml)	Novartis Pharma GmbH	Nemaška	13.442,40	0,25 g	872,12	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Ispoljivo za najlake autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zadržavenu deblnost na tercijarnom nivou.
1014250	L04AD02	likrolimus	PROGRAF	kapsula	80 po 1 mg	Astellis	Irska	6.388,30	5 mg	522,36	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja allogrenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zadržavenu deblnost na tercijarnom nivou.
1014251	L04AD02	likrolimus	PROGRAF	kapsula	30 po 5 mg	Astellis	Irska	14.807,70	5 mg	483,69	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja allogrenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zadržavenu deblnost na tercijarnom nivou.
1014252	L04AD02	likrolimus	PROGRAF	kapsula	30 po 0,5 mg	Astellis	Irska	1.743,40	5 mg	581,13	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja allogrenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zadržavenu deblnost na tercijarnom nivou.
1014240	L04AD02	likrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrd	blister, 30 po 0,5 mg	Astellis Ireland Co. Ltd.	Irska	2.490,40	5 mg	850,13	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja allogrenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zadržavenu deblnost na tercijarnom nivou.
1014242	L04AD02	likrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrd	blister, 30 po 1 mg	Astellis Ireland Co. Ltd.	Irska	4.583,10	5 mg	760,52	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja allogrenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zadržavenu deblnost na tercijarnom nivou.
1014245	L04AD02	likrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrd	blister, 30 po 3 mg	Astellis Ireland Co. Ltd.	Irska	14.442,50	5 mg	862,89	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja allogrenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zadržavenu deblnost na tercijarnom nivou.
1014247	L04AD02	likrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrd	blister, 30 po 5 mg	Astellis Ireland Co. Ltd.	Irska	21.163,99	5 mg	705,13	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja allogrenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zadržavenu deblnost na tercijarnom nivou.
1014620	L04AX01	azatioprin	IMURAN	film tableta	100 po 50 mg	Escele GmbH	Nemaška	2.064,00	0,15 g	81,92	50,00		
104530	L04AX03	metotriksat	METHOTREXAT "EBEWE"	tableta	kontejner za tablete, 50 po 2,5 mg	Ebewe Pharma Ges. M.B.H.NFG. KG	Austrija	759,20	2,5 mg	15,18	50,00		
1034331	L04AX03	metotriksat	METHOTREXAT "EBEWE"	tableta	kontejner za tablete, 50 po 5 mg	Ebewe Pharma Ges. M.B.H.NFG. KG	Austrija	1.353,30	2,5 mg	13,53	50,00		
3162033	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	sirup	plastična bočica, 1 na 100 ml (100 mg/5 ml)	Abbyot S.r.l.	Italija	160,10	1,2 g	90,06	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenom funkcijom gušterače.

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje (jačina leka)	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućih lica	Indikacija	Napomena
3162533	M01AE01	Ibuprofen	IBUPROFEN	sirup	bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Jugomedija a.d.	Republika Srbija	150.70	1.2 g	90.06	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162525	M01AE01	Ibuprofen	IBALGIN BABY	oralna suspenzija	bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Zenika K.S.	Češka	150.70	1.2 g	90.06	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162519	M01AE01	Ibuprofen	NUROFEN ZA DECU SALICUSOM NARANĐE	oralna suspenzija	boja plastika, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited	Velika Britanija	150.70	1.2g	90.06	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162501	M01AE01	Ibuprofen	BLOKMAX ZA DECU	oralna suspenzija	boja staklena, 1 po 100ml (100mg/5ml)	Alkaloid AD, Slojita	Meksetonija	150.70	1.2g	90.06	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162101	M01AE01	Ibuprofen	BLOKMAX ZA DECU	oralna suspenzija	boja staklena, 1 po 60 ml (100mg/5ml)	Alkaloid AD Slojita	Republika Makedonija	80.10	1.2 g	90.10	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162088	M01AE01	Ibuprofen	BRUFEN	oralna suspenzija	boja plastika, 1 po 150ml (200mg/5ml)	Farnasiera Manufacturing S.L.	Španija	397.20	1.2 g	77.44	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162228	M01AE01	Ibuprofen	NUROFEN JUNIOR NARANĐE	oralna suspenzija	boja plastika, 1 po 100ml (200mg/5ml)	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited	Velika Britanija	258.10	1.2 g	77.43	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1165122	M03BX02	Izamidh	SIBDALUD	tablete	blister, 30 po 4 mg	Novartis Unjoneji	Turska	361.70	12 mg	36.17	50.00	Lečenje patološki povisnog tonusa skeletnih mišica u okviru organskih neuroloških poremećaja (obimnije pramenožni mišići, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaji, infarktija, encefalopatija, itd.) Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neurofizijatra ili fizijatra	
1165221	M03BX02	Izamidh	TZAX	tablete	blister, 30 po 4mg	Pharmas d.o.o	Republika Srbija	361.70	12 mg	36.17	50.00	Lečenje patološki povisnog tonusa skeletnih mišica u okviru organskih neuroloških poremećaja (obimnije pramenožni mišići, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaji, infarktija, encefalopatija, itd.) Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neurofizijatra ili fizijatra	
1165089	M04A401	Stimulansi	ALOPURINOL	tableta	blister, 40 po 100 mg	Hemofarm a.d	Republika Srbija	116.80	0.4 g	11.66	50.00		



Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jacinna leka	Naziv proizlodaoca leka	Drzava proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Marketa
3087302	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	oralni rastvor	kompletno jednodozni, 20 po 5 ml (10 mg/5 ml)	L. Molteni & C. Da.F. LLI Alfa Società D. Esercizio S.P.A.	Italija	1.257,20	0,1 g	028,00	50,00	Za lekjenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (2-5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljevanjem.	
3087303	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	oralni rastvor	kompletno jednodozni, 20 po 5 ml (30 mg/5 ml)	L. Molteni & C. Da.F. LLI Alfa Società D. Esercizio S.P.A.	Italija	1.257,20	0,1 g	208,53	50,00	Za lekjenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (2-5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljevanjem.	
3087304	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	oralni rastvor	bocka sa kapaškom, 1 po 20 ml (30 mg/30)	L. Molteni & C. Da.F. LLI Alfa Società D. Esercizio S.P.A.	Italija	567,40	0,1 g	141,85	50,00	Za lekjenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (2-5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljevanjem.	
3087304	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	sirop	bocka sa staklena, 1 po 100 ml (10 mg/5ml)	L. Molteni & C. Da.F. LLI Alfa Società D. Esercizio S.P.A.	Italija	336,00	0,1 g	168,00	50,00	Za lekjenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (2-5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljevanjem.	
1087711	N02AA03	hidromorfon	JURHISTA	tableta sa produženim oslobađanjem	tableta, 14 po 8 mg	Janssen Pharmaceutica N.V., Janssen-Cilag S.P.A.	Belgija; Italija	2.778,70	20 mg	486,20	50,00	Za lekjenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (2-5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljevanjem.	
1087710	N02AA03	hidromorfon	JURHISTA	tableta sa produženim oslobađanjem	14 po 16 mg	Janssen Pharmaceutica N.V., Janssen-Cilag S.P.A.	Belgija; Italija	4.897,20	20 mg	437,25	50,00	Za lekjenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (2-5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljevanjem.	

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupljeno ime leka	FD	Pakovanje i jedna leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravanih lica	Indikacija	Napomena
1087715	N02A03	Indometacin	JURUSTA	tabela sa podacimmi pakovanja	28 po 33,0mg	Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse -Belgija S.P.A.	Belgija; Belgija	17.239,60	20,0mg	384,59	50,00	Za lekove umerno jakog do jakog inflamatornog bola (t. j. pri HbS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obolavljenjem.	
9087665	N02A03	fentani	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h i 5 po 4,2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	739,60	1,2 mg	42,26	50,00	1. Za lečenje hroničnog, umerenog jakeg do jakeg kanceruskog bola na tzv. trecoj analgetičkoj stepenici (COO-CB7) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima). - Iako opred druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja otkrili meritom razvija nastajana odgovara koja se ne mogu kontrolisati. - Iako opred druge linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama, nalgina bolova koji otežavaju obradu primenu morfina. (često povraćanje, kompleksna mehanička opstrukcija creva, dislagija). - Iako opred prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama, nalgina bolova koji sprekaavaju primenu morfina. - Iako opred druge linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama, nalgina bolova koji sprekaavaju primenu morfina. - Iako opred druge linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama, nalgina bolova koji sprekaavaju primenu morfina. (često povraćanje, kompleksna mehanička opstrukcija creva, dislagija). - Iako opred druge linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama, nalgina bolova koji sprekaavaju primenu morfina. - Iako opred druge linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama, nalgina bolova koji sprekaavaju primenu morfina.	Prilimeni transdermalnog flastera sa fentanilom sa kontrolu probuja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se bozo oslobađa
9087666	N02A03	fentani	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h i 5 po 6,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.479,10	1,2 mg	42,26	50,00	1. Za lečenje hroničnog, umerenog jakeg do jakeg kanceruskog bola na tzv. trecoj analgetičkoj stepenici (COO-CB7) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima). - Iako opred druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja otkrili meritom razvija nastajana odgovara koja se neko kontrolisu. - Iako opred druge linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama, nalgina bolova koji otežavaju obradu primenu morfina. (često povraćanje, kompleksna mehanička opstrukcija creva, dislagija). - Iako opred druge linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama, nalgina bolova koji sprekaavaju primenu morfina. - Iako opred druge linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama, nalgina bolova koji sprekaavaju primenu morfina. (često povraćanje, kompleksna mehanička opstrukcija creva, dislagija). - Iako opred druge linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama, nalgina bolova koji sprekaavaju primenu morfina. - Iako opred druge linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama, nalgina bolova koji sprekaavaju primenu morfina.	Prilimeni transdermalnog flastera sa fentanilom sa kontrolu probuja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se bozo oslobađa.

Lista A- lekovi koji se propisuju izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaslićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087598	N02AB03	fenitani	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 75 mg/24h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.509,50	1,2 mg	47,80	50,00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kanceruskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (COX-3/7) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kanceruskog bola). Ito: - kao opad druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu; - in situ prihvatljiva za bolesnike; - kao opad prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje omogućavaju oralnu primenu morfina (lesto povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, distagija). -kao opad prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i obežavaju njegovo korišćenje do optimalne doze ( mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva). -kao opad prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrega funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fenitaniom za kontrolu probava bola povećano je neželjena dejstva lekova sa zasižajem morfina koji se bez opasnosti.
9087587	N02AB03	fenitani	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mg/24h (5 po 18,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.478,70	1,2 mg	38,41	50,00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kanceruskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (COX-3/7) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kanceruskog bola). Ito: - kao opad druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu; - in situ prihvatljiva za bolesnike; - kao opad prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje omogućavaju oralnu primenu morfina (lesto povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, distagija). -kao opad prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i obežavaju njegovo korišćenje do optimalne doze ( mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva). -kao opad prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrega funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fenitaniom za kontrolu probava bola povećano je neželjena dejstva lekova sa zasižajem morfina koji se bez opasnosti.
9087505	N02AB03	fenitani	VICTALINYL	transdermalni flaster	lepljiva, 5 po 17 mg/24h (5 po 2,8 mg/2,85 cm <sup>2</sup> )	Aeno AG	Nemacka	680,9	1,2 mg	64,09	50,00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kanceruskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (COX-3/7) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kanceruskog bola). Ito: - kao opad druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu; - in situ prihvatljiva za bolesnike; - kao opad prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje omogućavaju oralnu primenu morfina (lesto povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, distagija). -kao opad prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i obežavaju njegovo korišćenje do optimalne doze ( mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva). -kao opad prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrega funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fenitaniom za kontrolu probava bola povećano je neželjena dejstva lekova sa zasižajem morfina koji se bez opasnosti.

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastüčeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087201	N02AB03	fentanil	VICTAYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/5h (5 po 4,125 mg/7,5 cm <sup>2</sup> )	Actavis Group PTC, BHF	Island	798,80	1,2 mg	43,03	50,00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerškog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (COD-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerškog bola), (tj. kada se bol ne može kontrolisati adekvatnom terapijom u toku lečenja drugim analgetičkim sredstvima) ili u toku lečenja akutnog bolnog sindroma mešane prirode koji se teško kontrolišu. In situ prihvatljiva za bolesnike: -kao opoid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koja omogućavaju ostalu primenu morfina -često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, distagija; -kao opoid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina -kao opoid drugog reda do optimalne doze (mogućna, povraćanje, opstipacija nekomplicirana mehanička opstrukcija creva); -kao opoid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrične funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu probava bola povećano je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087202	N02AB03	fentanil	VICTAYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/5h (5 po 8,25 mg/15 cm <sup>2</sup> )	Actavis Group PTC, BHF	Island	1.479,10	1,2 mg	43,03	50,00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerškog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (COD-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerškog bola), (tj. kada se bol ne može kontrolisati adekvatnom terapijom u toku lečenja drugim analgetičkim sredstvima) ili u toku lečenja akutnog bolnog sindroma mešane prirode koji se teško kontrolišu. In situ prihvatljiva za bolesnike: -kao opoid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koja omogućavaju ostalu primenu morfina -često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, distagija; -kao opoid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina -kao opoid drugog reda do optimalne doze (mogućna, povraćanje, opstipacija nekomplicirana mehanička opstrukcija creva); -kao opoid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrične funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu probava bola povećano je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087203	N02AB03	fentanil	VICTAYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/5h (5 po 12,375 mg/22,5 cm <sup>2</sup> )	Actavis Group PTC, BHF	Island	2.509,50	1,2 mg	48,87	50,00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerškog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (COD-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerškog bola), (tj. kada se bol ne može kontrolisati adekvatnom terapijom u toku lečenja drugim analgetičkim sredstvima) ili u toku lečenja akutnog bolnog sindroma mešane prirode koji se teško kontrolišu. In situ prihvatljiva za bolesnike: -kao opoid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koja omogućavaju ostalu primenu morfina -često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, distagija; -kao opoid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina -kao opoid drugog reda do optimalne doze (mogućna, povraćanje, opstipacija nekomplicirana mehanička opstrukcija creva); -kao opoid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrične funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu probava bola povećano je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.



Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Novi proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DOD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087200	N02AB03	fenitoin	VICTANYL	transdermalni flaster	kešica, 5 po 100 mg/24 h (5 po 16,5 mg/24 h)	Actavis Group PTC, EHF	Island	2.478,70	1,2 mg	38,05	50,00	1. Zastupeno hroničnog, umereno jakog do jakog kancerogenog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (COX-2) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršenjima hroničnog kancerogenog bola), t.j.: - kao opad drugo linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu. - kod primatljive se bolesnike. - kod bolesnika sa kombinacijom sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje omogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, distalija). - kao opad prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina. - obezbeđuju njegovo zadržanje do optimalne doze (mužjima, porođajne, opstipacije, nekomplirane migrene, opstipacije, opstipacije, opstipacije, opstipacije kod bolesnika sa oštećenjem bubregne funkcije).	Primeni transdermalnog flastera sa kateksinom sa kontrolu primena bola povezno se neophodna terapija i tečnina za održavanje morfinu koji se bez opasnosti.
1087530	N02AX02	tramadol	TRODON	kapulica, tvrd	blister, 20 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	186,30	0,3 g	55,89	50,00		
1087550	N02AX02	tramadol	TRAMAFORT	tableta sa probalnim oštećenjem	blister, 20 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	332,30	0,3 g	49,85	50,00		
1087651	N02AX02	tramadol	TRAMAFORT	tableta sa probalnim oštećenjem	blister, 20 po 150 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	565,50	0,3 g	50,55	50,00		
1087653	N02AX02	tramadol	TRODON	tableta sa probalnim oštećenjem	blister, 10 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	166,20	0,3 g	49,86	50,00		
3086966	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL	sirup	bočica, 1 po 100 ml (120 mg/5 ml)	Calentia a.d.	Republika Srbija	1.259,90	3 g	162,38	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja
3086742	N02BE01	paracetamol	PANATERM	sirup	bočica pakovanja, 1 po 126 ml (120 mg/5 ml)	Seplharma AD	Bugarska	162,40	3 g	162,40	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1084210	N05AA02	fenobarbital (fenobarbital)	PHENOBARBITON	tableta	blister, 30 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	76,90	0,1 g	17,09	90,00		
1084621	N05AA02	fenobarbital (fenobarbital)	PHENOBARBITON	tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	171,20	0,1 g	6,71	50,00		
3084613	N05AD01	etoksikamid	SUXMUTN	sirup	bočica od tamnog stakla, 1 po 200 ml (250 mg/5 ml)	Famar Orleans	Francuska	386,20	1,25 g	48,28	50,00	1. Epilepsija (GAD-041).	Lek se koristi u terapiji na osnovu mišljenja neurologa/neuroepileptika.
1084402	N05AE01	monazepam	RIVOTRIL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	117,00	6 mg	15,60	50,00		
1084255	N05AE01	benazepam	KLONAZEPAM REMEDICA	tableta	blister, 30 po 2 mg	Remedica Ltd.	Kipar	101,50	6 mg	13,63	50,00		

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / jačina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
10846070	N03AF01	karbamazepin	GALEPSIN	tableta	bister, 50 po 200 mg	Celanita a.d.	Republika Srbija	265,10	1 g	26,51	50,00		
10846080	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	tableta	bister, 50 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	265,10	1 g	26,51	50,00		
30846332	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL	oralna suspenzija	1 po 250 ml (2 gr/100 ml)	Novartis Pharma S.A.S.	Francuska	420,80	1 g	84,16	50,00		Samo za bebu.
10846330	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	9m tableta sa modifikovanim oslobađanjem	bister, 30 po 400 mg	Novartis Pharma Stern AG	Svetska	492,10	1 g	41,01	50,00		
10846351	N03AF01	karbamazepin	CARBAMAZEPINE AETARD	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	bister, 30 po 400 mg	Remedica Ltd	Kipar	343,20	1 g	28,60	50,00		
30846391	N03AG01	matijum valproat	EFTIL	sirop	bočica, 1 po 150 ml (50 mg/ml)	Hemofarm a.d. u saradnji sa Sinoth Winthrop Industrie, Francuska; United Liquid Manufacturing	Republika Srbija; Francuska	407,40	1,5 g	81,48	50,00		
10846400	N03AG01	matijum valproat, valproična kiselina	EFTIL	tableta sa prolaženim oslobađanjem	table, 30 po 333 mg x 145 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Sinoth Winthrop Industrie, Francuska; Sinoth Winthrop Industrie	Republika Srbija; Francuska	348,60	1,5 g	39,46	50,00		
10846417	N03AG01	valproična kiselina, matijum valproat	VALPRODIX	tableta sa prolaženim oslobađanjem	bister, 30 po 145 mg x 333 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	348,60	1,5 g	38,46	50,00		
10846500	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	bister, 30 po 25 mg	Glavosnitchkine Pharmaceutics S.A.	Poljska	146,30	0,3 g	58,52	50,00	1. Epilepsija (G30, G41); 2. Bipolarni poremećaji (F31, F7).	Za indikaciju pod tačkom 1 lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili psijatra. Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
10846551	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	bister, 30 po 50 mg	Glavosnitchkine Pharmaceutics S.A.	Poljska	312,60	0,3 g	62,56	50,00	1. Epilepsija (G30, G41); 2. Bipolarni poremećaji (F31, F7).	Za indikaciju pod tačkom 1 lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili psijatra. Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
10846552	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	bister, 30 po 100 mg	Glavosnitchkine Pharmaceutics S.A.	Poljska	576,80	0,3 g	57,68	50,00	1. Epilepsija (G30, G41); 2. Bipolarni poremećaji (F31, F7).	Za indikaciju pod tačkom 1 lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili psijatra. Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.





Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084627	N05AX09	lamoctriol	LAMOTRIVAL	tableta	biser, 30 po 25 mg	Calenika a.d.	Republika Srbija	146,30	0,3 g	58,52	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaji (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili podjela psihijatra ili neurologa ili neuropshijata. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijata.
1084628	N05AX09	lamoctriol	LAMOTRIVAL	tableta	biser, 30 po 50 mg	Calenika a.d.	Republika Srbija	312,80	0,3 g	62,56	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaji (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijata ili podjela psihijatra ili neurologa ili neuropshijata. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijata.
1084625	N05AX09	lamoctriol	LAMOTRIVAL	tableta	biser, 30 po 100 mg	Calenika a.d.	Republika Srbija	576,80	0,3 g	57,68	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaji (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijata ili podjela psihijatra ili neurologa ili neuropshijata. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijata.
1084680	N05AX09	lamoctriol	LAMAL	tableta	biser, 30 po 25 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	146,30	0,3 g	58,52	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaji (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijata ili podjela psihijatra ili neurologa ili neuropshijata. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijata.
1084681	N05AX09	lamoctriol	LAMAL	tableta	biser, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	312,80	0,3 g	62,56	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaji (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijata ili podjela psihijatra ili neurologa ili neuropshijata. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijata.
1084682	N05AX09	lamoctriol	LAMAL	tableta	biser, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	576,80	0,3 g	57,68	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaji (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijata ili podjela psihijatra ili neurologa ili neuropshijata. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijata.
1084685	N05AX09	lamoctriol	LAMAL	tableta	biser, 30 po 200 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	1445,50	0,3 g	72,28	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaji (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijata ili podjela psihijatra ili neurologa ili neuropshijata. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijata.
1084620	N05AX09	lamoctriol	LAMOTRUX	tableta	biser, 30 po 25 mg	Medicenterne Ltd	Kipar	146,30	0,3 g	58,52	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaji (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijata ili podjela psihijatra ili neurologa ili neuropshijata. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijata.

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084731	N05AX09	lamoctrijin	LAMOTRUX	tableta	biser, 30 po 50 mg	Medochemie Ltd	Kipar	312,80	0,3 g	62,56	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaji (F31.7)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropatologa ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropatologa.
1084732	N05AX08	lamotrijin	LAMOTRUX	tableta	biser, 30 po 100 mg	Medochemie Ltd	Kipar	576,80	0,3 g	57,68	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaji (F31.7)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropatologa ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropatologa.
1084733	N05AX09	lamotrijin	LAMOTRUX	tableta	biser, 30 po 200 mg	Medochemie Ltd	Kipar	1.446,50	0,3 g	72,28	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaji (F31.7)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropatologa ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropatologa.
1084700	N05AX11	topiramet	TOPAMAX	film tableta	biser, 28 po 25 mg	Clig AG	Švajcarska	292,50	0,3 g	121,07	50,00	Epilepsija (G40-G41)	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropatologa ili pedijatra.
1084701	N05AX11	topiramet	TOPAMAX	film tableta	biser, 28 po 50 mg	Clig AG	Švajcarska	655,20	0,3 g	140,40	50,00	Epilepsija (G40-G41)	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropatologa ili pedijatra.
1084702	N05AX11	topiramet	TOPAMAX	film tableta	biser, 28 po 100 mg	Clig AG	Švajcarska	1.182,40	0,3 g	124,54	50,00	Epilepsija (G40-G41)	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropatologa ili pedijatra.
1084716	N05AX11	topiramet	TIFAMAT	film tableta	biser, 60 po 25 mg	Belluco Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	489,20	0,3 g	96,84	60,00	Epilepsija (G40-G41)	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropatologa ili pedijatra.
1084717	N05AX11	topiramet	TIFAMAT	film tableta	biser, 60 po 50 mg	Belluco Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	1.178,30	0,3 g	117,63	50,00	Epilepsija (G40-G41)	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropatologa ili pedijatra.
1084715	N05AX11	topiramet	TIFAMAT	film tableta	biser, 60 po 100 mg	Belluco Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	1.895,30	0,3 g	93,27	50,00	Epilepsija (G40-G41)	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropatologa ili pedijatra.
1084708	N05AX11	topiramet	TOPIRAMAT AURORBIND	film tableta	kontejner za tablete, 60 po 25 mg	API Swif Services (Mats) Ltd	Malta	489,20	0,3 g	98,84	50,00	Epilepsija (G40-G41)	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropatologa ili pedijatra.
1084709	N05AX11	topiramet	TOPIRAMAT AURORBIND	film tableta	kontejner za tablete, 60 po 50 mg	API Swif Services (Mats) Ltd	Malta	1.178,30	0,3 g	117,63	50,00	Epilepsija (G40-G41)	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropatologa ili pedijatra.
1084723	N05AX11	topiramet	TOPIRAMAT AURORBIND	film tableta	kontejner za tablete, 60 po 100 mg	API Swif Services (Mats) Ltd	Malta	1.895,30	0,3 g	93,27	50,00	Epilepsija (G40-G41)	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropatologa ili pedijatra.
1084724	N05AX11	topiramet	TOPIRAMAT AURORBIND	film tableta	kontejner za tablete, 60 po 200 mg	API Swif Services (Mats) Ltd	Malta	3.814,00	0,3 g	90,35	50,00	Epilepsija (G40-G41)	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropatologa ili pedijatra.



Lista A-lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084750	N05AX12	gabapentin	KATENA	kapsule, tvrd	blistar, 50 po 300 mg	Balupo Ljekovi i Kemijska d.d	Hrvatska	781,40	1,8 g	89,77	50,00	Epilepsija (G40-G41)	
1084812	N05AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsule, tvrd	blistar, 50 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemacka	781,40	1,8 g	89,77	50,00	Epilepsija (G40-G41)	
3084823	N05AX14	levetiracetam	KEP-RA	cejni rastvor	bočica staklena 1 po 300 ml (100 mg/ml)	Neofarma S.p.S.	Francuska	2.413,90	1,5 g	170,68	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa refraktnim parcijalnim napadima kod odraslih i dece iznad 13 mesaca starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa refraktnim miokloničnim epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rešetastim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskim generalizovanim epilepsijom (G40);  Za indikaciju pod brojem 1, 2, 3, i 4, lek se uvodi u terapiju na osnovu rezultata neurofizioloških i/ili zavisivene udarne lepa otkriva zabrazavenu osetljivost na tercijarnom nivou.	
1084832	N05AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blistar, 60 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.266,20	1,5 g	63,31	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa refraktnim parcijalnim epilepsijom kod odraslih i dece iznad 13 godina starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa refraktnim miokloničnim epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rešetastim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskim generalizovanim epilepsijom (G40);  Za indikaciju pod brojem 1, 2, 3, i 4, lek se uvodi u terapiju na osnovu rezultata neurofizioloških i/ili zavisivene udarne lepa otkriva zabrazavenu osetljivost na tercijarnom nivou.	
1084833	N05AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blistar, 60 po 1000 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.448,30	1,5 g	61,21	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa refraktnim parcijalnim epilepsijom kod odraslih i dece iznad 13 godina starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa refraktnim miokloničnim epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rešetastim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskim generalizovanim epilepsijom (G40);  Za indikaciju pod brojem 1, 2, 3, i 4, lek se uvodi u terapiju na osnovu rezultata neurofizioloških i/ili zavisivene udarne lepa otkriva zabrazavenu osetljivost na tercijarnom nivou.	

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FD	Pakovanje / jedna leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
1084634	N02AX14	levetiracetam	TIVALVO	film tableta	biseri: 60 po 250 mg	Avegen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	691.90	1,5 g	69.19	50.00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rešetastim tonično-kloničkim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40);</p>	Za indikaciju pod brojem 1, 2, 3, 14, lek se uvodi terapiju na osnovu merjenja neurofiziolognih parametara, zadržavanje isključivo u obliku zadržavanje delotvornosti na tercijarnom nivou.
1084635	N02AX14	levetiracetam	TIVALVO	film tableta	biseri: 60 po 500 mg	Avegen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	1.266.20	1,5 g	69.31	50.00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rešetastim tonično-kloničkim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40);</p>	Za indikaciju pod brojem 1, 2, 3, 14, lek se uvodi terapiju na osnovu merjenja neurofiziolognih parametara, zadržavanje isključivo u obliku zadržavanje delotvornosti na tercijarnom nivou.
1084516	N02AX14	levetiracetam	L.V./AM	film tableta	biseri: 60 po 750 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	2.870.70	1,5 g	89.02	50.00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rešetastim tonično-kloničkim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40);</p>	Za indikaciju pod brojem 1, 2, 3, 14, lek se uvodi terapiju na osnovu merjenja neurofiziolognih parametara, zadržavanje isključivo u obliku zadržavanje delotvornosti na tercijarnom nivou.

Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje / Jedinica leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084636	N05AX14	levetiracetam	TRIVALVO	firm tableta	blistar, 60 po 1000 mg	Avogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	2.448,30	1,5 g	61,21	80,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa izoliranim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40). Kao i za epilepsiju kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiosinkratskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neurošahjata, zatim ovakve udalove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084618	N05AX14	levetiracetam	LYVAM	firm tableta	blistar, 60 po 250mg	Akalan d.o.o. Beograd	Republika Srbija	691,90	1,5g	69,19	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa izoliranim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiosinkratskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neurošahjata, zatim ovakve udalove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084617	N05AX14	levetiracetam	LYVAM	firm tableta	blistar, 60 po 600mg	Akalan d.o.o. Beograd	Republika Srbija	1.266,20	1,5g	83,31	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa izoliranim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiosinkratskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neurošahjata, zatim ovakve udalove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zasticeeno ime leka	FD	Pakovanje i jedna leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
1084619	N02AX14	levetiracetam	LVYAM	firm tableta	bister, 60 po 1000mg	Aleadd d.o.o. Beograd	Republika Srbija	2.448,30	1,5g	61,21	50,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa rekurentnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rekurentnim parcijalnim napadima kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rekurentnom meklimnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom meklimnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim napadnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiosinkraticim generalizovanim epilepsijom (G40).</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, i 4... lek se uvodi terapiju na osnovu kliničke neurofiziološke potvrde, zatim se uslovi koje obave zaobavljenu obavezno na tercijarnom nivou</p>	
1084618	N02AX14	levetiracetam	ZANIDA	firm tableta	bister, 60 po 250 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	891,90	1,5g	69,19	50,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa rekurentnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rekurentnim parcijalnim epilepsijom kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rekurentnom meklimnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom meklimnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim napadnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiosinkraticim generalizovanim epilepsijom (G40).</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, i 4... lek se uvodi u terapiju na osnovu kliničke neurofiziološke potvrde, zatim se uslovi koje obave zaobavljenu obavezno na tercijarnom nivou</p>	
1084619	N02AX14	levetiracetam	ZANIDA	firm tableta	bister, 60 po 500 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	1.266,20	1,5g	69,31	50,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa rekurentnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rekurentnim parcijalnim epilepsijom kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rekurentnom meklimnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom meklimnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim napadnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiosinkraticim generalizovanim epilepsijom (G40).</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, i 4... lek se uvodi u terapiju na osnovu kliničke neurofiziološke potvrde, zatim se uslovi koje obave zaobavljenu obavezno na tercijarnom nivou</p>	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje / Jedinica leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućica	Indikacija	Napomena
1084624	N02AX14	levetiracetam	ZANIDA	film tableta	blistar, 60 po 1000 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	2.448,30	1,5g	61,21	50,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epileksijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).</p>	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14... lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra, zadržavajući istovetne koje obavele zadržavanu obavezno na tercijarnom nivou.
1084605	N02AX14	levetiracetam	LESEMOS	film tableta	blistar, 60 po 250mg	Zdravje A.D. Actavis BHF	Republika Srbija; Island	891,90	1,5 g	69,19	50,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).</p>	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14... lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra, zadržavajući istovetne koje obavele zadržavanu obavezno na tercijarnom nivou.
1084606	N02AX14	levetiracetam	LESEMOS	film tableta	blistar, 60 po 600mg	Zdravje A.D. Actavis BHF	Republika Srbija; Island	1.266,20	1,5 g	83,31	80,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).</p>	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14... lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra, zadržavajući istovetne koje obavele zadržavanu obavezno na tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zasticeeno ime leka	FD	Pakovanje i jedna leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
1084597	N09AX14	levetiracetam	LESEMICIS	Im tableta	blistar, 60 po 750mg	Zdravlje A.D. Actavis BHF	Republika Srbija; Island	2.970,70	1,5 g	89,02	50,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom multilobnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnom generalizovanom rezistentnom tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiosinhronom generalizovanom epilepsijom (G40).</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14... lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neurologinje, zadržavane u tačkovu koje obavlja zadržavaru običnost na tercijarnom nivou.</p>	
1084608	N09AX14	levetiracetam	LESEMICIS	Im tableta	blistar, 60 po 1000mg	Zdravlje A.D. Actavis BHF	Republika Srbija; Island	2.448,30	1,5 g	61,21	50,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom multilobnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnom generalizovanom rezistentnom tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiosinhronom generalizovanom epilepsijom (G40).</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14... lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neurologinje, zadržavane u tačkovu koje obavlja zadržavaru običnost na tercijarnom nivou.</p>	
1084601	N09AX14	levetiracetam	LEVETIRAM	Im tableta	blistar, 60 po 250 mg	Ave Pharmaceuticals d.o.o	Republika Srbija	691,90	1,5 g	69,19	50,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom multilobnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnom generalizovanom rezistentnom tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiosinhronom generalizovanom epilepsijom (G40).</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14... lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neurologinje, zadržavane u tačkovu koje obavlja zadržavaru običnost na tercijarnom nivou.</p>	



Lista A. lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućica	Indikacija	Napomena
1084600	N05AX14	levetiracetam	LEVETIRAM	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Ave Pharmaceuticals d.o.o.	Republika Srbija	1.266,20	1,5 g	63,31	50,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa refraktnim parcijalnim napadima kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiosinkratnom generalizovanim epilepsijom (G40).</p>	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14... lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologičneuropatologa, zatavljene uzdatove koja obavlja zadržavajući delatnost na tercijarnom nivou.
1084602	N05AX14	levetiracetam	LEVETIRAM	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	Ave Pharmaceuticals d.o.o.	Republika Srbija	2.446,30	1,5 g	61,21	50,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa refraktnim parcijalnim napadima kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiosinkratnom generalizovanim epilepsijom (G40).</p>	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14... lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologičneuropatologa, zatavljene uzdatove koja obavlja zadržavajući delatnost na tercijarnom nivou.
1084630	N05AX14	levetiracetam	OLETRA-2SD	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Ramedica Ltd., Ronis Health Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar, Grčka	691,90	1,5 g	69,19	50,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa refraktnim parcijalnim napadima kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiosinkratnom generalizovanim epilepsijom (G40).</p>	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14... lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologičneuropatologa, zatavljene uzdatove koja obavlja zadržavajući delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastučenost imena leka	FD	Pakovanje i jedna leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućih lica	Indikacija	Napomena
1094841	N02AX14	levetiracetam	OUETRA 500	firm tableta	bister, 60 po 500 mg	Riemedica Ltd., Ronis Helios Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar, Grčka	1.266,20	1,5 g	63,31	50,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa reaktivnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa reaktivnim parcijalnim napadima kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa reaktivnim meklim toničnim epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom ili idiopatičnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim toničnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiopatičnom generalizovanim epilepsijom (G40).</p>	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14... lek se uvodi terapiju na osnovu indikacija neurološkog odeljenja, zadržavajući istovone koju obavlja zadržavajući obavljanost na tercijarnom nivou.
1094842	N02AX14	levetiracetam	OUETRA 1000	firm tableta	bister, 60 po 1000mg	Riemedica Ltd., Ronis Helios Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar, Grčka	2.448,30	1,5 g	61,21	50,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa reaktivnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa reaktivnim parcijalnim epilepsijom kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa reaktivnim meklim toničnim epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom ili idiopatičnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim toničnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiopatičnom generalizovanim epilepsijom (G40).</p>	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14... lek se uvodi u terapiju na osnovu indikacija neurološkog odeljenja, zadržavajući istovone koju obavlja zadržavajući obavljanost na tercijarnom nivou.
10948415	N02AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM SANDOZ	firm tableta	bister, 60 po 250 mg	S.C. Sandoz S.R.L.; Lek S.A.; Salutas Pharma GmbH; Lek farmacevtske družbe d.d.	Italija; Poljska; Nemacka; Slovenija	691,90	1,5 g	69,19	50,00	<p>1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa reaktivnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);</p> <p>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa reaktivnim parcijalnim epilepsijom kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40);</p> <p>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa reaktivnim meklim toničnim epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom ili idiopatičnom epilepsijom (G40);</p> <p>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim toničnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa idiopatičnom generalizovanim epilepsijom (G40).</p>	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 14... lek se uvodi u terapiju na osnovu indikacija neurološkog odeljenja, zadržavajući istovone koju obavlja zadržavajući obavljanost na tercijarnom nivou.



Lista A- lekovi koji se propisuju u izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084014	N02AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM SANDOZ	8 m tableta	bister, 60 po 500 mg	S.C. Sandoz S.B.L., Lek S.C. Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Lek farmaceutski društva d.d.	Rumunija; Poljska; Nemačka; Slovenija	1.286,20	1,5 g	63,31	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa epilepsijom parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim napadajima tonično-kloničnim ili tonično-kloničnim i kod malih uznad 12 godina starosti sa idiosinhronim generalizovanim epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, i 4, lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/epileptologa, zaustavljeno u slučaju krupn obilja zapaženeu delatnost na tečajnom nivou.
1084013	N02AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM SANDOZ	8 m tableta	bister, 60 po 1000 mg	S.C. Sandoz S.B.L., Lek S.C. Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Lek farmaceutski društva d.d.	Rumunija; Poljska; Nemačka; Slovenija	2.448,30	1,5 g	61,21	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa epilepsijom parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece uznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata uznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim napadajima tonično-kloničnim ili tonično-kloničnim i kod malih uznad 12 godina starosti sa idiosinhronim generalizovanim epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, i 4, lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/epileptologa, zaustavljeno u slučaju krupn obilja zapaženeu delatnost na tečajnom nivou.
1084742	N02AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula tvrda	bister, 56 po 25mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	650,00	0,3 g	139,29	50,00	1. Asimptomna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani tonično-klonični poremećaji (G41.1) kod odraslih osoba sa dodatnom terapijom u kombinaciji sa prethodno primenjenom antiepilepsijom.	Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/epileptologa, a za indikaciju pod tačkom 2, na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/epileptologa.
1084736	N02AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula tvrda	56 po 75 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	1.429,10	0,3 g	102,08	50,00	1. Asimptomna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani tonično-klonični poremećaji (G41.1) kod odraslih osoba sa dodatnom terapijom u kombinaciji sa prethodno primenjenom antiepilepsijom.	Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uводи u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/epileptologa, a za indikaciju pod tačkom 2, na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/epileptologa.

Lista A: Lekovi koji se propisuju u skladu sa obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastuđeno ime leka	FD	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
1084739	N03AX16	pregabalin	LYRCA	kapsula, tvrda	56 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2.041,00	0,3 g	72,89	50,00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizacioni anksiozni poremećaji (F41.1) kod odraslih, posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuro psihijatra
1084745	N03AX16	pregabalin	LYRCA	kapsula, tvrda	56 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	3.316,40	0,3 g	59,22	50,00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizacioni anksiozni poremećaji (F41.1) kod odraslih, posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuro psihijatra
1084902	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister 60 po 75mg	Zdravje A.D Balkanpharma-Oupnitsa A.D, Activis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	1.531,20	0,3 g	102,08	50,00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizacioni anksiozni poremećaji (F41.1) kod odraslih, posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuro psihijatra
1084905	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister 60 po 150mg	Zdravje A.D Balkanpharma-Oupnitsa A.D, Activis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	2.199,80	0,3 g	72,89	50,00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizacioni anksiozni poremećaji (F41.1) kod odraslih, posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuro psihijatra
1084900	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister 90 po 50mg	Balkanpharma-Oupnitsa A.D, Activis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	2.098,30	0,3 g	135,75	50,00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizacioni anksiozni poremećaji (F41.1) kod odraslih, posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuro psihijatra
1084104	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula, tvrda	blister 28 po 50mg	Krixa, Izvorna zdravila, d.d TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	693,50	0,3 g	135,75	50,00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizacioni anksiozni poremećaji (F41.1) kod odraslih, posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuro psihijatra
1084105	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula, tvrda	blister 56 po 50mg	Krixa, Izvorna zdravila, d.d TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	1.267,00	0,3 g	135,75	50,00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizacioni anksiozni poremećaji (F41.1) kod odraslih, posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuro psihijatra



Lista A. lekovi koji se propisuju u izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastigleno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Novi proizvođač leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084108	N02AX18	pragabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 75mg	Krka, lovarna zdelavi, d.d. TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.429,10	0,3 g	102,08	50,00	1. Adjuvanta terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) kod odraslih, po se ili nezabovljajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva. 3. Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2, na osnovu mišljenja psihijatra/neuro psihijatra	
1084131	N02AX18	pragabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 100mg	Krka, lovarna zdelavi, d.d. TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.810,90	0,3 g	86,30	50,00	1. Adjuvanta terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) kod odraslih, po se ili nezabovljajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva. 3. Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2, na osnovu mišljenja psihijatra/neuro psihijatra	
1084134	N02AX18	pragabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 150 mg	Krka, lovarna zdelavi, d.d. TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	2.041,00	0,3 g	72,89	50,00	1. Adjuvanta terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) kod odraslih, po se ili nezabovljajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva. 3. Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2, na osnovu mišljenja psihijatra/neuro psihijatra	
1085220	N04AA02	lprigidin	MERUJILEX	tablete	blister, 50 po 2,0mg	Altabid s.d.	Republika Makedonija	161,50	10 mg	16,15	50,00	1. Adjuvanta terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) kod odraslih, po se ili nezabovljajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva. 3. Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2, na osnovu mišljenja psihijatra/neuro psihijatra	
1085212	N04BA02	levodopa bunarsaad	MADOPAR	tableta	boca sa 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)	Galenika a.d. Srbija u saradnji sa F. Hoffmann- La Roche Ltd	Slovenija, Nemačka	3.316,40	0,3 g	69,04	50,00	Leak se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra	
1085507	N04BA02	levodopa, bunarsaad	MADOPAR ROCHE	tableta	bočica, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	2.301,20	0,6 g	69,04	50,00	Leak se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra	
1085502	N04BA02	levodopa bunarsaad	MADOPAR HBS	kapsule sa protektivnim odbojnim vrstob	bočica, 30 po 100 mg + 25 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	373,50	0,6 g	74,70	50,00	Leak se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra	
1085590	N04BE01	amantadin sulfat	PK MERZ	tableta	30 po 100 mg	Merz Pharma GmbH	Nemačka	472,20	0,2 g	31,48	50,00	Leak se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra	
1149040	N04BC04	bromokriptin	BROMOKRIPTIN	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Zdravko a.d.	Republika Srbija	437,60	40 mg	233,49	50,00	Leak se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra ili endoneurologa	
1070056	N05AA01	floripromazin	HORPROMAZIN	film tableta	blister, 50 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.056,80	300 mg	25,39	50,00	Leak se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuro psihijatra	
1070950	N05AB02	flufenazin	METOTERI	obložena tableta	25 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.08,70	10 mg	43,88	50,00	Leak se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuro psihijatra	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i pakma leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
1070651	N05AB02	hulevarin	METOTEN	obložena tableta	25 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	377,00	10 mg	30,16	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsijijata.
1070654	N05AB02	hulevarin	MODTEN	obložena tableta	bočica, 25 po 1 mg	Kika, Tovarna Zdravi d.o.o.	Slovenija	109,70	10 mg	43,99	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsijijata.
1070656	N05AB02	hulevarin	MODTEN	obložena tableta	bočica, 100 po 2,5 mg	Kika, Tovarna Zdravi d.o.o.	Slovenija	1.072,20	10 mg	42,69	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsijijata.
1070661	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	tablete	biser, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	453,70	8 mg	12,10	50,00		
1070664	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	tableta	plastična bočica, 25 po 2 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	223,50	8 mg	35,76	50,00		
1070660	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	tableta	bistar, 25 po 2 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	223,50	8 mg	35,76	50,00		
1070691	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	tableta	biser, 30 po 10 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	453,70	8 mg	12,10	50,00		
1070702	N05AD01	haloperidol	HALDOL	tableta	bočica, 25 po 2 mg	Kika, Tovarna Zdravi d.o.o. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V. Belgija	Slovenija	223,50	8 mg	35,76	50,00		
1070706	N05AD01	haloperidol	HALDOL	tableta	bočica, 30 po 10 mg	Kika, Tovarna Zdravi d.o.o. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V. Belgija	Slovenija	453,70	8 mg	12,10	50,00		
1070719	N05AH06	olanzapin	TREANA	film tableta	biser, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	923,00	10 mg	61,53	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsijijata.
1070717	N05AH02	olanzapin	TREANA	film tableta	biser, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.937,00	10 mg	61,23	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsijijata.
1070727	N05AH03	olanzapin	SIZAP	film tableta	biser, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	923,00	10 mg	61,53	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsijijata.



Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FO	Pakovanje i jacinma leka	Naziv proizlodaoca leka	Drzava proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
1070038	N05AH03	gabazepin	SIZAP	firm tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkoid d.o.o.	Republika Srbija	1.837,00	10 mg	61,23	50,00	1. Svojevremeno, kratkotrajni poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji ( F31.7 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neурорашijata.
1070039	N05AH03	gabazepin	ONZAPN	firm tableta	blister, 28 po 5 mg	Zdravko a.d., Actavis LTD	Republika Srbija, Mađarska	981,40	10 mg	61,53	50,00	1. Svojevremeno, kratkotrajni poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji ( F31.7 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neурорашijata.
1070033	N05AH03	gabazepin	ONZAPN	firm tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravko a.d., Actavis LTD	Republika Srbija, Mađarska	1.714,50	10 mg	61,23	50,00	1. Svojevremeno, kratkotrajni poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji ( F31.7 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neурорашijata.
1070015	N05AH03	gabazepin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Kika Polska Spolka z o.o., Kika, tovarna zdravil, d.d.	Poljska, Slovenija	981,40	10 mg	61,53	50,00	1. Svojevremeno, kratkotrajni poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji ( F31.7 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neурорашijata.
1070016	N05AH03	gabazepin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 10 mg	Kika Polska Spolka z o.o., Kika, tovarna zdravil, d.d.	Poljska, Slovenija	1.714,50	10 mg	61,23	50,00	1. Svojevremeno, kratkotrajni poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji ( F31.7 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neурорашijata.
1070093	N05AH03	gabazepin	OLPN	firm tableta	blister, 30 po 5 mg	Ave Pharmaceuticals d.o.o.	Republika Srbija	923,00	10 mg	61,53	50,00	1. Svojevremeno, kratkotrajni poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji ( F31.7 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neурорашijata.
1070092	N05AH03	gabazepin	OLPN	firm tableta	blister, 30 po 10 mg	Ave Pharmaceuticals d.o.o.	Republika Srbija	1.897,00	10 mg	61,23	50,00	1. Svojevremeno, kratkotrajni poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji ( F31.7 )	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neурорашijata.

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Značeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućih lica	Indikacija	Napomena
1070087	N05AH03	obanzapin	TREANIA D	oralna disperzibilna tableta	blistar, 28 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	887,80	10 mg	49,84	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ). 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji ( F31.7 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.	
1070088	N05AH03	obanzapin	TREANIA D	oralna disperzibilna tableta	blistar, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.395,70	10 mg	49,85	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ). 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji ( F31.7 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.	
1070089	N05AH03	obanzapin	ONZAPIN	oralna disperzibilna tableta	blistar, 28 po 15 mg	Zdravlje d.d. Actavis LTD., Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	2.584,50	10 mg	61,54	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ). 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji ( F31.7 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.	
1070090	N05AH03	obanzapin	ONZAPIN	oralna disperzibilna tableta	blistar, 28 po 20 mg	Zdravlje d.d. Actavis LTD., Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	3.445,20	10 mg	61,54	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ). 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji ( F31.7 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.	
1070979	N05AH03	obanzapin	ZALASTA D.Tab	oralna disperzibilna tableta	blistar, 28 po 5 mg	Kina Polde Spoka z.o.o.	Poljska	887,80	10 mg	49,84	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ). 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji ( F31.7 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.	
1070979	N05AH03	obanzapin	ZALASTA C.Tab	oralna disperzibilna tableta	blistar, 28 po 7,5 mg	Kina Polde Spoka z.o.o.	Poljska	1.435,90	10 mg	68,39	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ). 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji ( F31.7 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.	
1070975	N05AH03	obanzapin	ZALASTA O.Tab	oralna disperzibilna tableta	blistar, 28 po 10 mg	Kina Polde Spoka z.o.o.	Poljska	1.395,70	10 mg	49,85	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ). 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji ( F31.7 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.	





Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FO	Pakovanje i jacinna leka	Naziv proizlodaoca leka z o o.	Drzava proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravaj lica	Indikacija	Napomena
1070976	N05AH03	olanzapin	ZALASTA O-Tab	orahka disperzibilna tableta	bister, 28 po 15 mg	Kifa Polska Spolka z o o.	Poljska	2.594,90	10 mg	61,54	50,00	1. Szofrenija, szizofrenski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji (F31.7) Lek se uvodi u terapiju na osnovu najbjeđe psihijatra ili neropsijijatra.	
1070977	N05AH03	olanzapin	ZALASTA O-Tab	orahka disperzibilna tableta	bister, 28 po 20 mg	Kifa Polska Spolka z o o.	Poljska	3.446,20	10 mg	61,54	50,00	1. Szofrenija, szizofrenski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji (F31.7) Lek se uvodi u terapiju na osnovu najbjeđe psihijatra ili neropsijijatra.	
1070154	N05AH03	olanzapin	OLANZAPIN TEVA	orahka disperzibilna tableta	bister, 28 po 5 mg	Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company, Teva Operations Poland SP Z O O.	Mađarska, Poljska	897,60	10 mg	49,94	50,00	1. Szofrenija, szizofrenski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji (F31.7) Lek se uvodi u terapiju na osnovu najbjeđe psihijatra ili neropsijijatra.	
1070155	N05AH03	olanzapin	OLANZAPIN TEVA	orahka disperzibilna tableta	bister, 28 po 10 mg	Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company, Teva Operations Poland SP Z O O.	Mađarska, Poljska	1.395,70	10 mg	49,95	50,00	1. Szofrenija, szizofrenski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji (F31.7) Lek se uvodi u terapiju na osnovu najbjeđe psihijatra ili neropsijijatra.	
1070920	N05AX08	isperidon	RISPOLEPT	firm tableta	bister, 20 po 1 mg	Janssen-Cilag S. P. A.	Italija	155,10	5 mg	39,78	50,00	1. Szofrenija, szizofrenski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29) 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31) 3. Proizlaca psihotična stanja kod organiskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9) Lek se uvodi u terapiju na osnovu najbjeđe psihijatra ili neropsijijatra ili neurologa.	
1070921	N05AX08	isperidon	RISPOLEPT	firm tableta	bister, 20 po 2 mg	Janssen-Cilag S. P. A.	Italija	279,20	5 mg	34,90	50,00	1. Szofrenija, szizofrenski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29) 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31) 3. Proizlaca psihotična stanja kod organiskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9) Lek se uvodi u terapiju na osnovu najbjeđe psihijatra ili neropsijijatra ili neurologa.	

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070822	N06AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blistar, 20 po 3 mg	Janssen-Cilag S. P. A.	Italija	465,30	5 mg	38,78	50,00	1. Šizofrenija, šizotropski poremećaji i poremećaji sa sumanutoksu (F20 - F28). 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31). 3. Probna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa.
1070823	N06AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blistar, 20 po 4 mg	Janssen-Cilag S. P. A.	Italija	699,30	5 mg	43,08	50,00	1. Šizofrenija, šizotropski poremećaji i poremećaji sa sumanutoksu (F20 - F28). 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31). 3. Probna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa.
1070834	N06AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blistar, 20 po 1 mg	Hemofarm a d.	Republika Srbija	155,10	5 mg	38,78	50,00	1. Šizofrenija, šizotropski poremećaji i poremećaji sa sumanutoksu (F20 - F28). 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31). 3. Probna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa.
1070835	N06AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blistar, 20 po 2 mg	Hemofarm a d.	Republika Srbija	279,20	5 mg	34,90	50,00	1. Šizofrenija, šizotropski poremećaji i poremećaji sa sumanutoksu (F20 - F28). 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31). 3. Probna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa.
1070836	N06AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blistar, 20 po 3 mg	Hemofarm a d.	Republika Srbija	465,30	5 mg	38,78	50,00	1. Šizofrenija, šizotropski poremećaji i poremećaji sa sumanutoksu (F20 - F28). 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31). 3. Probna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa.
1070837	N06AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blistar, 20 po 4 mg	Hemofarm a d.	Republika Srbija	699,30	5 mg	43,08	80,00	1. Šizofrenija, šizotropski poremećaji i poremećaji sa sumanutoksu (F20 - F28). 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31). 3. Probna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa.



Lista A-lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
107093	N05AX08	isperidon	TORENDO	firm tableta	blister, 20 po 2 mg	Kika Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	279,20	5 mg	34,90	50,00	1. Šizofrenija, sezorijski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problema psihična stanja kod organiskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
107095	N05AX08	isperidon	TORENDO	firm tableta	blister, 20 po 3 mg	Kika Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	465,30	5 mg	38,78	50,00	1. Šizofrenija, sezorijski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problema psihična stanja kod organiskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
107096	N05AX08	isperidon	RISAR	firm tableta	blister, 20 po 1 mg	Alkabi d.o.o. Beograd	Republika Srbija	155,10	5 mg	38,78	50,00	1. Šizofrenija, sezorijski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problema psihična stanja kod organiskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
107099	N05AX08	isperidon	RISAR	firm tableta	blister, 20 po 2 mg	Alkabi d.o.o. Beograd	Republika Srbija	279,20	5 mg	34,90	50,00	1. Šizofrenija, sezorijski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problema psihična stanja kod organiskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
107004	N05AX08	isperidon	SPERIDAN	firm tableta	blister, 20 po 1 mg	Zdravje d. Balkanpharma-Dupnitsa ad. Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	155,10	5 mg	38,78	50,00	1. Šizofrenija, sezorijski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problema psihična stanja kod organiskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
107001	N05AX08	isperidon	SPERIDAN	firm tableta	blister, 20 po 2 mg	Zdravje d. Balkanpharma-Dupnitsa ad. Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	279,20	5 mg	34,90	50,00	1. Šizofrenija, sezorijski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problema psihična stanja kod organiskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastučenno ime leka	FD	Pakovanje / jačina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućeg lica	Indikacija	Napomena
1.07.06.02	N06AX08	isperidon	SPIERIDAN	film tableta	blistar, 20 po 3 mg	Zdravje a.d. Balkanpharma-Dupnitsa ad: Actavis EHF	Republika Srbija; Bosnaska Maltia; Island	465,30	5 mg	38,78	50,00	1. Šizofrenija, sezonski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problemi psihodna stanja kod organiskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsijahijatra ili neurologa.
1.07.06.03	N06AX08	isperidon	SPIERIDAN	film tableta	blistar, 20 po 4 mg	Zdravje a.d. Balkanpharma-Dupnitsa ad: Actavis EHF	Republika Srbija; Bosnaska Maltia; Island	689,90	5 mg	49,08	50,00	1. Šizofrenija, sezonski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problemi psihodna stanja kod organiskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsijahijatra ili neurologa.
2.07.06.24	N06AX08	isperidon	RISPOL EPT	tablete za oralnu upotrebu	boca sa kapi, 100 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.486,70	5 mg	34,90	50,00	1. Šizofrenija, sezonski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problemi psihodna stanja kod organiskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9); 4. Mentalna retardacija sa zadržanim poremećajem pamćenja koji zahvata pažnju i tretman (F70 - F71); 5. Poremećaji poremećaja obnave (F50.1); 6. Poremećaji ponavljanja (F32).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsijahijatra ili neurologa.
1.07.06.30	N06AX08	isperidon	RISSET	film tableta	blistar, 20 po 1 mg	Pika Hrvatska d.o.o	Hrvatska	155,10	5 mg	38,78	50,00	1. Šizofrenija, sezonski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problemi psihodna stanja kod organiskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsijahijatra ili neurologa.
1.07.06.21	N06AX08	isperidon	RISSET	film tableta	blistar, 20 po 2 mg	Pika Hrvatska d.o.o	Hrvatska	279,70	5 mg	34,90	50,00	1. Šizofrenija, sezonski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problemi psihodna stanja kod organiskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsijahijatra ili neurologa.
1.07.06.22	N06AX08	isperidon	RISSET	film tableta	blistar, 20 po 3 mg	Pika Hrvatska d.o.o	Hrvatska	465,30	5 mg	38,78	50,00	1. Šizofrenija, sezonski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problemi psihodna stanja kod organiskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsijahijatra ili neurologa.



Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070693	N05AX08	isperidon	RISSEF	firm tableta	blister, 20 po 5mg	Phia Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	899,30	5,0mg	43,08	50,00	1. Šizofrenija, sezonski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problema psihološke stanja kod organičkih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070695	N05AX08	isperidon	RISPERIDON ADOC	firm tableta	blister, 20 po 1mg	Actavis BH, Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bulgarska	165,10	5 mg	38,78	50,00	1. Šizofrenija, sezonski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problema psihološke stanja kod organičkih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070696	N05AX08	isperidon	RISPERIDON ADOC	firm tableta	blister, 20 po 2mg	Actavis BH, Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bulgarska	279,20	5 mg	34,90	50,00	1. Šizofrenija, sezonski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problema psihološke stanja kod organičkih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070664	N05AX08	isperidon	RISPERIDON ADOC	firm tableta	blister, 20 po 3mg	Actavis BH, Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bulgarska	465,30	5 mg	38,79	50,00	1. Šizofrenija, sezonski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31); 3. Problema psihološke stanja kod organičkih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070101	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	orahna disperzibilna tableta	blister, 30 po 10mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1.224,60	15mg	81,23	50,00	1. Šizofrenija, sezonski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Bipolarni afektivni poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F30.2); 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2); 4. Bipolarni afektivni poremećaji i remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070109	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	orahna disperzibilna tableta	blister, 30 po 15mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1.996,90	15mg	81,23	50,00	1. Šizofrenija, sezonski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2); 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2); 4. Bipolarni afektivni poremećaji i remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070182	N05AX12	aripiprazol	ZOLPRUX	tableta	30 po 5mg	Avogean Pharma d.o.o. S C. LaborMed-Pharma S.A.	Republika Srbija, Rumunija	612,30	15mg	81,23	50,00	1. Šizofrenija, sezonski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29); 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2); 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2); 4. Bipolarni afektivni poremećaji i remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.



Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zasticeeno ime leka	FD	Pakovanje i jacinna leka	Naziv proizvođaca leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
1070163	N05AX12	antipiraxal	ZOLPRIX	tableta	30 po 10 mg	Avogon Pharma d.o.o. S.C. Labomed-Pharma S.A.	Republika Srbija Rumunija	1.224,80	15mg	81,23	50,00	1. Šizofrenija, šizotipni poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji (F31.7) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.	
1070164	N05AX12	antipiraxal	ZOLPRIX	tableta	30 po 30mg	Avogon Pharma d.o.o. S.C. Labomed-Pharma S.A.	Republika Srbija Rumunija	3.873,80	15mg	81,23	50,00	1. Šizofrenija, šizotipni poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji (F31.7) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.	
1070165	N05AX12	antipiraxal	ZOLPRIX	tableta	30 po 15mg	Avogon Pharma d.o.o. S.C. Labomed-Pharma S.A.	Republika Srbija Rumunija	1.836,90	15mg	81,23	50,00	1. Šizofrenija, šizotipni poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji (F31.7) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.	
1070043	N05AX12	antipiraxal	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 2mg	Actavis Ltd.	Malta	246,00	15mg	81,25	50,00	1. Šizofrenija, šizotipni poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji (F31.7) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.	
1070044	N05AX12	antipiraxal	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 5mg	Actavis Ltd.	Malta	612,30	15mg	81,23	50,00	1. Šizofrenija, šizotipni poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji (F31.7) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.	
1070045	N05AX12	antipiraxal	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 10mg	Actavis Ltd.	Malta	1.224,80	15mg	81,23	50,00	1. Šizofrenija, šizotipni poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2) 3. Bipolarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2) 4. Bipolarni afektivni poremećaji u remisiji (F31.7) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.	

Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DOD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070046	N05AX12	amiprazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 15mg	Actavis Ltd.	Malta	1.836,30	15mg	81,23	50,00	1. Šcofrenija, šcofrenski poremećaji i poremećaji sa sumanutobu ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihoćelirnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa paroidnim simptomima ( F31.2 ). 4. Epizodni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070047	N05AX12	amiprazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 20mg	Actavis Ltd.	Malta	2.448,20	15mg	81,23	50,00	1. Šcofrenija, šcofrenski poremećaji i poremećaji sa sumanutobu ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihoćelirnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa paroidnim simptomima ( F31.2 ). 4. Epizodni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijata.
1070048	N05AX12	amiprazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 30mg	Actavis Ltd.	Malta	3.073,80	15mg	81,23	50,00	1. Šcofrenija, šcofrenski poremećaji i poremećaji sa sumanutobu ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihoćelirnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa paroidnim simptomima ( F31.2 ). 4. Epizodni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijata.
N005592	N05BA01	clazepam	DAZEPPAM	nestor za rektalnu primenu	5 po 5 mg/2,5 ml	Apoteka-gigienika laboratorija	Republika Srbija	489,90	10 mg	195,06	50,00	1. Šcofrenija, šcofrenski poremećaji i poremećaji sa sumanutobu ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihoćelirnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa paroidnim simptomima ( F31.2 ). 4. Epizodni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).	Lek propisuje zabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste odeljene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste odeljene grane medicine ( psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).
1071121	N05BA01	clazepam	BENSEDIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	Colentia a.d.	Republika Srbija	84,30	10 mg	6,29	50,00	1. Šcofrenija, šcofrenski poremećaji i poremećaji sa sumanutobu ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihoćelirnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa paroidnim simptomima ( F31.2 ). 4. Epizodni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).	Lek propisuje zabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste odeljene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste odeljene grane medicine ( psihijatra ili neurologa ).
1071122	N05BA01	clazepam	BENSEDIN	tableta	blister, 30 po 10 mg	Colentia a.d.	Republika Srbija	1.41,40	10 mg	4,71	50,00	1. Šcofrenija, šcofrenski poremećaji i poremećaji sa sumanutobu ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihoćelirnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa paroidnim simptomima ( F31.2 ). 4. Epizodni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).	Lek propisuje zabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste odeljene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste odeljene grane medicine ( psihijatra ili neurologa ).
1071701	N05BA01	clazepam	DAZEPPAM	tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	84,30	10 mg	6,29	50,00	1. Šcofrenija, šcofrenski poremećaji i poremećaji sa sumanutobu ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihoćelirnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa paroidnim simptomima ( F31.2 ). 4. Epizodni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).	Lek propisuje zabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste odeljene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste odeljene grane medicine ( psihijatra ili neurologa ).
1071702	N05BA01	clazepam	DAZEPPAM	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.41,40	10 mg	4,71	50,00	1. Šcofrenija, šcofrenski poremećaji i poremećaji sa sumanutobu ( F20 - F29 ). 2. Manična epizoda sa psihoćelirnim simptomima ( F30.2 ). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa paroidnim simptomima ( F31.2 ). 4. Epizodni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).	Lek propisuje zabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste odeljene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste odeljene grane medicine ( psihijatra ili neurologa ).

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1071171	N06BA01	clonazepam	APAZURIN	obložena tableta	blistar, 30 po 2 mg	Kika, Tovarna Zdravlje d.d.	Slovenija	69,90	10 mg	11,48	50,00		Lek propisuje zabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste obolele grane medicine do tri meseca u roku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste obolele grane medicine (psihijatra ili neuropatologa ili neurologa).
1071172	N06BA01	clonazepam	APAZURIN	obložena tableta	blistar, 30 po 5 mg	Kika, Tovarna Zdravlje d.d.	Slovenija	94,30	10 mg	6,29	50,00		Lek propisuje zabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste obolele grane medicine do tri meseca u roku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste obolele grane medicine (psihijatra ili neuropatologa ili neurologa).
1071173	N06BA01	clonazepam	APAZURIN	tableta	blistar, 30 po 10 mg	Kika, Tovarna Zdravlje d.d.	Slovenija	141,40	10 mg	4,71	50,00		Lek propisuje zabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste obolele grane medicine do tri meseca u roku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste obolele grane medicine (psihijatra ili neuropatologa ili neurologa).
1072762	N06AA09	amitriptilin	AMITRIPTYLIN	film tableta	blistar, 100 po 10 mg	Remedica Ltd.	Kipar	210,40	75 mg	15,78	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropatologa ili neurologa.
1072763	N06AA09	amitriptilin	AMITRIPTYLIN	film tableta	blistar, 30 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	97,70	75 mg	9,77	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropatologa ili neurologa.
1072790	N06AA21	maprotilin	MAPROTILIN	film tableta	blistar, 30 po 25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	173,40	0,1 g	23,12	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropatologa ili neurologa.
1072731	N06AA21	maprotilin	MAPROTILIN	film tableta	blistar, 30 po 50 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	345,40	0,1 g	23,03	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropatologa ili neurologa.
1072700	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN	kapsula, tvrdak	blistar, 30 po 20 mg	Galenita a.d.	Republika Srbija	346,10	20 mg	11,80	50,00	1. Depresivni epizoda (F32). 2. Returadni depresivni poremećaj (F33). 3. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42). 4. Bolestinje nervosa (F50.2).	Za indikaciju pod tačkom 1 samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4, samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropatologa ili neurologa.
1072930	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN	tableta	blistar, 30 po 20 mg	Henofarm a.d.	Republika Srbija	348,10	20 mg	11,60	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Returadni depresivni poremećaj (F33). 3. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42). 4. Bolestinje nervosa (F50.2).	Za indikaciju pod tačkom 1 samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4, samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropatologa ili neurologa.





Lista A. lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FO	Pakovanje i jacinma leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072920	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN	film tablete	biser, 20 po 20mg	Bosnjafek D.D.	Bosna i Hercegovina	232,00	20mg	11,60	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Opsesivno - kompulzivni poremećaj (F42). 4. Bujna nervosa (F50.2)	Za indikaciju pod tačkom 1 samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4, samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072093	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	biser, 20 po 10mg	Zdravlje s.d.	Republika Srbija	128,90	20mg	12,89	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 6. Organski poremećaji raspoloživanja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072661	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	biser, 20 po 20mg	Zdravlje s.d.	Republika Srbija	201,80	20mg	10,09	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Socijalna fobija (F40.1). 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 6. Organski poremećaji raspoloživanja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072037	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	biser, 50 po 10mg	Zdravlje s.d.	Republika Srbija	322,30	20mg	12,89	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Socijalna fobija (F40.1). 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 6. Organski poremećaji raspoloživanja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072095	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	biser, 50 po 20mg	Zdravlje s.d.	Republika Srbija	504,80	20mg	10,09	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Socijalna fobija (F40.1). 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 6. Organski poremećaji raspoloživanja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072707	N06AB03	fluoksetin	STARCTIN	film tableta	28 po 20mg	Pika Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	282,60	20mg	10,09	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 6. Organski poremećaji raspoloživanja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072815	N06AB05	paroksetin	ACTAPAX	film tableta	biser, 30 po 20mg	Zdravlje s.d.	Republika Srbija	197,50	20mg	6,58	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 5. Opsesivno - kompulzivni poremećaji (F42). 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072814	N06AB05	paroksetin	ARKETIS	tableta	biser, 30 po 20mg	Farmaceutički Analitički Laboratorijum Duiven B.V.	Holandija	197,50	20mg	6,58	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 5. Opsesivno - kompulzivni poremećaji (F42). 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Značeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072790	N06AB06	sertralín	ZOLOFT	firm tableta	biser, 28 po 50 mg	Haupt Pharma Ltdma S.R.L.	Italija	194,30	50 mg	6,58	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 5. Opsesivno - kompulzivni poremećaji (F42). 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, 17, samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5, samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072791	N06AB06	sertralín	ZOLOFT	firm tableta	biser, 28 po 100 mg	Haupt Pharma Ltdma S.R.L.	Italija	388,50	50 mg	6,58	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 5. Opsesivno - kompulzivni poremećaji (F42). 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, 17, samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5, samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072724	N06AB06	sertralín	SIDATA	firm tableta	biser, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	184,30	50 mg	6,58	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 5. Opsesivno - kompulzivni poremećaji (F42). 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, 17, samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5, samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072723	N06AB06	sertralín	SIDATA	firm tableta	biser, 28 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	368,50	50 mg	6,58	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 5. Opsesivno - kompulzivni poremećaji (F42). 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, 17, samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5, samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072644	N06AB06	sertralín	TRAGAL	firm tableta	biser, 28 po 50 mg	Galentia a.d.	Republika Srbija	184,30	50 mg	6,56	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 5. Opsesivno - kompulzivni poremećaji (F42). 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, 17, samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5, samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072643	N06AB06	sertralín	TRAGAL	firm tableta	biser, 28 po 100 mg	Galentia a.d.	Republika Srbija	368,50	50 mg	6,56	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 5. Opsesivno - kompulzivni poremećaji (F42). 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, 17, samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5, samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.



Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje /jacinna leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućeg fonda	Indikacija	Napomena
1072855	N06AB06	sertralín	ASENTRA	film tableta	biser, 28 po 50 mg	Kika, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	184,30	50 mg	6,58	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 5. Opsesivno - kompulzivni poremećaji (F42). 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, 17, samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5, samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072896	N06AB06	sertralín	ASENTRA	film tableta	biser, 28 po 100 mg	Kika, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	368,50	50 mg	6,58	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 5. Opsesivno - kompulzivni poremećaji (F42). 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, 17, samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5, samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072853	N06AB06	sertralín	SERTRALIN-TEVA	film tableta	biser, 30 po 50 mg	Teva Pharma S.L.U.	Španija	197,40	50 mg	6,98	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 5. Opsesivno - kompulzivni poremećaji (F42). 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, 17, samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5, samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072852	N06AB06	sertralín	SERTRALIN-TEVA	film tableta	biser, 30 po 100 mg	Teva Pharma S.L.U.	Španija	394,80	50 mg	6,58	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41). 5. Opsesivno - kompulzivni poremećaji (F42). 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1). 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, 17, samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5, samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072827	N06AB10	escitalopram	EUCEA	film tableta	biser, 28 po 5 mg	Kika, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	167,60	10 mg	11,61	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Socijalna fobija (F40.1). 5. Opsesivno-kompulzivni poremećaji (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072825	N06AB10	escitalopram	LATA	film tableta	biser, 28 po 10 mg	Henofarm a.d.	Republika Srbija	184,30	10 mg	6,58	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Agorafobija (F40.0). 4. Socijalni poremećaji (F40.1). 5. Opsesivno-kompulzivni poremećaji (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072628	N06AB19	escitalopram	ELICEA	film tableta	blister, 28 po 10mg	Kika, Tovarna, Zlati, d.d.	Slovenija	184,30	10mg	6,58	50,00	1. Depresivna epizoda (F32); 2. Rekurivni depresivni poremećaji (F33); 3. Panični poremećaji (F41.0); 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno-kompulzivni poremećaji (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072000	N06AB19	escitalopram	ELORYO	film tableta	blister, 30 po 5mg	Akaldid d.o.o. Beograd	Republika Srbija	174,20	10 mg	11,61	50,00	1. Depresivna epizoda (F32); 2. Rekurivni depresivni poremećaji (F33); 3. Panični poremećaji (F41.0); 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno-kompulzivni poremećaji (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072031	N06AB10	escitalopram	ELORYO	film tableta	blister, 30 po 10mg	Akaldid d.o.o. Beograd	Republika Srbija	197,50	10 mg	6,58	50,00	1. Depresivna epizoda (F32); 2. Rekurivni depresivni poremećaji (F33); 3. Panični poremećaji (F41.0); 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno-kompulzivni poremećaji (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072002	N06AB10	escitalopram	ELORYO	film tableta	blister, 30 po 15mg	Akaldid d.o.o. Beograd	Republika Srbija	572,80	10 mg	11,61	50,00	1. Depresivna epizoda (F32); 2. Rekurivni depresivni poremećaji (F33); 3. Panični poremećaji (F41.0); 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno-kompulzivni poremećaji (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072003	N06AB10	escitalopram	ELORYO	film tableta	blister, 30 po 20mg	Akaldid d.o.o. Beograd	Republika Srbija	627,20	10 mg	10,45	50,00	1. Depresivna epizoda (F32); 2. Rekurivni depresivni poremećaji (F33); 3. Panični poremećaji (F41.0); 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno-kompulzivni poremećaji (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072624	N06AB10	escitalopram	ESCITALOPRAM SANDOZ	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	197,50	10 mg	6,56	50,00	1. Depresivna epizoda (F32); 2. Rekurivni depresivni poremećaji (F33); 3. Panični poremećaji (F41.0); 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno-kompulzivni poremećaji (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072625	N06AB10	escitalopram	ESCITALOPRAM SANDOZ	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	627,20	10 mg	10,45	50,00	1. Depresivna epizoda (F32); 2. Rekurivni depresivni poremećaji (F33); 3. Panični poremećaji (F41.0); 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno-kompulzivni poremećaji (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.



Lista A. lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje / Jedinica leka	Novi proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072007	N06AE19	escitalopram	ELICEA O-TAB	orihna disperzibilna tableta	bidler, 28 po 20 mg	Genopharm SA, Kika, Tovarna Zdravil, d.o.o.	Crkva, Slovenija	585,40	10 mg	10,45	50,00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Panični poremećaj (F41.0). 4. Socijalna fobija (F40.1). 5. Opsesivno-kompulzivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1073490	N06BA04	methylfenidat	CONCERTA	tableta sa proširjenim oslobađanjem	bočica, 30 po 18 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	3.517,70	30 mg	185,43	50,00	Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara koji se bave dječom i mladićima na ekscitacione psihijatra / psihijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije školskih zdravstvenih ustanova: 1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd. 2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd. 3. Zavod za psihofiziološke premeničke i govorne patologije - Prof. dr. Zvezdana Stokich.
1073491	N06BA04	methylfenidat	CONCERTA	tableta sa proširjenim oslobađanjem	bočice, 30 po 36 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	4.176,30	30 mg	116,01	50,00	Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara koji se bave dječom i mladićima na ekscitacione psihijatra / psihijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije školskih zdravstvenih ustanova: 1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd. 2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd. 3. Zavod za psihofiziološke premeničke i govorne patologije - Prof. dr. Zvezdana Stokich.
1088055	N07AA02	prazosin	MESTINON	obložena tableta	bočica, 30 po 80 mg	ICN Polfa Rzeszow S.A.	Poljska	2.992,80	0,18 g	69,85	50,00		
1075691	N07BB01	resulfam	ESPERAL	tableta	tuba, 20 po 600 mg	Solimed-Industria Química e Farmacéutica S.A., São Paulo, Brasil	Portugaljska Republika	163,80	0,2 g	3,28	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
2087310	N07BC02	metadon	METADON	kapi	bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.566,20	25 mg	39,05	80,00	1. Lekjenje zavisnosti od opijata (F11). 2. Suvbijanje snabnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C06-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1 lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom i sekundarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspesijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucijske terapije. Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi hitnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou.
2087516	N07BC06	metadon	METADON ALKALOID	oralni kap, rastvor	bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	1.566,20	25 mg	39,05	50,00	1. Lekjenje zavisnosti od opijata (F11). 2. Suvbijanje snabnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C06-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1 lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom i sekundarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspesijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucijske terapije. Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi hitnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou.
2087515	N07BC02	metadon	METADON MOLTELI	oralni rastvor	bočica obložena 1 po 20 ml (5 mg/ml)	L. Molteni & C. De F. LU. Amb. Società D. Esercizio S.P.A.	Italija	1.433,80	25 mg	36,50	50,00	1. Lekjenje zavisnosti od opijata (F11). 2. Suvbijanje snabnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C06-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1 lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom i sekundarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspesijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucijske terapije. Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi hitnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou.

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2087508	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralne tablete, rastvor	bočica, 1 po 6 ml (10mg/ml) bočica, 1 po 250 mg	Alkaloid s.d. Skopje	Republika Makedonija	93,70	25 mg	39,04	50,00	1. Lečenje zavisnosti od opijuma (F11); 2. Svrab i/ili otežano disanje (bolu uzrokovanog karcinomom) (C00-C07); 3. Infekcije rinosinuzom (A05); 4. Infekcije usta (peril paradentnih apcesa-K12.2, gingivitis-K05); 5. Amebaza (A08); 6. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29); 7. Infekcija creva uzrokovana Clostridium Difficile (A04.7)	Za indikaciju pod tačkom 1 lek se uvodi u terapiju u zavisnosti od uzroka koji oblikuju zavisnost od opijuma, sekundarnom ili terciarnom nivou, na osnovu mišljenja pedijatrijskog psihijatra ili psihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti; a u slučaju zavisnosti od opijuma za primenu supstitucione terapije leka se uvodi u terapiju u zavisnosti od uzroka koji oblikuju zavisnost od opijuma, sekundarnom ili terciarnom nivou.
1029090	P01AB01	medroksiprolon	ORVASIL	tableta	20 po 250 mg	Galentia s.d.	Republika Srbija	134,20	2 g	53,88	50,00	1. Infekcije rinosinuzom (A05); 2. Infekcije usta (peril paradentnih apcesa-K12.2, gingivitis-K05); 3. Amebaza (A08); 4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29); 5. Infekcija creva uzrokovana Clostridium Difficile (A04.7)	
1029092	P01AB01	medroksiprolon	ORVASIL	film tableta	blistar, 20 po 400 mg	Galentia s.d.	Republika Srbija	225,40	2 g	58,35	50,00	1. Infekcije rinosinuzom (A05); 2. Infekcije usta (peril paradentnih apcesa-K12.2, gingivitis-K05); 3. Amebaza (A08); 4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29); 5. Infekcija creva uzrokovana Clostridium Difficile (A04.7)	
3098560	P02CA01	medobutol	SCLTRK	oralna suspenzija	bočica, 1 po 30 ml (100 mg/5 ml)	Galentia s.d.	Republika Srbija	161,20	0,2 g	53,73	50,00		
7110311	R01AD06	monotelazon	NASONEX	sprej za nos, suspenzija	bočica sa rasprskivačem, 1 po 140 doza (0,05%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	928,60	200 mcg	28,48	50,00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečijeg alergologa ili dečijeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije
7110313	R01AD06	monotelazon	MONIENSA	sprej za nos, suspenzija	bočica, 1 po 140 doza (50 mcg/doz); bočica sa pumpom za doziranje, 1 po 120 doza (50mcg/doz)	Avogon Pharma d.o.o.; Farmia	Republika Srbija; Francuska	446,90	200 mcg	12,74	50,00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečijeg alergologa ili dečijeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije
7110324	R01AD06	monotelazon	MONIETAZON SANDOZ	sprej za nos, suspenzija	bočica sa pumpom za doziranje, 1 po 120 doza (71,5 mcg/doz); bočica sa staklenom, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Lek farmacevtska društva d.d.	Slovenija	382,20	200 mcg	12,74	50,00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečijeg alergologa ili dečijeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije
7110333	R01AD12	butakazonil roat	AVAMYS	sprej za nos, suspenzija	bočica sa pumpom za doziranje, 1 po 120 doza (71,5 mcg/doz); bočica sa staklenom, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Glaxo Operations UK Limited, Glaxo Wellcome SA	Velika Britanija; Španija	794,30	110 mcg	28,48	50,00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečijeg alergologa ili dečijeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije
7114462	R03AC02	salbutamol	SIPRAMIDTIL	rešor za rasprskivanje	bočica sa staklenom, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Galentia s.d.	Republika Srbija	213,10	10 mg	42,82	50,00	Bronhijalna astma (J45)	



Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FO	Pakovanje i jacinma leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena lekova na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114650	R03AC02	salmeterol	VENTOLIN	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozernom: 200 po 100mcg/doba	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Glaxo Wellcome Production	Poljska Francuska	311.20	0,8 mg	12.45	50,00	Bronhijalna astma (J45).	
7114655	R03AC02	salmeterol	ECOSAL	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 200 doza (100 mcg/doba)	lexa Pharmaceuticals	Česka	190.90	0,8 mg	7.94	50,00	Bronhijalna astma (J45).	
7114691	R03AC12	salmeterol	SEREVENT inhaler CFC-free	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozernom: 1 po 120 doza (25 mcg/doba)	Henkelman a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija Glaxo Wellcome Production	Republika Srbija: Francuske	1.957.70	100 mcg	65.26	50,00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili priamobilozologa ili alergologa i interniste i postjara u službi pulmologije.
7114162	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prahak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doba)	AstraZeneca AB	Švedska	1.138.00	24 mcg	75.97	50,00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili priamobilozologa ili alergologa i interniste i postjara u službi pulmologije.
7114183	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prahak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doba)	AstraZeneca AB	Švedska	1.793.40	24 mcg	69.45	50,00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili priamobilozologa ili alergologa i interniste i postjara u službi pulmologije.
7114725	R03AK03	fenoterol, formoterol, ipratropijum bromid	BERODUAL N	rešev za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozernom: 1 po 200 doza (0,05 mg + 0,021 mg) i doza	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	760.20	6 nh.	23.41	80,00	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( I, II ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	
7114726	R03AL01	fenoterol, ipratropijum bromid	BERODUAL	rešev za ispiranje	bočica od tamnog stakla, 1 po 20 ml (0,3 mg/ml + 0,25 mg/ml)	lektio De Angeli S.R.L.	Italija	416.60			50,00	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( I, II ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	
7114670	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SEREVIDE DISCUS	prahak za inhalaciju, podstilan	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doba+100 mcg/doba)	Glaxo Wellcome Operations, Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija Francuska	2.338.80	2 nh.	77.96	80,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili priamobilozologa ili alergologa i interniste i postjara u službi pulmologije.
7114671	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SEREVIDE DISCUS	prahak za inhalaciju, podstilan	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doba+250 mcg/doba)	Glaxo Wellcome Operations, Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija Francuska	2.502.40	2 nh.	89.41	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili priamobilozologa ili alergologa i interniste i postjara u službi pulmologije.
7114672	R03AK09	salmeterol, flutikazon	SEREVIDE DISCUS	prahak za inhalaciju, podstilan	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doba+500 mcg/doba)	Glaxo Wellcome Operations, Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija Francuske	3.283.10	2 nh.	109.77	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili priamobilozologa ili alergologa i interniste i postjara u službi pulmologije.
7114673	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prahak za inhalaciju, podstilan	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doba + 260mcg/doba)	Aeropharm GmbH	Nemačka	2.275.00	2 nh.	75.93	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili priamobilozologa ili alergologa i interniste i postjara u službi pulmologije.
7114674	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prahak za inhalaciju, podstilan	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doba + 500mcg/doba)	Aeropharm GmbH	Nemačka	2.930.70	2 nh.	89.79	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili priamobilozologa ili alergologa i interniste i postjara u službi pulmologije.

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDO	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114710	R09AK03	budesonid, formoterol	SWBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 80 doza (80 mcg + 4,5 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	1.825,00	4 inh.	109,33	50,00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili prijemničarstva i alergologa i interniste i posuđa u službi pulmologije.
7114711	R09AK07	budesonid, formoterol	SWBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 80 doza (180 mcg + 4,5 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	1.523,90	4 inh.	109,28	50,00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili prijemničarstva i alergologa i interniste i posuđa u službi pulmologije.
7114610	R09AK03	formoterol, budesonid	SWBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 120 doza (4,5 mcg/doza + 120 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	2.971,40	4 inh.	99,05	50,00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili prijemničarstva i alergologa i interniste i posuđa u službi pulmologije.
7114712	R09AK07	budesonid, formoterol	SWBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 80 doza (320 mcg + 9 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	2.911,50	2 inh.	97,05	50,00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili prijemničarstva i alergologa i interniste i posuđa u službi pulmologije.
7114714	R09AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SHRONAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 120 doza (120 mcg/doza + 160 mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Operations Poland SP.Z.O.O., Norton Waterford I/A Iwak Pharmaceuticals Ireland	Holandija, Poljska, Irani	2.971,40	4 inh.	99,05	50,00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili prijemničarstva i alergologa i interniste i posuđa u službi pulmologije.
7114713	R09AK03	formoterol, budesonid	DUORESP SHRONAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 80 doza (8 mcg/doza + 320 mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Operations Poland SP.Z.O.O., Norton Waterford I/A Iwak Pharmaceuticals Ireland	Holandija, Poljska, Irani	2.911,90	2 inh.	97,05	50,00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili prijemničarstva i alergologa i interniste i posuđa u službi pulmologije.
7114605	R09AK10	vilanterol, fluticasonilium	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podstijan	inhaler, 1 po 50 doze (22 mcg/50 mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2.754,20	1 doza	92,14	50,00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili prijemničarstva i alergologa i interniste i posuđa u službi pulmologije.
7114606	R09AK10	vilanterol, fluticasonilium	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podstijan	inhaler, 1 po 30 doze (22 mcg/30 mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3.569,40	1 doza	118,98	50,00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili prijemničarstva i alergologa i interniste i posuđa u službi pulmologije.
7114652	R09BA01	beklometazon	BECLOFORTE CFC-FREE INHALER	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza)	Hemofarm s.d. u skladu sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija, Glaxo Wellcome Production	Republika Srbija, Francuska	799,90	800 mcg	12,64	80,00	Bronhijalna astma (J45)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili prijemničarstva i alergologa i interniste i posuđa u službi pulmologije.
7114672	R09BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	701,40	800 mcg	28,06	80,00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu i odrasle. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili prijemničarstva i alergologa i interniste i posuđa u službi pulmologije.





Lista A-lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114574	R09BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prešak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (4,00 mg)/doza	AstraZeneca AB	Švedska	2.003,30	800 mcg	40,08	50,00	Bronhijalna astma (A45)	Samo za decu i odrasle. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili priamotolozologa ili alergologa ili interniste i/ili pedijatra u službi pulmologije
7114578	R09BA02	budesonid	PULMICORT	suspenzija za respirisanje	ampula, 20 po 2 ml (0,25 mg/ml)	AstraZeneca AB	Švedska	1.219,20	800 mcg	87,54	50,00	Bronhijalna astma (A45)	Samo za decu.
7114577	R09BA02	budesonid	PULMICORT	suspenzija za respirisanje	ampula, 20 po 2 ml (0,5 mg/ml)	AstraZeneca AB	Švedska	1.757,20	800 mcg	71,49	50,00	Bronhijalna astma (A45)	Samo za decu.
7114597	R09BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija, Glaxo Wellcome S.A.	Republika Srbija; Španja	830,50	0,6 mg	83,05	50,00	Bronhijalna astma (A45)	Samo za decu stariju od 4 godine. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili priamotolozologa ili alergologa ili interniste i/ili pedijatra u službi pulmologije
7114595	R09BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija, Glaxo Wellcome S.A.	Republika Srbija; Španja	823,20	0,6 mg	65,86	50,00	Bronhijalna astma (A45)	Samo za decu stariju od 4 godine. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili priamotolozologa ili alergologa ili interniste i/ili pedijatra u službi pulmologije
7114596	R09BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija, Glaxo Wellcome S.A.	Republika Srbija; Španja	1.439,80	0,6 mg	59,99	50,00	Bronhijalna astma (A45)	Samo za decu stariju od 4 godine. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili priamotolozologa ili alergologa ili interniste i/ili pedijatra u službi pulmologije
7114744	R09BA08	eklesonid	ALIVESCO	resor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 6 ml (60 doza po 100 mcg)	Takeda GmbH	Nemačka	1.885,40	0,16 mg	31,42	50,00	Bronhijalna astma (A45)	Samo za decu stariju od 12 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili priamotolozologa ili alergologa ili interniste i/ili pedijatra u službi pulmologije
7114741	R09BA08	eklesonid	ALIVESCO	resor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	Takeda GmbH	Nemačka	3.122,30	0,16 mg	52,04	50,00	Bronhijalna astma (A45)	Samo za decu stariju od 12 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili priamotolozologa ili alergologa ili interniste i/ili pedijatra u službi pulmologije
3114450	R09CC02	salbutamol	SPALMOTIL	oralni resor	bea, 1 po 200 ml (2 mg/5 ml)	Galentia a.d.	Republika Srbija	214,60	12 mg	32,19	50,00		
1114451	R09CC02	salbutamol	SPALMOTIL	tableta	bea, 60 po 2 mg	Galentia a.d.	Republika Srbija	189,40	12 mg	19,94	50,00		
1114520	R09DA04	lecitin	DURCIBLIN	kapsula sa probuzemom i spalbutamolom	bea, 40 po 125 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	142,50	0,4 g	11,43	50,00		

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / jačina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
1114221	R03DA04	formoterol	DUROPHILIN	kepsulis sa produženim oslobađanjem, biser	biser, 40 po 250 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	347,50	0,4 g	13,89	50,00		
1114503	R03DA05	amoglin	AMINGLIN, Retard	tableta sa produženim oslobađanjem	biser, 20 po 350 mg	Union-Pharma d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	223,90	0,6 g	19,19	50,00		
1114293	R03DA05	amoglin	AMINGLIN, Retard	tableta sa produženim oslobađanjem	30 po 350mg	Union-Pharma d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	335,90	0,6 g	19,19	50,00		
1114640	R03DC03	montelukast	SINGULAR	tableta za žvakanje	biser, 28 po 5 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	753,60	10 mg	53,93	50,00	Bronhijalna astma, (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili primenolazologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114643	R03DC03	montelukast	SINGULAR	film tableta	biser, 28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	890,80	10 mg	24,67	50,00	Bronhijalna astma, (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativna niže dozimala inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili primenolazologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
3114644	R03DC03	montelukast	SINGULAR	granule	kesica, 28 po 4 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1.267,00	10 mg	113,13	50,00	Bronhijalna astma, (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativna niže dozimala inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili primenolazologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114645	R03DC03	montelukast	SINGULAR	tableta za žvakanje	biser, 28 po 4 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1.103,00	10 mg	98,48	50,00	Bronhijalna astma, (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativna niže dozimala inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili primenolazologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114652	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	tableta za žvakanje	biser, 28 po 4 mg	Avogen Pharma d.o.o. Pharmathen S.A.	Republika Srbija: Grčka	1.103,00	10 mg	98,48	50,00	Bronhijalna astma, (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativna niže dozimala inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili primenolazologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114653	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	tableta za žvakanje	biser, 28 po 5 mg	Avogen Pharma d.o.o. Pharmathen S.A.	Republika Srbija: Grčka	753,90	10 mg	53,93	50,00	Bronhijalna astma, (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativna niže dozimala inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili primenolazologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

Lista A-lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1114554	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	film tableta	blistar, 28 po 10 mg	Alexion Pharma d.o.o.; Pharmathel S.A.	Republika Srbija; Grčka	690,80	10 mg	24,67	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obebeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa iz smernogog ili pedijatra u službi pulmologije.
1114867	R03DC03	montelukast	TELUKA	tableta za žvakanje	blistar, 28 po 4 mg	Calentia a.d.	Republika Srbija	1.103,00	10 mg	938,48	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obebeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativna niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa iz smernogog ili pedijatra u službi pulmologije.
1114648	R03DC03	montelukast	TELUKA	tableta za žvakanje	blistar, 28 po 5 mg	Calentia a.d.	Republika Srbija	753,80	10 mg	53,83	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obebeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa iz smernogog ili pedijatra u službi pulmologije.
1114645	R03DC03	montelukast	TELUKA	film tableta	blistar, 28 po 10 mg	Calentia a.d.	Republika Srbija	690,80	10 mg	24,67	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obebeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa iz smernogog ili pedijatra u službi pulmologije.
1114652	R03DC03	montelukast	MELARTH	tableta za žvakanje	blistar, (2x14) po 5 mg	Teva Operations Poland SP.z.o.o. Pliva Hrvatska D.o.o.	Pojakar; Hrvatska	753,80	10 mg	53,83	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obebeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa iz smernogog ili pedijatra u službi pulmologije.
1114653	R03DC03	montelukast	MELARTH	tableta za žvakanje	blistar, (4x7) po 5 mg	Teva Operations Poland SP.z.o.o. Pliva Hrvatska D.o.o.	Pojakar; Hrvatska	753,80	10 mg	53,83	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obebeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa iz smernogog ili pedijatra u službi pulmologije.
1114596	R03DC03	montelukast	MELARTH	film tableta	blistar, (4x7 kom) po 10mg	Pliva Hrvatska d.o.o. Teva Operations Poland SP.Z.O.O	Hrvatska; Poljska	690,80	10 mg	24,67	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obebeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa iz smernogog ili pedijatra u službi pulmologije.
1114595	R03DC03	montelukast	MELARTH	film tableta	blistar,(2x14 kom) po 10mg	Pliva Hrvatska d.o.o. Teva Operations Poland SP.Z.O.O	Hrvatska; Poljska	690,80	10 mg	24,67	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obebeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa iz smernogog ili pedijatra u službi pulmologije.

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7112290	R06CB13	formaza sulf.	PULMOZYME	rastvor za ispirivanje	6 po 2,5 ml (2500 μg/2,5 ml)	F Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	12.567,50	2,5 mg	2.094,98	50,00	Crpna ili bronhitis sa bakterijskim uzročnikom. Respiratorni virusni (RVD, RSV, HPIV, HPIV-2).	Lek se uvodi u terapiju kod bakterijske starosne dobi od 5 godina i više na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa u levanjastom levanju za ušnu i nosnu levanju.
3058053	R06AE07	levofloks	CETRIZIN	sirop	boca sa staklena 5mg/5ml, 200ml	Stavamed d.o.o.	Republika Srbija	384,40	10mg	19,22	50,00	1. Akutni i hronični sinusitis (USO); 2. Hronična ekspanzivna upaljenja (LSO)	Samo za decu stariju od 2 godine. Za indikaciju u odeljku 1, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju u odeljku 2, na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
1068218	R06AE08	levocetilin	ROBEMAN	film tableta	blister, 10 po 5mg	Hemofarm a.d. Vrsac	Republika Srbija	136,30	5mg	13,63	50,00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
1.058.317.00	R01AE09	levosalin	ROBEMAN	film tableta	blister, 20 po 5mg	Hemofarm a.d. Vrsac	Republika Srbija	272,70	5mg	13,64	50,00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
1068947	R06AE09	levocetilin	XYZAL	film tableta	blister, 30 po 5mg	Aescia Pharmaceuticals S.R.L.	Italija	409,00	5mg	19,63	50,00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
3058278	R06AX27	deksaretalin	AERCSAL	sirop	bocica staklena, 1 po 80 ml (0,5 mg/ml)	Galentia AD	Republika Srbija	267,1	5 mg	44,52	50,00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 1 godine na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
4090121	S01AA01	betametnol	CHLORAMPHENICOL	maz za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Galentia a.d.	Republika Srbija	133,30	-	-	50,00		
4090216	S01AA01	ibromfenkol	HLORANFENKOL ALKALOID	maz za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	133,30	-	-	50,00		
7090601	S01AA11	gentamicin	GEINTOKULIN	kapi za oči, rastvor	bocica, 1 po 10 ml (0,3%)	Hemofarm d.o.o.	Republika Crna Gora	178,70	-	-	50,00		
4152260	S01AA30	bacitracin, neomicin	ENBECIN	maz za oči	tuba, 1 po 5 g (500 μg + 3,3 mg/g)	Galentia a.d.	Republika Srbija	140,00	-	-	50,00		
7090010	S01AA13	cefprofksacin	MAROCEN	kapi za oči, rastvor	bocica staklena, 1 po 5 ml (0,3%)	Hemofarm d.o.o.	Republika Crna Gora	99,30	-	-	50,00	1. Bakterijski keratitis (H16); 2. Bakterijski konjunktivitis (H10.0) 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).	
4090220	S01BA02	hidrokortison	HYDROCORTISON	maz za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Galentia a.d.	Republika Srbija	149,50	-	-	50,00		
7094033	S01ED01	poliokamp	MMOKARPIN	kapi za oči	bocica, 1 po 10 ml 2%	Hemofarm d.o.o.	Republika Crna Gora	155,70	0,4 ml	6,23	50,00		

Lista A- lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FO	Pakovanje i jacinma leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099055	S01EC03	dorzolamid	ULOM	kap za oči, rastvor	bočica sa kapalikom, 1 po 5 ml (2%)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company, Pihal Hrvatska	Mađarska; Hrvatska	307,10	0,3 ml	18,43	50,00	1. Za lečenje glaukoma (I-40) kao druga ili treća terapijska linja (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (I-40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099070	S01EC03	dorzolamid	OPTODROP	kap za oči, rastvor	bočica sa kapalikom, 1 po 5 ml (20 mg/ml)	Rallarm S.A.	Gručka	307,10	0,3 ml	18,43	50,00	1. Za lečenje glaukoma (I-40) kao druga ili treća terapijska linja (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (I-40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099095	S01EC03	dorzolamid	DORZOLAMIDE PHARMASWISS	kap za oči, rastvor	bočica sa kapalikom, 1 po 5 ml (20mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	307,10	0,3 ml	18,43	50,00	1. Za lečenje glaukoma (I-40) kao druga ili treća terapijska linja (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (I-40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099060	S01EC04	bimatolamid	AZOPT	kap za oči	6 ml (10 mg/ml)	Alcon-Couvreur	Belgija	754,70	0,2 ml	30,19	50,00	1. Za lečenje glaukoma (I-40) kao druga ili treća terapijska linja (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (I-40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099071	S01ED01	timolol	GLAUMOL	kap za oči, rastvor	bočica staklena, 1 po 5 ml 0,5% (5mg/ml)	Calentia a.d.	Republika Srbija	150,60	0,2 ml	6,02	50,00	Za lečenje novoočekivanih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linja, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099020	S01ED01	timolol	UNITIMOLCL 0,5%	kap za oči, rastvor	bočica, 1 po 10 ml 0,5%	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	223,50	0,2 ml	4,47	50,00	Za lečenje novoočekivanih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linja, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / jačina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099172	S01ED51	timolol, timoprost	VISUS PLUS	kaps. za uči, rastvor	bočica, 1 po 2,5 ml (5mg/ml+5mg/ml)	Stada Arzneimittel AG	Nemačka	503,40	0,1 ml	20,14	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest. I koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099005	S01ED51	timolol, timoprost	LANDPROST PHARMA-SWISS	kaps. za uči, rastvor	bočica sa kapalikom, 1 po 2,5 ml (5mg/ml+5mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	503,40	0,1 ml	20,14	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest. I koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099085	S01ED51	timolol, dozalamid	ULOM PLUS	kaps. za uči, rastvor	bočica sa kapalikom, 1 po 5 ml (5 mg/ml + 20 mg/ml)	Pika Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	317,20	0,2 ml	12,69	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest. I koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096632	S01ED51	timolol, dozalamid	OPTODROP-CO	kaps. za uči, rastvor	bočica sa kapalikom, 1 po 5 ml (20mg/ml+5mg/ml)	Reform S.A.	Grcika	317,20	0,2 ml	12,69	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest. I koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099182	S01ED51	timolol, dozalamid	DORZOLAMIDE PHARMA-SWISS	kaps. za uči, rastvor	bočica sa kapalikom, 1 po 5 ml (5mg/ml+20mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	317,20	0,2 ml	12,69	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest. I koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096001	S01ED51	timoprost	LANDPROCAL	kaps. za uči, rastvor	bočica sa kapalikom, 1 po 2,5 ml (50 mg/ml)	Calentia a.d.	Republika Srbija	367,20	0,1 ml	14,69	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (podrazumeva primenu beta-adrenergičnih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest. I koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.



Lista A- lekovi koji se propisuju u izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Novi proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099171	S01EE01	betanoprost	VIBUS	kaps za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2.5 ml (50 mcg/ml)	Hemofarm a d	Republika Srbija	367.20	0.1 ml	14.69	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju, na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099271	S01EE01	betanoprost	VISOBAR	kaps za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2.5 ml (50mcg/ml)	S.I.F.I., S.P.A.	Italija	367.20	0.1ml	14.69	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju, na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099141	S01EE01	betanoprost	LATAZ RAFARM	kaps za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 60 mcg/ml, 1 po 2.5ml	Rafarm S.A.	Grička	367.20	0.1 ml	14.69	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju, na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099142	S01EE01	betanoprost	LATAZ RAFARM	kaps za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 50 mcg/ml, 3 po 2.5ml	Rafarm S.A.	Grička	1,101.60	0.1 ml	14.69	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju, na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099143	S01EE01	betanoprost	LATAZ RAFARM	kaps za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 50 mcg/ml, 6 po 2.5ml	Rafarm S.A.	Grička	2,203.20	0.1 ml	14.69	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju, na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099148	S01EE01	betanoprost	LATANOX	kaps za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2.5 ml (50 mcg/ml)	Jadran galeniski laboratorij d.o.o	Hrvatska	367.20	0.1 ml	14.69	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju, na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099149	S01EE01	betanoprost	LATANOX	kaps za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 3 po 2.5 ml (50 mcg/ml)	Jadran galeniski laboratorij d.o.o	Hrvatska	1,101.60	0.1 ml	14.69	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lista A: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FD	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7098002	S01EE01	latanoprost	LATANOPROST PHARMASWISS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapalikom 1 po 2.5ml	Manex S.A.Planz A.	Grčka	367.20	0.1 ml	14.89	50.00	1. Za lečenje glaukoma (I-40) kao druge ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (I-40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju, na osnovu mišljenja oftalmologa.
7098004	S01EE01	latanoprost	LATANOPROST PHARMASWISS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapalikom 1 po 2.5ml	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	367.20	0.1 ml	14.89	50.00	1. Za lečenje glaukoma (I-40) kao druge ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (I-40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju, na osnovu mišljenja oftalmologa.
7098140	S01EE01	latanoprost	XALATAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapalikom 1 po 2.5 ml 0.025%	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	367.20	0.1 ml	14.89	50.00	1. Za lečenje glaukoma (I-40) kao druge ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (I-40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju, na osnovu mišljenja oftalmologa.
N00C03	V05DX..	bezglutensko brašno	MIX 8 MIX C BRASNO	prahak	1 kg	Dr. Schär GmbH	Italija	452.50			50.00	Celulazna bolest ( K90.0 )	Lek se uvodi u terapiju, na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterološko-medijata ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003697	V05DX..	bezglutensko brašno	BIOPROCEL I PROCEL	prahak	1 kg	Arona začin d.o.o. Prehrambena industrija	Republika Srbija	236.50			50.00	Celulazna bolest ( K90.0 )	Lek se uvodi u terapiju, na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterološko-medijata ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.



Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zastice no ime leka	FO	Pakovanje i jacinna leka	Naziv proizvođača leka d.o.o.	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućica	Indikacija	Napomena
N003859	V05DX..	bezglutensko brašno UNIVERZAL MIX	DREMIUM UNIVERZAL MIX	prafak	1 kg	Aleksandrija Fruška gora d.o.o.	Republika Srbija	236,50	..	50,00	..	..	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterološko-pediјatra ili pedijatra u slucaju gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003562	V05DX..	namirnica za entermanu istranu	NUTRIDRINK	..	..	N.V. Nutricia Zoetermeer	Holandija	181,10	..	50,00	..	1. Progressivna mioklonična epilepsija - LaFornia epilepsija (G40) 2. Mioklonična (medialnomačska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Balerova bolest (E75.4) 5. Druge ređe bolesti na predlog Republike Srbije Komisije za ređe bolesti	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod brojem 1., 2., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zadržavane zaštite
N003590	V05DX..	namirnica za entermanu istranu	NUTRISON	..	..	N.V. Nutricia Zoetermeer	Holandija	361,00	..	50,00	..	1. Progressivna mioklonična epilepsija - LaFornia epilepsija (G40) 2. Mioklonična (medialnomačska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Balerova bolest (E75.4) 5. Druge ređe bolesti na predlog Republike Srbije Komisije za ređe bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod brojem 1., 2., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zadržavane ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zadržavane zaštite
N003814	V05DX..	hrana za posebna medicinska namena	NEOCATE LCP	prah	..	SHS Internacional Ltd.	Velika Britanija	4.136,50	..	50,00	..	1. Intelektualna proleina kraljevg mleka 2. Multipa alergija na hranu	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa ili pedijatra u slucaju zadržavane delatnosti na tercijarnom nivou zadržavane zaštite





Листе А1. Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта

JML	ATC	INN	Zeljketo ime leka	FO	Pakovanje i jedina leka	Назив производа лека	Оржав произвођач лека	Смена лека на велико за повољне	ДДО	Смена лека на велико по ДДО	Републичка одговорност лека	Индикација	Напомена
U2240	A02BA02	RAMIPRIL	RAMIPRIL	RAMIPRIL LEK	100 mg / 14 dani	RAMIPRIL LEK	Orstavet, Beograd	77,77%	2016	77,77%	79%	Uzimanje treba biti ograničeno na najmanje 10 minuta pre obroka. U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.	U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.
U2241	A02BA02	RAMIPRIL	RAMIPRIL	RAMIPRIL LEK	50 mg / 14 dani	RAMIPRIL LEK	Orstavet, Beograd	77,77%	2016	77,77%	79%	Uzimanje treba biti ograničeno na najmanje 10 minuta pre obroka. U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.	U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.
U2242	A02BA02	RAMIPRIL	RAMIPRIL	RAMIPRIL LEK	25 mg / 14 dani	RAMIPRIL LEK	Orstavet, Beograd	77,77%	2016	77,77%	79%	Uzimanje treba biti ograničeno na najmanje 10 minuta pre obroka. U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.	U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.
U2243	A02BA02	RAMIPRIL	RAMIPRIL	RAMIPRIL LEK	10 mg / 14 dani	RAMIPRIL LEK	Orstavet, Beograd	77,77%	2016	77,77%	79%	Uzimanje treba biti ograničeno na najmanje 10 minuta pre obroka. U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.	U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.
U2244	A02BA02	RAMIPRIL	RAMIPRIL	RAMIPRIL LEK	5 mg / 14 dani	RAMIPRIL LEK	Orstavet, Beograd	77,77%	2016	77,77%	79%	Uzimanje treba biti ograničeno na najmanje 10 minuta pre obroka. U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.	U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.
U2245	A02BA02	RAMIPRIL	RAMIPRIL	RAMIPRIL LEK	2,5 mg / 14 dani	RAMIPRIL LEK	Orstavet, Beograd	77,77%	2016	77,77%	79%	Uzimanje treba biti ograničeno na najmanje 10 minuta pre obroka. U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.	U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.
U2246	A02BA02	RAMIPRIL	RAMIPRIL	RAMIPRIL LEK	1 mg / 14 dani	RAMIPRIL LEK	Orstavet, Beograd	77,77%	2016	77,77%	79%	Uzimanje treba biti ograničeno na najmanje 10 minuta pre obroka. U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.	U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.
U2247	A02BA02	RAMIPRIL	RAMIPRIL	RAMIPRIL LEK	0,5 mg / 14 dani	RAMIPRIL LEK	Orstavet, Beograd	77,77%	2016	77,77%	79%	Uzimanje treba biti ograničeno na najmanje 10 minuta pre obroka. U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.	U slučaju oštećenja bubrega treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja jetre treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja srca treba smanjiti dozu. U slučaju oštećenja krvnih sudova treba smanjiti dozu.







Листа А1. Лекови који се прописују и издају на основу лекашког рецепта

JML	ATC	INN	Zastupno ime leka	FO	Ракорелје / јачина лека	Назив произвођача лека	Држава произвођача лека	Цена лека на veliko za pakovanje	DDD	Цена лека на veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indicija	Napomena
L22.02.01	B01AC03	Amoxicillin	Amoxil	B01AC03	100 mg / 250 mg / 500 mg / 1 g	Amoxil	SRB	100 mg	100 mg	100 mg	0%	<p>Amoxicillin je antibiotik širokog spektra koji deluje protiv bakterija. Koristi se za lečenje brojnih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije uvoštne, respiratorne, urinarnog sistema i kožne. Amoxicillin se može koristiti i kao profilaksa protiv infekcija. Amoxicillin se može koristiti i u kombinaciji sa drugim antibioticima.</p> <p>Amoxicillin je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na ampicilin ili amoxicillin. Takođe je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara.</p> <p>Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara.</p>	Amoxicillin je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na ampicilin ili amoxicillin. Takođe je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara.
L22.02.02	B01AC06	Amoxicillin	Amoxil	B01AC06	100 mg / 250 mg / 500 mg / 1 g	Amoxil	SRB	100 mg	100 mg	100 mg	0%	<p>Amoxicillin je antibiotik širokog spektra koji deluje protiv bakterija. Koristi se za lečenje brojnih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije uvoštne, respiratorne, urinarnog sistema i kožne. Amoxicillin se može koristiti i kao profilaksa protiv infekcija. Amoxicillin se može koristiti i u kombinaciji sa drugim antibioticima.</p> <p>Amoxicillin je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na ampicilin ili amoxicillin. Takođe je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara.</p> <p>Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara.</p>	Amoxicillin je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na ampicilin ili amoxicillin. Takođe je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara.
L22.02.03	B01AC07	Amoxicillin	Amoxil	B01AC07	100 mg / 250 mg / 500 mg / 1 g	Amoxil	SRB	100 mg	100 mg	100 mg	0%	<p>Amoxicillin je antibiotik širokog spektra koji deluje protiv bakterija. Koristi se za lečenje brojnih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije uvoštne, respiratorne, urinarnog sistema i kožne. Amoxicillin se može koristiti i kao profilaksa protiv infekcija. Amoxicillin se može koristiti i u kombinaciji sa drugim antibioticima.</p> <p>Amoxicillin je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na ampicilin ili amoxicillin. Takođe je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara.</p> <p>Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara.</p>	Amoxicillin je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na ampicilin ili amoxicillin. Takođe je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara.
L22.02.04	B01AC09	Amoxicillin	Amoxil	B01AC09	100 mg / 250 mg / 500 mg / 1 g	Amoxil	SRB	100 mg	100 mg	100 mg	0%	<p>Amoxicillin je antibiotik širokog spektra koji deluje protiv bakterija. Koristi se za lečenje brojnih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije uvoštne, respiratorne, urinarnog sistema i kožne. Amoxicillin se može koristiti i kao profilaksa protiv infekcija. Amoxicillin se može koristiti i u kombinaciji sa drugim antibioticima.</p> <p>Amoxicillin je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na ampicilin ili amoxicillin. Takođe je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara.</p> <p>Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara.</p>	Amoxicillin je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na ampicilin ili amoxicillin. Takođe je kontraindiciran kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara. Amoxicillin se može koristiti i kod pacijenata sa alergijskom reakcijom na peniciline, ali samo ako je pacijent pod nadzorom lekara.



Liste A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu Izdavnog recepta

JIL	ATC	INN	Zaštićeno ime	FO	Pakovanje i jedina leka	Naziv proizvođača leka	Ostava proizvođača leka	Смена лека на велико задовољавање	DDO	Смена лека на велико по DDO	Participacija u izdavanju leka	Indikacija	Napomena
L12A05	A12BA01	AMOXICILIN	AMOXICILIN	AMOXICILIN	300 mg x 12 tableta	AGENCIJA ZA LEKOVE	AGENCIJA ZA LEKOVE	455,40	447,00	10,00	0%	Infektivne bolesti uzrokovane bakterijama, koje su osjetljive na ampicilin, kao i profilaksa infektivnih bolesti. Infektivne bolesti uzrokovane bakterijama koje su osjetljive na ampicilin, kao i profilaksa infektivnih bolesti.	
L12A02	A12BA03	AMOXICILIN	AMOXICILIN	AMOXICILIN	200 mg x 12 tableta	AGENCIJA ZA LEKOVE	AGENCIJA ZA LEKOVE	440,00	428,00	12,00	0%	Infektivne bolesti uzrokovane bakterijama, koje su osjetljive na ampicilin, kao i profilaksa infektivnih bolesti. Infektivne bolesti uzrokovane bakterijama koje su osjetljive na ampicilin, kao i profilaksa infektivnih bolesti.	
L12A02	A12BA03	AMOXICILIN	AMOXICILIN	AMOXICILIN	500 mg x 12 tableta	AGENCIJA ZA LEKOVE	AGENCIJA ZA LEKOVE	450,00	438,00	12,00	0%	Infektivne bolesti uzrokovane bakterijama, koje su osjetljive na ampicilin, kao i profilaksa infektivnih bolesti. Infektivne bolesti uzrokovane bakterijama koje su osjetljive na ampicilin, kao i profilaksa infektivnih bolesti.	
L12A02	A12BA03	AMOXICILIN	AMOXICILIN	AMOXICILIN	200 mg x 12 tableta	AGENCIJA ZA LEKOVE	AGENCIJA ZA LEKOVE	440,00	428,00	12,00	0%	Infektivne bolesti uzrokovane bakterijama, koje su osjetljive na ampicilin, kao i profilaksa infektivnih bolesti. Infektivne bolesti uzrokovane bakterijama koje su osjetljive na ampicilin, kao i profilaksa infektivnih bolesti.	
L12A02	A12BA03	AMOXICILIN	AMOXICILIN	AMOXICILIN	500 mg x 12 tableta	AGENCIJA ZA LEKOVE	AGENCIJA ZA LEKOVE	450,00	438,00	12,00	0%	Infektivne bolesti uzrokovane bakterijama, koje su osjetljive na ampicilin, kao i profilaksa infektivnih bolesti. Infektivne bolesti uzrokovane bakterijama koje su osjetljive na ampicilin, kao i profilaksa infektivnih bolesti.	





Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JML	ATC	INN	Zastupno ime leka	FO	Pravovne jedinice leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indicija	Napomena
L01AB02	B01AC06	AMOXICILIN	AMOXICILIN	300 mg/5 ml	100 mg/5 ml	AMOXICILIN	Srbija	100 mg	750 mg	100 mg	0%		1. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 2. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 3. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 4. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 5. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta.
L01AB03	B01AC06	AMOXICILIN	AMOXICILIN	300 mg/5 ml	100 mg/5 ml	AMOXICILIN	Srbija	100 mg	750 mg	100 mg	0%		1. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 2. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 3. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 4. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 5. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta.
L01AB04	B01AC06	AMOXICILIN	AMOXICILIN	300 mg/5 ml	100 mg/5 ml	AMOXICILIN	Srbija	100 mg	750 mg	100 mg	0%		1. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 2. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 3. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 4. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 5. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta.
L01AB05	B01AC06	AMOXICILIN	AMOXICILIN	300 mg/5 ml	100 mg/5 ml	AMOXICILIN	Srbija	100 mg	750 mg	100 mg	0%		1. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 2. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 3. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 4. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta. 5. Lek koji se propisuje i izdaje na obrascu lekarskog recepta.







Листе А1. Лекови који се прописују и издају на основу лекашког рецепта

JUL	ATC	INN	Zaštiteno ime leka	FO	Ракорелје јасина лека	Назва произвођача лека	Држава произвођач лека	Цена лека на veliko за pakovanje	DDD	Цена лека на veliko по DDD	Репарцијација остигавшиј лека	Индиксација	Напомена
142705	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142705	142705	142705	142705		
142706	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142706	142706	142706	142706		
142707	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142707	142707	142707	142707		
142708	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142708	142708	142708	142708		
142709	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142709	142709	142709	142709		
142710	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142710	142710	142710	142710		
142711	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142711	142711	142711	142711		
142712	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142712	142712	142712	142712		
142713	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142713	142713	142713	142713		
142714	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142714	142714	142714	142714		
142715	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142715	142715	142715	142715		
142716	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142716	142716	142716	142716		
142717	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142717	142717	142717	142717		
142718	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142718	142718	142718	142718		
142719	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142719	142719	142719	142719		
142720	B01AC06	clonazepam	Clonazepam 0,5 mg/100 mg	01340404	01340404	01340404	01340404	142720	142720	142720	142720		



Листе А1. Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта

JML	ATC	INN	Zastupnik imena	FO	Pakovanje i jedina teza	Ime proizvođača leka	Ostava proizvođača leka	Смена лека на велико за рачување	DDO	Смена лека на велико по DDO	Participacija u istraživanju leka	Indikatora	Наромента
U10A01	B01AC06	aspirin	Aspirin	010101	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A02	B01AC06	aspirin	Aspirin	010102	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A03	B01AC06	aspirin	Aspirin	010103	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A04	B01AC06	aspirin	Aspirin	010104	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A05	B01AC06	aspirin	Aspirin	010105	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A06	B01AC06	aspirin	Aspirin	010106	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A07	B01AC06	aspirin	Aspirin	010107	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A08	B01AC06	aspirin	Aspirin	010108	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A09	B01AC06	aspirin	Aspirin	010109	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A10	B01AC06	aspirin	Aspirin	010110	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A11	B01AC06	aspirin	Aspirin	010111	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A12	B01AC06	aspirin	Aspirin	010112	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A13	B01AC06	aspirin	Aspirin	010113	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A14	B01AC06	aspirin	Aspirin	010114	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A15	B01AC06	aspirin	Aspirin	010115	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A16	B01AC06	aspirin	Aspirin	010116	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A17	B01AC06	aspirin	Aspirin	010117	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A18	B01AC06	aspirin	Aspirin	010118	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A19	B01AC06	aspirin	Aspirin	010119	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
U10A20	B01AC06	aspirin	Aspirin	010120	1.000 x 100 mg / 100 mg	Aspirin	Aspirin	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		

Lista A1: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

Table with 14 columns: JML, ATC, INN, Zastiteno ime leka, FO, Pakovanje i jastina leka, Naziv proizvođača leka, Država proizvođača leka, Cena leka na veliko za pakovanje, DDD, Cena leka na veliko po DDD, Participacija osiguravajućeg lica, indikacija, Napomena







Liste A1: Lekovi koji se propisuju i ispuju na obrascu liderskog recepta

JIL	ATC	INN	Zelazeno ime leka	FO	Pakovanje i jedina leka	Ime proizvođača leka	Oružje proizvodnja leka	Sredstva na veličinu za putovanje	DDO	Sredstva na veličinu po DDO	Participacija ostvarujućih leka	Indikacija	Napomena
17.1.1.4	D11BA04	lidocain	lidocain	100 ml (100 mg/ml) ampula	100 mg/ml ampula	Novartis Lidocain 100 mg/ml ampula	Novartis Lidocain 100 mg/ml ampula	400,00	400,00	400,00	0%	U akutnoj bolnoj bolesti. Sredstvo je namenjeno za lokalnu anesteziju. Dovoljno je dati 1,5-2 mg/kg, a zatim po potrebi dodatne količine. Ne koristi se za sedaciju. Kontraindikacija: preosetljivost, teška srčana insuficijencija, nestabilna angina pectoris, blokada sinusa, atrijski i ventrikularni blok II i III stepena, istovremena terapija antiaritmikima, istovremena terapija beta-blokatorima.	
17.1.1.5	D11BA05	prilocain	prilocain	100 ml (100 mg/ml) ampula	100 mg/ml ampula	Novartis Prilocain 100 mg/ml ampula	Novartis Prilocain 100 mg/ml ampula	300,00	300,00	300,00	0%	U akutnoj bolnoj bolesti. Sredstvo je namenjeno za lokalnu anesteziju. Dovoljno je dati 1,5-2 mg/kg, a zatim po potrebi dodatne količine. Ne koristi se za sedaciju. Kontraindikacija: preosetljivost, teška srčana insuficijencija, nestabilna angina pectoris, blokada sinusa, atrijski i ventrikularni blok II i III stepena, istovremena terapija antiaritmikima, istovremena terapija beta-blokatorima.	
17.1.1.6	D11BA06	articain	articain	100 ml (100 mg/ml) ampula	100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	400,00	400,00	400,00	0%	U akutnoj bolnoj bolesti. Sredstvo je namenjeno za lokalnu anesteziju. Dovoljno je dati 1,5-2 mg/kg, a zatim po potrebi dodatne količine. Ne koristi se za sedaciju. Kontraindikacija: preosetljivost, teška srčana insuficijencija, nestabilna angina pectoris, blokada sinusa, atrijski i ventrikularni blok II i III stepena, istovremena terapija antiaritmikima, istovremena terapija beta-blokatorima.	
17.1.1.7	D11BA07	articain	articain	100 ml (100 mg/ml) ampula	100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	400,00	400,00	400,00	0%	U akutnoj bolnoj bolesti. Sredstvo je namenjeno za lokalnu anesteziju. Dovoljno je dati 1,5-2 mg/kg, a zatim po potrebi dodatne količine. Ne koristi se za sedaciju. Kontraindikacija: preosetljivost, teška srčana insuficijencija, nestabilna angina pectoris, blokada sinusa, atrijski i ventrikularni blok II i III stepena, istovremena terapija antiaritmikima, istovremena terapija beta-blokatorima.	
17.1.1.8	D11BA08	articain	articain	100 ml (100 mg/ml) ampula	100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	400,00	400,00	400,00	0%	U akutnoj bolnoj bolesti. Sredstvo je namenjeno za lokalnu anesteziju. Dovoljno je dati 1,5-2 mg/kg, a zatim po potrebi dodatne količine. Ne koristi se za sedaciju. Kontraindikacija: preosetljivost, teška srčana insuficijencija, nestabilna angina pectoris, blokada sinusa, atrijski i ventrikularni blok II i III stepena, istovremena terapija antiaritmikima, istovremena terapija beta-blokatorima.	
17.1.1.9	D11BA09	articain	articain	100 ml (100 mg/ml) ampula	100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	400,00	400,00	400,00	0%	U akutnoj bolnoj bolesti. Sredstvo je namenjeno za lokalnu anesteziju. Dovoljno je dati 1,5-2 mg/kg, a zatim po potrebi dodatne količine. Ne koristi se za sedaciju. Kontraindikacija: preosetljivost, teška srčana insuficijencija, nestabilna angina pectoris, blokada sinusa, atrijski i ventrikularni blok II i III stepena, istovremena terapija antiaritmikima, istovremena terapija beta-blokatorima.	
17.1.1.10	D11BA10	articain	articain	100 ml (100 mg/ml) ampula	100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	400,00	400,00	400,00	0%	U akutnoj bolnoj bolesti. Sredstvo je namenjeno za lokalnu anesteziju. Dovoljno je dati 1,5-2 mg/kg, a zatim po potrebi dodatne količine. Ne koristi se za sedaciju. Kontraindikacija: preosetljivost, teška srčana insuficijencija, nestabilna angina pectoris, blokada sinusa, atrijski i ventrikularni blok II i III stepena, istovremena terapija antiaritmikima, istovremena terapija beta-blokatorima.	
17.1.1.11	D11BA11	articain	articain	100 ml (100 mg/ml) ampula	100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	400,00	400,00	400,00	0%	U akutnoj bolnoj bolesti. Sredstvo je namenjeno za lokalnu anesteziju. Dovoljno je dati 1,5-2 mg/kg, a zatim po potrebi dodatne količine. Ne koristi se za sedaciju. Kontraindikacija: preosetljivost, teška srčana insuficijencija, nestabilna angina pectoris, blokada sinusa, atrijski i ventrikularni blok II i III stepena, istovremena terapija antiaritmikima, istovremena terapija beta-blokatorima.	
17.1.1.12	D11BA12	articain	articain	100 ml (100 mg/ml) ampula	100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	400,00	400,00	400,00	0%	U akutnoj bolnoj bolesti. Sredstvo je namenjeno za lokalnu anesteziju. Dovoljno je dati 1,5-2 mg/kg, a zatim po potrebi dodatne količine. Ne koristi se za sedaciju. Kontraindikacija: preosetljivost, teška srčana insuficijencija, nestabilna angina pectoris, blokada sinusa, atrijski i ventrikularni blok II i III stepena, istovremena terapija antiaritmikima, istovremena terapija beta-blokatorima.	
17.1.1.13	D11BA13	articain	articain	100 ml (100 mg/ml) ampula	100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	Novartis Articain 100 mg/ml ampula	400,00	400,00	400,00	0%	U akutnoj bolnoj bolesti. Sredstvo je namenjeno za lokalnu anesteziju. Dovoljno je dati 1,5-2 mg/kg, a zatim po potrebi dodatne količine. Ne koristi se za sedaciju. Kontraindikacija: preosetljivost, teška srčana insuficijencija, nestabilna angina pectoris, blokada sinusa, atrijski i ventrikularni blok II i III stepena, istovremena terapija antiaritmikima, istovremena terapija beta-blokatorima.	



Листе А1: Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта

JML	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jedina leka	Назив производа лека	Орган произвођача лека	Цена лека на велико задовољење	ДДО	Цена лека на велико по ДДО	Републичка партиципација у износу лека	индикатор	Напомена
177100	C02BA1	lisinapril	Lisinapril	90 (30,45)	1 (30,45) / 3 (91,35)	Lisinapril	Теракс Фарма	42,00	90,00	90,00	0%	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта	
177100	C02BA1	lisinapril	Lisinapril	90 (30,45)	1 (30,45) / 3 (91,35)	Lisinapril	Теракс Фарма	42,00	90,00	90,00	0%	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта	
177100	C02BA1	lisinapril	Lisinapril	90 (30,45)	1 (30,45) / 3 (91,35)	Lisinapril	Теракс Фарма	42,00	90,00	90,00	0%	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта	
177100	C02BA1	lisinapril	Lisinapril	90 (30,45)	1 (30,45) / 3 (91,35)	Lisinapril	Теракс Фарма	42,00	90,00	90,00	0%	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта	
177100	C02BA1	lisinapril	Lisinapril	90 (30,45)	1 (30,45) / 3 (91,35)	Lisinapril	Теракс Фарма	42,00	90,00	90,00	0%	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта	
177100	C02BA1	lisinapril	Lisinapril	90 (30,45)	1 (30,45) / 3 (91,35)	Lisinapril	Теракс Фарма	42,00	90,00	90,00	0%	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта	
177100	C02BA1	lisinapril	Lisinapril	90 (30,45)	1 (30,45) / 3 (91,35)	Lisinapril	Теракс Фарма	42,00	90,00	90,00	0%	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта	
177100	C02BA1	lisinapril	Lisinapril	90 (30,45)	1 (30,45) / 3 (91,35)	Lisinapril	Теракс Фарма	42,00	90,00	90,00	0%	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта	
177100	C02BA1	lisinapril	Lisinapril	90 (30,45)	1 (30,45) / 3 (91,35)	Lisinapril	Теракс Фарма	42,00	90,00	90,00	0%	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта	
177100	C02BA1	lisinapril	Lisinapril	90 (30,45)	1 (30,45) / 3 (91,35)	Lisinapril	Теракс Фарма	42,00	90,00	90,00	0%	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта	



Liste A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu Izdarskog recepta

JIL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jedina lek	Ime proizvođača leka	Ostava proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDO	Cena leka na veliko po DDO	Participacija u isplacivanju leka	Indikacija	Parosoma
117-523	G03FA01	benzetin	BENZETIN	90 tableta	1 x 90 (90 x 100) (100 x 100)	HEXAL-HEXAL AG	HEXAL	11,20	0,12	0,12	100	U terapiji akutne i hronične bakterijske infekcije uzročnika: streptokok i stafilokok, kao i sekundarne infekcije uzročnika: pneumokok i enterokok. Takođe se koristi u terapiji hronične infekcije uzročnika: listerije. Takođe se koristi u terapiji infekcije uzročnika: klamidije. Takođe se koristi u terapiji infekcije uzročnika: toksoplazme.	Parosoma
117-523	A01AD04	clindamicin	CLINDAMICIN	90 tableta	1 x 90 (90 x 100) (100 x 100)	HEXAL-HEXAL AG	HEXAL	3,48	0,38	0,38	100	U terapiji akutne i hronične bakterijske infekcije uzročnika: stafilokok i streptokok, kao i sekundarne infekcije uzročnika: pneumokok i enterokok. Takođe se koristi u terapiji hronične infekcije uzročnika: klamidije. Takođe se koristi u terapiji infekcije uzročnika: toksoplazme.	Parosoma
117-523	A01AD04	clindamicin	CLINDAMICIN	90 tableta	1 x 90 (90 x 100) (100 x 100)	HEXAL-HEXAL AG	HEXAL	3,48	0,38	0,38	100	U terapiji akutne i hronične bakterijske infekcije uzročnika: stafilokok i streptokok, kao i sekundarne infekcije uzročnika: pneumokok i enterokok. Takođe se koristi u terapiji hronične infekcije uzročnika: klamidije. Takođe se koristi u terapiji infekcije uzročnika: toksoplazme.	Parosoma
117-523	A01AD04	clindamicin	CLINDAMICIN	144 tableta	1 x 144 (144 x 100) (100 x 100)	HEXAL-HEXAL AG	HEXAL	4,29	0,30	0,30	100	U terapiji akutne i hronične bakterijske infekcije uzročnika: stafilokok i streptokok, kao i sekundarne infekcije uzročnika: pneumokok i enterokok. Takođe se koristi u terapiji hronične infekcije uzročnika: klamidije. Takođe se koristi u terapiji infekcije uzročnika: toksoplazme.	Parosoma
117-523	A01AD04	clindamicin	CLINDAMICIN	144 tableta	1 x 144 (144 x 100) (100 x 100)	HEXAL-HEXAL AG	HEXAL	4,29	0,30	0,30	100	U terapiji akutne i hronične bakterijske infekcije uzročnika: stafilokok i streptokok, kao i sekundarne infekcije uzročnika: pneumokok i enterokok. Takođe se koristi u terapiji hronične infekcije uzročnika: klamidije. Takođe se koristi u terapiji infekcije uzročnika: toksoplazme.	Parosoma



Листа А1. Лекови који се прописују и издају на основу лекашког рецепта

JHL	ATC	INN	Zastupeno ime lek	FO	Ракорелје јасина лека	Назва производа лека	Држава произвођач лека	Цена лека на veliko по DDD	Смена лека на veliko за pakovanje	DDD	Цена лека на veliko по DDD	Participacija ostigunog lica	Indicacija	Меропена
1511753	C02BA07	levamisole	LEVAMISOL	150444	Бифар, Београд	Бифар, Београд	Београд, Србија	44,33	44,33	100,00	44,33	0,00	1. У лечењу хроничног амбиазиозиса. 2. У лечењу хроничног опистхоциријазиса. 3. У лечењу хроничног трихинелезијазиса. 4. У лечењу хроничног анкилостоминозијазиса. 5. У лечењу хроничног стронгилоидозиса. 6. У лечењу хроничног трихоцефалозиса.	Лекарство намењено за лечење хроничних паразитских болести.
1511754	C02BA07	levamisole	LEVAMISOL	150444	Бифар, Београд	Бифар, Београд	Београд, Србија	44,33	44,33	100,00	44,33	0,00	1. У лечењу хроничног амбиазиозиса. 2. У лечењу хроничног опистхоциријазиса. 3. У лечењу хроничног трихинелезијазиса. 4. У лечењу хроничног анкилостоминозијазиса. 5. У лечењу хроничног стронгилоидозиса. 6. У лечењу хроничног трихоцефалозиса.	Лекарство намењено за лечење хроничних паразитских болести.
1511755	C02BA07	levamisole	LEVAMISOL	150444	Бифар, Београд	Бифар, Београд	Београд, Србија	44,33	44,33	100,00	44,33	0,00	1. У лечењу хроничног амбиазиозиса. 2. У лечењу хроничног опистхоциријазиса. 3. У лечењу хроничног трихинелезијазиса. 4. У лечењу хроничног анкилостоминозијазиса. 5. У лечењу хроничног стронгилоидозиса. 6. У лечењу хроничног трихоцефалозиса.	Лекарство намењено за лечење хроничних паразитских болести.
1511756	C02BA07	levamisole	LEVAMISOL	150444	Бифар, Београд	Бифар, Београд	Београд, Србија	44,33	44,33	100,00	44,33	0,00	1. У лечењу хроничног амбиазиозиса. 2. У лечењу хроничног опистхоциријазиса. 3. У лечењу хроничног трихинелезијазиса. 4. У лечењу хроничног анкилостоминозијазиса. 5. У лечењу хроничног стронгилоидозиса. 6. У лечењу хроничног трихоцефалозиса.	Лекарство намењено за лечење хроничних паразитских болести.
1511757	C02BA07	levamisole	LEVAMISOL	150444	Бифар, Београд	Бифар, Београд	Београд, Србија	44,33	44,33	100,00	44,33	0,00	1. У лечењу хроничног амбиазиозиса. 2. У лечењу хроничног опистхоциријазиса. 3. У лечењу хроничног трихинелезијазиса. 4. У лечењу хроничног анкилостоминозијазиса. 5. У лечењу хроничног стронгилоидозиса. 6. У лечењу хроничног трихоцефалозиса.	Лекарство намењено за лечење хроничних паразитских болести.





Листа А1. Лекови који се прописују и издају на основу лекашког рецепта

Table with columns: JMK, ATC, INN, Zastupno ime leka, FO, Pakovanje i jacin leka, Naziv proizvođača leka, Država proizvođača leka, Cena leka na veliko za pakovanje, DDD, Cena leka na veliko po DDD, Participacija osiguravajućih lica, Indeksija, Napomena



Lista A1. Lekovi koji se propisuju i nalazi na obrazac lekarskog recepta

JML	ATC	INN	Zastupno ime leka	EO	Rakovanje i jačina leka	Način proizvodnje leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indicija	Napomena
B01AC06	C02BA01	Metoprolol	Metoprolol Eurofarm, Beograd	B01AC06	10 mg, 25 mg, 50 mg 10 mg, 25 mg, 50 mg	Metoprolol, EUROFARM, BE	SRBija	200,00	100,00	100,00	0%	Iskustveno ustanovljena potreba. Za bolesnike sa hipertenzijom, koronarnom bolešću srca, kardiovaskularnim rizikom, ishemijskom bolešću srca, infarkom miokarda i anginalnom bolešću srca. Kontraindikacija: "obrnuto blokiranje".	iskustveno ustanovljena potreba
B01AC06	C02BA01	Metoprolol	Metoprolol Eurofarm, Beograd	B01AC06	10 mg, 25 mg, 50 mg 10 mg, 25 mg, 50 mg	Metoprolol, EUROFARM, BE	SRBija	200,00	100,00	100,00	0%	Iskustveno ustanovljena potreba. Za bolesnike sa hipertenzijom, koronarnom bolešću srca, kardiovaskularnim rizikom, ishemijskom bolešću srca, infarkom miokarda i anginalnom bolešću srca. Kontraindikacija: "obrnuto blokiranje".	iskustveno ustanovljena potreba
B01AC06	C02BA01	Metoprolol	Metoprolol Eurofarm, Beograd	B01AC06	10 mg, 25 mg, 50 mg 10 mg, 25 mg, 50 mg	Metoprolol, EUROFARM, BE	SRBija	200,00	100,00	100,00	0%	Iskustveno ustanovljena potreba. Za bolesnike sa hipertenzijom, koronarnom bolešću srca, kardiovaskularnim rizikom, ishemijskom bolešću srca, infarkom miokarda i anginalnom bolešću srca. Kontraindikacija: "obrnuto blokiranje".	iskustveno ustanovljena potreba
B01AC06	C02BA01	Metoprolol	Metoprolol Eurofarm, Beograd	B01AC06	10 mg, 25 mg, 50 mg 10 mg, 25 mg, 50 mg	Metoprolol, EUROFARM, BE	SRBija	200,00	100,00	100,00	0%	Iskustveno ustanovljena potreba. Za bolesnike sa hipertenzijom, koronarnom bolešću srca, kardiovaskularnim rizikom, ishemijskom bolešću srca, infarkom miokarda i anginalnom bolešću srca. Kontraindikacija: "obrnuto blokiranje".	iskustveno ustanovljena potreba
B01AC06	C02BA01	Metoprolol	Metoprolol Eurofarm, Beograd	B01AC06	10 mg, 25 mg, 50 mg 10 mg, 25 mg, 50 mg	Metoprolol, EUROFARM, BE	SRBija	200,00	100,00	100,00	0%	Iskustveno ustanovljena potreba. Za bolesnike sa hipertenzijom, koronarnom bolešću srca, kardiovaskularnim rizikom, ishemijskom bolešću srca, infarkom miokarda i anginalnom bolešću srca. Kontraindikacija: "obrnuto blokiranje".	iskustveno ustanovljena potreba
B01AC06	C02BA01	Metoprolol	Metoprolol Eurofarm, Beograd	B01AC06	10 mg, 25 mg, 50 mg 10 mg, 25 mg, 50 mg	Metoprolol, EUROFARM, BE	SRBija	200,00	100,00	100,00	0%	Iskustveno ustanovljena potreba. Za bolesnike sa hipertenzijom, koronarnom bolešću srca, kardiovaskularnim rizikom, ishemijskom bolešću srca, infarkom miokarda i anginalnom bolešću srca. Kontraindikacija: "obrnuto blokiranje".	iskustveno ustanovljena potreba
B01AC06	C02BA01	Metoprolol	Metoprolol Eurofarm, Beograd	B01AC06	10 mg, 25 mg, 50 mg 10 mg, 25 mg, 50 mg	Metoprolol, EUROFARM, BE	SRBija	200,00	100,00	100,00	0%	Iskustveno ustanovljena potreba. Za bolesnike sa hipertenzijom, koronarnom bolešću srca, kardiovaskularnim rizikom, ishemijskom bolešću srca, infarkom miokarda i anginalnom bolešću srca. Kontraindikacija: "obrnuto blokiranje".	iskustveno ustanovljena potreba
B01AC06	C02BA01	Metoprolol	Metoprolol Eurofarm, Beograd	B01AC06	10 mg, 25 mg, 50 mg 10 mg, 25 mg, 50 mg	Metoprolol, EUROFARM, BE	SRBija	200,00	100,00	100,00	0%	Iskustveno ustanovljena potreba. Za bolesnike sa hipertenzijom, koronarnom bolešću srca, kardiovaskularnim rizikom, ishemijskom bolešću srca, infarkom miokarda i anginalnom bolešću srca. Kontraindikacija: "obrnuto blokiranje".	iskustveno ustanovljena potreba
B01AC06	C02BA01	Metoprolol	Metoprolol Eurofarm, Beograd	B01AC06	10 mg, 25 mg, 50 mg 10 mg, 25 mg, 50 mg	Metoprolol, EUROFARM, BE	SRBija	200,00	100,00	100,00	0%	Iskustveno ustanovljena potreba. Za bolesnike sa hipertenzijom, koronarnom bolešću srca, kardiovaskularnim rizikom, ishemijskom bolešću srca, infarkom miokarda i anginalnom bolešću srca. Kontraindikacija: "obrnuto blokiranje".	iskustveno ustanovljena potreba

Листе А1. Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта

JML	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Назив произвођача лека	Орiginalни произвођач лека	Цена лека на велико задовољење	DDO	Цена лека на велико по DD	Учешће на остућеном леку	Индикација	Напомена
167-505	C02BA07	Paracetamol	Paracetamol	30x400	30x400 mg/400 mg	Novartis Farmaceutika d.o.o.	Novartis Farmaceutika d.o.o.	157,2	157,20	157,2	100	Синтетички лекови који садрже парасетамол, укључујући комбинације са аналгетиком, који се користе за лечење болова и смањивање температуре. Не садрже аналгетички део. Не садрже аналгетички део. Не садрже аналгетички део.	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта.
167-506	C02BA07	Paracetamol	Paracetamol	30x400	30x400 mg/400 mg	Novartis Farmaceutika d.o.o.	Novartis Farmaceutika d.o.o.	157,2	157,20	157,2	100	Синтетички лекови који садрже парасетамол, укључујући комбинације са аналгетиком, који се користе за лечење болова и смањивање температуре. Не садрже аналгетички део. Не садрже аналгетички део. Не садрже аналгетички део.	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта.
167-507	C02BA07	Paracetamol	Paracetamol	30x400	30x400 mg/400 mg	Novartis Farmaceutika d.o.o.	Novartis Farmaceutika d.o.o.	157,2	157,20	157,2	100	Синтетички лекови који садрже парасетамол, укључујући комбинације са аналгетиком, који се користе за лечење болова и смањивање температуре. Не садрже аналгетички део. Не садрже аналгетички део. Не садрже аналгетички део.	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта.
167-508	C02BA07	Paracetamol	Paracetamol	30x400	30x400 mg/400 mg	Novartis Farmaceutika d.o.o.	Novartis Farmaceutika d.o.o.	157,2	157,20	157,2	100	Синтетички лекови који садрже парасетамол, укључујући комбинације са аналгетиком, који се користе за лечење болова и смањивање температуре. Не садрже аналгетички део. Не садрже аналгетички део. Не садрже аналгетички део.	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта.
167-509	C02BA07	Paracetamol	Paracetamol	30x400	30x400 mg/400 mg	Novartis Farmaceutika d.o.o.	Novartis Farmaceutika d.o.o.	157,2	157,20	157,2	100	Синтетички лекови који садрже парасетамол, укључујући комбинације са аналгетиком, који се користе за лечење болова и смањивање температуре. Не садрже аналгетички део. Не садрже аналгетички део. Не садрже аналгетички део.	Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта.

Листа А1. Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекашког рецепта

JHL	ATC	INN	Zastupno ime leka	FO	Ракорте/јединица	Назив производа лека	Држава произвођача лека	Цена лека на видно за партијање	DDD	Цена лека на великој DDD	Participacija osiguranog lica	indicekta	Napomena
L05AD05	C02BA01	clonazepam	CLONAZEPAM, FORTIS		100,00 mg 100,00 mg	АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС	FRANCE, BELGIUM	100,00 mg	100,00 mg		90%		
L05AD05	C02BA01	clonazepam	CLONAZEPAM, FORTIS		100,00 mg 100,00 mg	АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС	FRANCE, BELGIUM	100,00 mg	100,00 mg		90%		
L05AD05	C02BA01	clonazepam	CLONAZEPAM, FORTIS		100,00 mg 100,00 mg	АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС	FRANCE, BELGIUM	100,00 mg	100,00 mg		90%		
L05AD05	C02BA01	clonazepam	CLONAZEPAM, FORTIS		100,00 mg 100,00 mg	АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС	FRANCE, BELGIUM	100,00 mg	100,00 mg		90%		
L05AD05	C02BA01	clonazepam	CLONAZEPAM, FORTIS		100,00 mg 100,00 mg	АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС	FRANCE, BELGIUM	100,00 mg	100,00 mg		90%		
L05AD05	C02BA01	clonazepam	CLONAZEPAM, FORTIS		100,00 mg 100,00 mg	АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС	FRANCE, BELGIUM	100,00 mg	100,00 mg		90%		
L05AD05	C02BA01	clonazepam	CLONAZEPAM, FORTIS		100,00 mg 100,00 mg	АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС	FRANCE, BELGIUM	100,00 mg	100,00 mg		90%		
L05AD05	C02BA01	clonazepam	CLONAZEPAM, FORTIS		100,00 mg 100,00 mg	АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС	FRANCE, BELGIUM	100,00 mg	100,00 mg		90%		
L05AD05	C02BA01	clonazepam	CLONAZEPAM, FORTIS		100,00 mg 100,00 mg	АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС АТЕСТА, ЗИТА, ПАРИС	FRANCE, BELGIUM	100,00 mg	100,00 mg		90%		



Lista A1: Lekovi koji se propisuju i nalazi na obrascu lekarskog recepta

JML	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Ракорелје јасина лека	Назив произвођача лека	Држава произвођача лека	Цена лека на veliko за pakovanje	ДДД	Цена лека на veliko по ДДД	Participacija ostigunostig leka	Indicacija	Napomena
L14A01	C02AD01	clonidine	clonidine 2 mg tablete	9000000000	clonidine 2 mg tablete	Teophrastus LLC	USA	1000000	00000	00000	00000	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije
L14A02	C02AD02	diltiazem	diltiazem 60 mg tablete, B	1000000000	diltiazem 60 mg tablete	Teophrastus LLC	USA	1000000	00000	00000	00000	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije
L14A03	C02AD03	diltiazem	diltiazem 90 mg tablete, B	1000000000	diltiazem 90 mg tablete	Teophrastus LLC	USA	1000000	00000	00000	00000	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije
L14A04	C02AD04	diltiazem	diltiazem 120 mg tablete, B	1000000000	diltiazem 120 mg tablete	Teophrastus LLC	USA	1000000	00000	00000	00000	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije
L14A05	C02AD05	diltiazem	diltiazem 180 mg tablete, B	1000000000	diltiazem 180 mg tablete	Teophrastus LLC	USA	1000000	00000	00000	00000	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije
L14A06	C02AD06	diltiazem	diltiazem 30 mg tablete, B	1000000000	diltiazem 30 mg tablete	Teophrastus LLC	USA	1000000	00000	00000	00000	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije
L14A07	C02AD07	diltiazem	diltiazem 60 mg tablete, B	1000000000	diltiazem 60 mg tablete	Teophrastus LLC	USA	1000000	00000	00000	00000	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije
L14A08	C02AD08	diltiazem	diltiazem 90 mg tablete, B	1000000000	diltiazem 90 mg tablete	Teophrastus LLC	USA	1000000	00000	00000	00000	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije
L14A09	C02AD09	diltiazem	diltiazem 120 mg tablete, B	1000000000	diltiazem 120 mg tablete	Teophrastus LLC	USA	1000000	00000	00000	00000	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije
L14A10	C02AD10	diltiazem	diltiazem 180 mg tablete, B	1000000000	diltiazem 180 mg tablete	Teophrastus LLC	USA	1000000	00000	00000	00000	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije	1. hipertenzija 2. angina pectoris 3. koronarna bolest srca 4. migrena 5. infarkt miokarda 6. cerebrovaskularna bolest 7. simptomi opstojne hemoroidne bolesti 8. simptomi opstojne hipertenzije

Листе А1 - Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта

JML	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Ime proizvođača leka	Ординар proizvođača leka	Цена лека на veliko za pakovanje	DDO	Цена лека на veliko po DDO	Participacija ostigunolaga leka	Indikacija	Napomena
172425	C02BA07	clonazepam	Clonazepam	90 tableta	Tablete, 0,5mg	Zdravko, Beograd	Tablete, 0,5mg	427,0	2,00	14,0	0%	Uzročnik epileptičkih napada, u kombinaciji sa drugim antiepileptičkim lekovima, kao i u kombinaciji sa drugim lekovima koji se koriste u terapiji epilepsije.	Uzročnik epileptičkih napada, u kombinaciji sa drugim antiepileptičkim lekovima, kao i u kombinaciji sa drugim lekovima koji se koriste u terapiji epilepsije.
172427	C02BA07	clonazepam	Clonazepam	90 tableta	Tablete, 0,5mg	Zdravko, Beograd	Tablete, 0,5mg	427,0	2,00	14,0	0%	Uzročnik epileptičkih napada, u kombinaciji sa drugim antiepileptičkim lekovima, kao i u kombinaciji sa drugim lekovima koji se koriste u terapiji epilepsije.	Uzročnik epileptičkih napada, u kombinaciji sa drugim antiepileptičkim lekovima, kao i u kombinaciji sa drugim lekovima koji se koriste u terapiji epilepsije.
172429	C02BA07	clonazepam	Clonazepam	90 tableta	Tablete, 0,5mg	Zdravko, Beograd	Tablete, 0,5mg	427,0	2,00	14,0	0%	Uzročnik epileptičkih napada, u kombinaciji sa drugim antiepileptičkim lekovima, kao i u kombinaciji sa drugim lekovima koji se koriste u terapiji epilepsije.	Uzročnik epileptičkih napada, u kombinaciji sa drugim antiepileptičkim lekovima, kao i u kombinaciji sa drugim lekovima koji se koriste u terapiji epilepsije.
172432	C02BA07	clonazepam	Clonazepam	90 tableta	Tablete, 0,5mg	Zdravko, Beograd	Tablete, 0,5mg	427,0	2,00	14,0	0%	Uzročnik epileptičkih napada, u kombinaciji sa drugim antiepileptičkim lekovima, kao i u kombinaciji sa drugim lekovima koji se koriste u terapiji epilepsije.	Uzročnik epileptičkih napada, u kombinaciji sa drugim antiepileptičkim lekovima, kao i u kombinaciji sa drugim lekovima koji se koriste u terapiji epilepsije.
172434	C02BA07	clonazepam	Clonazepam	90 tableta	Tablete, 0,5mg	Zdravko, Beograd	Tablete, 0,5mg	427,0	2,00	14,0	0%	Uzročnik epileptičkih napada, u kombinaciji sa drugim antiepileptičkim lekovima, kao i u kombinaciji sa drugim lekovima koji se koriste u terapiji epilepsije.	Uzročnik epileptičkih napada, u kombinaciji sa drugim antiepileptičkim lekovima, kao i u kombinaciji sa drugim lekovima koji se koriste u terapiji epilepsije.



Liste A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JML	ATC	INN	Zastupno ime leka	FO	Provenijencija leka	Drzava proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indicija	Napomena
L12A07	C02BA02	clonidine	clonidine	991 08 000	clonidine 0,1 mg/25 mg/ml	Engleska	13,27	10,00	13,27	100%	U slučaju primene leka u terapiji hipertenzije, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za hipertenziju je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji angine pectoris, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za anginu pectoris je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji migrene, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za migrenu je 0,3 mg, 2 puta dnevno.	
L12A07	C02BA02	clonidine	clonidine	991 08 000	clonidine 0,1 mg/25 mg/ml	Engleska	13,27	10,00	13,27	100%	U slučaju primene leka u terapiji hipertenzije, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za hipertenziju je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji angine pectoris, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za anginu pectoris je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji migrene, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za migrenu je 0,3 mg, 2 puta dnevno.	
L12A07	C02BA02	clonidine	clonidine	991 08 000	clonidine 0,1 mg/25 mg/ml	Engleska	13,27	10,00	13,27	100%	U slučaju primene leka u terapiji hipertenzije, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za hipertenziju je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji angine pectoris, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za anginu pectoris je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji migrene, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za migrenu je 0,3 mg, 2 puta dnevno.	
L12A07	C02BA02	clonidine	clonidine	991 08 000	clonidine 0,1 mg/25 mg/ml	Engleska	13,27	10,00	13,27	100%	U slučaju primene leka u terapiji hipertenzije, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za hipertenziju je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji angine pectoris, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za anginu pectoris je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji migrene, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za migrenu je 0,3 mg, 2 puta dnevno.	
L12A07	C02BA02	clonidine	clonidine	991 08 000	clonidine 0,1 mg/25 mg/ml	Engleska	13,27	10,00	13,27	100%	U slučaju primene leka u terapiji hipertenzije, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za hipertenziju je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji angine pectoris, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za anginu pectoris je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji migrene, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za migrenu je 0,3 mg, 2 puta dnevno.	
L12A07	C02BA02	clonidine	clonidine	991 08 000	clonidine 0,1 mg/25 mg/ml	Engleska	13,27	10,00	13,27	100%	U slučaju primene leka u terapiji hipertenzije, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za hipertenziju je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji angine pectoris, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za anginu pectoris je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji migrene, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za migrenu je 0,3 mg, 2 puta dnevno.	
L12A07	C02BA02	clonidine	clonidine	991 08 000	clonidine 0,1 mg/25 mg/ml	Engleska	13,27	10,00	13,27	100%	U slučaju primene leka u terapiji hipertenzije, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za hipertenziju je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji angine pectoris, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za anginu pectoris je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji migrene, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za migrenu je 0,3 mg, 2 puta dnevno.	
L12A07	C02BA02	clonidine	clonidine	991 08 000	clonidine 0,1 mg/25 mg/ml	Engleska	13,27	10,00	13,27	100%	U slučaju primene leka u terapiji hipertenzije, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za hipertenziju je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji angine pectoris, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za anginu pectoris je 0,3 mg, 2 puta dnevno. U slučaju primene leka u terapiji migrene, treba biti oprezan zbog mogućeg smanjenja krvnog pritiska. Preporučena doza za migrenu je 0,3 mg, 2 puta dnevno.	



Листа А1. Лекови који се препишују и издају на основу лекашког рецепта

Table with columns: JML, ATC, INN, Zastupno ime lica, FO, Pakovanje i jačina lica, Naziv proizvođača lica, Država proizvođača lica, Cena lica na veliko za pakovanje, DDD, Cena lica na veliko po DDD, Participacija osiguranog lica, indikacija, and Napomena.

Листе А1. Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта

JML	ATC	INN	Zaštićeno ime lek	FO	Pakovanje i jedina leka	Назив производа лека	Орiginalni произвођач лека	Смена лека на велико задовољење	DDO	Смена лека на велико по ДОО	Република за осигурање лека	Индикација	Напомена
172202	C03CA07	fosfociklidi	fosfociklid	90 x 0,45	0,45 g x 100	fosfociklid 0,45 g x 100	Српски лекови	172202	172202	172202	172202	Српски лекови је једини издавач лека у Србији. У складу са одредбом члана 114. став 1. Закона о лековима, издавач лека је обавезан да издаје лек на велико по ДОО. Српски лекови је издавач лека у Србији.	
172203	C03CA07	fosfociklidi	fosfociklid	90 x 0,45	0,45 g x 100	fosfociklid 0,45 g x 100	Српски лекови	172203	172203	172203	172203	Српски лекови је једини издавач лека у Србији. У складу са одредбом члана 114. став 1. Закона о лековима, издавач лека је обавезан да издаје лек на велико по ДОО. Српски лекови је издавач лека у Србији.	
172204	C03CA07	fosfociklidi	fosfociklid	90 x 0,45	0,45 g x 100	fosfociklid 0,45 g x 100	Српски лекови	172204	172204	172204	172204	Српски лекови је једини издавач лека у Србији. У складу са одредбом члана 114. став 1. Закона о лековима, издавач лека је обавезан да издаје лек на велико по ДОО. Српски лекови је издавач лека у Србији.	
172205	C03CA07	fosfociklidi	fosfociklid	90 x 0,45	0,45 g x 100	fosfociklid 0,45 g x 100	Српски лекови	172205	172205	172205	172205	Српски лекови је једини издавач лека у Србији. У складу са одредбом члана 114. став 1. Закона о лековима, издавач лека је обавезан да издаје лек на велико по ДОО. Српски лекови је издавач лека у Србији.	
172206	C03CA07	fosfociklidi	fosfociklid	90 x 0,45	0,45 g x 100	fosfociklid 0,45 g x 100	Српски лекови	172206	172206	172206	172206	Српски лекови је једини издавач лека у Србији. У складу са одредбом члана 114. став 1. Закона о лековима, издавач лека је обавезан да издаје лек на велико по ДОО. Српски лекови је издавач лека у Србији.	
172207	C03CA07	fosfociklidi	fosfociklid	90 x 0,45	0,45 g x 100	fosfociklid 0,45 g x 100	Српски лекови	172207	172207	172207	172207	Српски лекови је једини издавач лека у Србији. У складу са одредбом члана 114. став 1. Закона о лековима, издавач лека је обавезан да издаје лек на велико по ДОО. Српски лекови је издавач лека у Србији.	
172208	C03CA07	fosfociklidi	fosfociklid	90 x 0,45	0,45 g x 100	fosfociklid 0,45 g x 100	Српски лекови	172208	172208	172208	172208	Српски лекови је једини издавач лека у Србији. У складу са одредбом члана 114. став 1. Закона о лековима, издавач лека је обавезан да издаје лек на велико по ДОО. Српски лекови је издавач лека у Србији.	
172209	C03CA07	fosfociklidi	fosfociklid	90 x 0,45	0,45 g x 100	fosfociklid 0,45 g x 100	Српски лекови	172209	172209	172209	172209	Српски лекови је једини издавач лека у Србији. У складу са одредбом члана 114. став 1. Закона о лековима, издавач лека је обавезан да издаје лек на велико по ДОО. Српски лекови је издавач лека у Србији.	
172210	C03CA07	fosfociklidi	fosfociklid	90 x 0,45	0,45 g x 100	fosfociklid 0,45 g x 100	Српски лекови	172210	172210	172210	172210	Српски лекови је једини издавач лека у Србији. У складу са одредбом члана 114. став 1. Закона о лековима, издавач лека је обавезан да издаје лек на велико по ДОО. Српски лекови је издавач лека у Србији.	

Liste A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

Table with 13 columns: JML, ATC, INN, Zastiteno ime leka, FO, Pakovanje i jaina leka, Naziv proizvođača leka, Država proizvođača leka, Cena leka na veliko za pakovanje, DDD, Cena leka na veliko po DDD, Participacija osiguranog lica, Indeksija, and Napomena. The table contains multiple rows of pharmaceutical data.

Листе А1. Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта

JIL	ATC	INN	Zaštićeno ime lek	FO	Pakovanje i jačina leka	Назив производа лека	Одзак произвођача лека	Цена лека на велико задовољење	DDO	Цена лека на велико по DDG	Републичка одговорност лека	Индикација	Напомена
172524	C03CA02	lisinapihin	Lisinapihin	90 x 50,40	1 x 50,40 mg / 10 x 50,40 mg	Lisinapihin 50,40 mg/ml	Equibia 1, 2, 3	17,74	110,2	17,74	100	Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG. Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG.	Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG.
172525	C03CA02	lisinapihin	Lisinapihin	90 x 25,20	1 x 25,20 mg / 10 x 25,20 mg	Lisinapihin 25,20 mg/ml	Equibia 1, 2, 3	17,74	110,2	17,74	100	Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG. Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG.	Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG.
172526	C03CA02	lisinapihin	Lisinapihin	90 x 12,60	1 x 12,60 mg / 10 x 12,60 mg	Lisinapihin 12,60 mg/ml	Equibia 1, 2, 3	17,74	110,2	17,74	100	Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG. Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG.	Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG.
172527	C03CA02	lisinapihin	Lisinapihin	90 x 5,04	1 x 5,04 mg / 10 x 5,04 mg	Lisinapihin 5,04 mg/ml	Equibia 1, 2, 3	17,74	110,2	17,74	100	Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG. Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG.	Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG.
172528	C03CA02	lisinapihin	Lisinapihin	90 x 2,52	1 x 2,52 mg / 10 x 2,52 mg	Lisinapihin 2,52 mg/ml	Equibia 1, 2, 3	17,74	110,2	17,74	100	Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG. Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG.	Сваки препарат који је издати на основу издавачког рецепта је издати на велико по DDG.

Листе А1 - Лекови који се прописују и издају на основу лекарског рецепта

JHL	ATC	INN	Zastupno ime leka	FO	Раконичје јачина лека	Назва производа лека	Drzava proizvoђач лека	Цена лека на veliko по DDD	Сена лека на veliko по DDD	Регистрација осуђеника лека	индикатора	Напомена
P03B02	C05B02	rosiglitazone	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B03	C05B03	glimepiride	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B04	C05B04	gliclazide	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B05	C05B05	glipizide	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B06	C05B06	glimepiride	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B07	C05B07	glibenclamide	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B08	C05B08	glimepiride	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B09	C05B09	gliclazide	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B10	C05B10	glimepiride	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B11	C05B11	glibenclamide	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B12	C05B12	glimepiride	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B13	C05B13	glibenclamide	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B14	C05B14	glimepiride	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B15	C05B15	glibenclamide	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B16	C05B16	glimepiride	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B17	C05B17	glibenclamide	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B18	C05B18	glimepiride	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B19	C05B19	glibenclamide	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B20	C05B20	glimepiride	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B21	C05B21	glibenclamide	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B22	C05B22	glimepiride	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B23	C05B23	glibenclamide	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B24	C05B24	glimepiride	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B25	C05B25	glibenclamide	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B26	C05B26	glimepiride	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B27	C05B27	glibenclamide	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B28	C05B28	glimepiride	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B29	C05B29	glibenclamide	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06
P03B30	C05B30	glimepiride	GlaxoSmithKline	090.08.06	100 mg / 30 таблета	GlaxoSmithKline, Beograd, Srbija	090.08.06	100 mg / 30 таблета	090.08.06	090.08.06	090.08.06	090.08.06

Листе А1. Лекови који се прописују и издају на основу издавањског рецепта

ЈИЛ	АТЦ	ИНН	Заштитено име лека	FO	Пакovanje i jačina лека	Назив произвођача лека	Остале информације лека	Цена лека на велико задовољавање	ДДО	Цена лека на велико по ДДО	Репарација лека по ДДО	Индикација	Примечанја
142422	C15BD01	fosfofor	fosfofor	041,05,06	1 tablete u pakovanju od 100 tableta	Pharmacia		0,00	0,00	0,00			lekovito sredstvo koje se koristi kao substitucija kalcijuma
142423	C15BD01	fosfofor	fosfofor	041,05,06	1 tablete u pakovanju od 100 tableta	Pharmacia		0,00	0,00	0,00			lekovito sredstvo koje se koristi kao substitucija kalcijuma
142424	C15BD01	fosfofor	fosfofor	041,05,06	1 tablete u pakovanju od 100 tableta	Pharmacia		0,00	0,00	0,00			lekovito sredstvo koje se koristi kao substitucija kalcijuma
142425	C15BD01	fosfofor	fosfofor	041,05,06	1 tablete u pakovanju od 100 tableta	Pharmacia		0,00	0,00	0,00			lekovito sredstvo koje se koristi kao substitucija kalcijuma
142426	C15BD01	fosfofor	fosfofor	041,05,06	1 tablete u pakovanju od 100 tableta	Pharmacia		0,00	0,00	0,00			lekovito sredstvo koje se koristi kao substitucija kalcijuma
142427	C15BD01	fosfofor	fosfofor	041,05,06	1 tablete u pakovanju od 100 tableta	Pharmacia		0,00	0,00	0,00			lekovito sredstvo koje se koristi kao substitucija kalcijuma
142428	C15BD01	fosfofor	fosfofor	041,05,06	1 tablete u pakovanju od 100 tableta	Pharmacia		0,00	0,00	0,00			lekovito sredstvo koje se koristi kao substitucija kalcijuma
142429	C15BD01	fosfofor	fosfofor	041,05,06	1 tablete u pakovanju od 100 tableta	Pharmacia		0,00	0,00	0,00			lekovito sredstvo koje se koristi kao substitucija kalcijuma
142430	C15BD01	fosfofor	fosfofor	041,05,06	1 tablete u pakovanju od 100 tableta	Pharmacia		0,00	0,00	0,00			lekovito sredstvo koje se koristi kao substitucija kalcijuma
142431	C15BD01	fosfofor	fosfofor	041,05,06	1 tablete u pakovanju od 100 tableta	Pharmacia		0,00	0,00	0,00			lekovito sredstvo koje se koristi kao substitucija kalcijuma
142432	C15BD01	fosfofor	fosfofor	041,05,06	1 tablete u pakovanju od 100 tableta	Pharmacia		0,00	0,00	0,00			lekovito sredstvo koje se koristi kao substitucija kalcijuma







Lista A1. Lekovi koji se propisuju i nalazi na obrazac lekarskog recepta

JML	ATC	INN	Zastupno ime lek	FO	Racovne jedinice	Naiz proizvođača leka	Država proizvođača leka	Цена лека на veliko za pakovanje	DDO	Цена лека на veliko po DDO	Participacija ostigunskog lica	Indicekt	Napomena
L12A11	C09DA05	simvastatin	SIMVASTATIN	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000
L12A11	C09DA05	simvastatin	Simvastatin	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000
L12A11	C09DA05	simvastatin	Simvastatin	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000
L12A11	C09DA05	simvastatin	Simvastatin	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000
L12A11	C09DA05	simvastatin	Simvastatin	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000
L12A11	C09DA05	simvastatin	Simvastatin	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000
L12A11	C09DA05	simvastatin	Simvastatin	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000
L12A11	C09DA05	simvastatin	Simvastatin	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000
L12A11	C09DA05	simvastatin	Simvastatin	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000
L12A11	C09DA05	simvastatin	Simvastatin	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000
L12A11	C09DA05	simvastatin	Simvastatin	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000
L12A11	C09DA05	simvastatin	Simvastatin	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000
L12A11	C09DA05	simvastatin	Simvastatin	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000
L12A11	C09DA05	simvastatin	Simvastatin	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000
L12A11	C09DA05	simvastatin	Simvastatin	09.09.2012	1.000.000.000.000	Simvastatin Zdravko	Bosnia and Herzegovina	1.000,00	1.000	1.000,00	0%	1.000.000.000.000	09.09.2012. 1.000.000.000.000





Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JUL	ATC	INN	Zastupno ime leka	FO	Раконичје јасина лека	Назва производа лека	Држава произвођача лека	Цена лека на veliko за pakovanje	DDD	Цена лека на veliko по DDD	Participacija osiguranog lica	Indeks leka	Napomena
L22A02	A02BA02	metoprolol bisulfat	Metoprolol	981 586.06	981 586.06 Metoprolol bisulfat 100mg/100ml 100mg/100ml	Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Србија	981 586.06	1.0	981 586.06	0.00	1.0000	
L22A02	A02BA02	metoprolol bisulfat	Metoprolol	981 586.06	981 586.06 Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Србија	981 586.06	1.0	981 586.06	0.00	1.0000	
L22A02	A02BA02	metoprolol bisulfat	Metoprolol	981 586.06	981 586.06 Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Србија	981 586.06	1.0	981 586.06	0.00	1.0000	
L22A02	A02BA02	metoprolol bisulfat	Metoprolol	981 586.06	981 586.06 Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Србија	981 586.06	1.0	981 586.06	0.00	1.0000	
L22A02	A02BA02	metoprolol bisulfat	Metoprolol	981 586.06	981 586.06 Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Србија	981 586.06	1.0	981 586.06	0.00	1.0000	
L22A02	A02BA02	metoprolol bisulfat	Metoprolol	981 586.06	981 586.06 Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Србија	981 586.06	1.0	981 586.06	0.00	1.0000	
L22A02	A02BA02	metoprolol bisulfat	Metoprolol	981 586.06	981 586.06 Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Србија	981 586.06	1.0	981 586.06	0.00	1.0000	
L22A02	A02BA02	metoprolol bisulfat	Metoprolol	981 586.06	981 586.06 Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Србија	981 586.06	1.0	981 586.06	0.00	1.0000	
L22A02	A02BA02	metoprolol bisulfat	Metoprolol	981 586.06	981 586.06 Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Metoprolol bisulfat 100mg/100ml	Србија	981 586.06	1.0	981 586.06	0.00	1.0000	



Liste A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu izdajackog recepta

JMBG	ATC	INN	Zastiteno ime leka	FO	Pakovanje i jedina leka	Naime proizvođača leka	Oznaka proizvođača leka	Смена лека на велико за ратованје	DDO	Смена лека на велико по DDO	Participacija u istraživanju leka	Indikacija	Paromena
121-010	A02BA	AMOXICILIN	AMOXICILIN	001-00-00	1000mg/120ml 1000mg/120ml	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	1. Antibiotik širokog spektra, penicilinski tip. 2. Lek za lečenje bakterijskih infekcija. 3. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 4. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 5. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije.	
121-010	A02BA	AMOXICILIN	AMOXICILIN	001-00-00	1000mg/120ml 1000mg/120ml	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	1. Antibiotik širokog spektra, penicilinski tip. 2. Lek za lečenje bakterijskih infekcija. 3. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 4. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 5. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije.	
121-010	A02BA	AMOXICILIN	AMOXICILIN	001-00-00	1000mg/120ml 1000mg/120ml	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	1. Antibiotik širokog spektra, penicilinski tip. 2. Lek za lečenje bakterijskih infekcija. 3. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 4. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 5. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije.	
121-010	A02BA	AMOXICILIN	AMOXICILIN	001-00-00	1000mg/120ml 1000mg/120ml	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	1. Antibiotik širokog spektra, penicilinski tip. 2. Lek za lečenje bakterijskih infekcija. 3. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 4. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 5. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije.	
121-010	A02BA	AMOXICILIN	AMOXICILIN	001-00-00	1000mg/120ml 1000mg/120ml	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	1. Antibiotik širokog spektra, penicilinski tip. 2. Lek za lečenje bakterijskih infekcija. 3. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 4. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 5. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije.	
121-010	A02BA	AMOXICILIN	AMOXICILIN	001-00-00	1000mg/120ml 1000mg/120ml	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	1. Antibiotik širokog spektra, penicilinski tip. 2. Lek za lečenje bakterijskih infekcija. 3. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 4. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 5. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije.	
121-010	A02BA	AMOXICILIN	AMOXICILIN	001-00-00	1000mg/120ml 1000mg/120ml	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	1. Antibiotik širokog spektra, penicilinski tip. 2. Lek za lečenje bakterijskih infekcija. 3. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 4. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 5. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije.	
121-010	A02BA	AMOXICILIN	AMOXICILIN	001-00-00	1000mg/120ml 1000mg/120ml	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	1. Antibiotik širokog spektra, penicilinski tip. 2. Lek za lečenje bakterijskih infekcija. 3. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 4. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 5. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije.	
121-010	A02BA	AMOXICILIN	AMOXICILIN	001-00-00	1000mg/120ml 1000mg/120ml	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	1. Antibiotik širokog spektra, penicilinski tip. 2. Lek za lečenje bakterijskih infekcija. 3. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 4. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 5. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije.	
121-010	A02BA	AMOXICILIN	AMOXICILIN	001-00-00	1000mg/120ml 1000mg/120ml	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	1. Antibiotik širokog spektra, penicilinski tip. 2. Lek za lečenje bakterijskih infekcija. 3. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 4. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 5. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije.	
121-010	A02BA	AMOXICILIN	AMOXICILIN	001-00-00	1000mg/120ml 1000mg/120ml	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	001-00-00	1. Antibiotik širokog spektra, penicilinski tip. 2. Lek za lečenje bakterijskih infekcija. 3. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 4. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije. 5. Lek za lečenje infekcija uvođenih u toku operacije.	



Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JML	ATC	INN	Zastupno ime leka	FO	Rakovanje i jaina leka	Naiz proizvođača leka	Država proizvođača leka	Смена лека на ветно за патовање	DDD	Смена лека на великој DDD	Participacija osiguranog lica	Indicija	Napomena
L05BA01	A02BA01	clonidine	Clonidine	901 08040	012 - 300 mg, 013 - 450 mg, 014 - 900 mg, 015 - 1350 mg, 016 - 1800 mg	Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland	Switzerland	0.050 mg	0.050 mg	0.050 mg	40%	1. Hipertenzija, 2. Sindrom napada panike, 3. Sindrom predoziranja beta blokatorima, 4. Sindrom predoziranja kalcijevim antagonistima, 5. Sindrom predoziranja sedativima, 6. Sindrom predoziranja anestetikom, 7. Sindrom predoziranja opioidima, 8. Sindrom predoziranja katekolaminima, 9. Sindrom predoziranja amfetaminima, 10. Sindrom predoziranja kokainom, 11. Sindrom predoziranja nikotinom, 12. Sindrom predoziranja kofeinom, 13. Sindrom predoziranja kalcijevim antagonistima, 14. Sindrom predoziranja beta blokatorima, 15. Sindrom predoziranja sedativima, 16. Sindrom predoziranja anestetikom, 17. Sindrom predoziranja opioidima, 18. Sindrom predoziranja katekolaminima, 19. Sindrom predoziranja amfetaminima, 20. Sindrom predoziranja kokainom, 21. Sindrom predoziranja nikotinom, 22. Sindrom predoziranja kofeinom.	
L05BA02	A02BA02	diltiazem	Diltiazem	901 08040	017 - 300 mg, 018 - 450 mg, 019 - 900 mg, 020 - 1350 mg, 021 - 1800 mg	Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland	Switzerland	0.050 mg	0.050 mg	0.050 mg	40%	1. Hipertenzija, 2. Sindrom napada panike, 3. Sindrom predoziranja beta blokatorima, 4. Sindrom predoziranja kalcijevim antagonistima, 5. Sindrom predoziranja sedativima, 6. Sindrom predoziranja anestetikom, 7. Sindrom predoziranja opioidima, 8. Sindrom predoziranja katekolaminima, 9. Sindrom predoziranja amfetaminima, 10. Sindrom predoziranja kokainom, 11. Sindrom predoziranja nikotinom, 12. Sindrom predoziranja kofeinom, 13. Sindrom predoziranja kalcijevim antagonistima, 14. Sindrom predoziranja beta blokatorima, 15. Sindrom predoziranja sedativima, 16. Sindrom predoziranja anestetikom, 17. Sindrom predoziranja opioidima, 18. Sindrom predoziranja katekolaminima, 19. Sindrom predoziranja amfetaminima, 20. Sindrom predoziranja kokainom, 21. Sindrom predoziranja nikotinom, 22. Sindrom predoziranja kofeinom.	
L05BA03	A02BA03	felodipin	Felodipin	901 08040	022 - 5 mg, 023 - 10 mg, 024 - 20 mg, 025 - 40 mg	Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland	Switzerland	0.050 mg	0.050 mg	0.050 mg	40%	1. Hipertenzija, 2. Sindrom napada panike, 3. Sindrom predoziranja beta blokatorima, 4. Sindrom predoziranja kalcijevim antagonistima, 5. Sindrom predoziranja sedativima, 6. Sindrom predoziranja anestetikom, 7. Sindrom predoziranja opioidima, 8. Sindrom predoziranja katekolaminima, 9. Sindrom predoziranja amfetaminima, 10. Sindrom predoziranja kokainom, 11. Sindrom predoziranja nikotinom, 12. Sindrom predoziranja kofeinom, 13. Sindrom predoziranja kalcijevim antagonistima, 14. Sindrom predoziranja beta blokatorima, 15. Sindrom predoziranja sedativima, 16. Sindrom predoziranja anestetikom, 17. Sindrom predoziranja opioidima, 18. Sindrom predoziranja katekolaminima, 19. Sindrom predoziranja amfetaminima, 20. Sindrom predoziranja kokainom, 21. Sindrom predoziranja nikotinom, 22. Sindrom predoziranja kofeinom.	
L05BA04	A02BA04	lisinapril	Lisinapril	901 08040	026 - 10 mg, 027 - 20 mg, 028 - 40 mg, 029 - 80 mg, 030 - 120 mg	Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland	Switzerland	0.050 mg	0.050 mg	0.050 mg	40%	1. Hipertenzija, 2. Sindrom napada panike, 3. Sindrom predoziranja beta blokatorima, 4. Sindrom predoziranja kalcijevim antagonistima, 5. Sindrom predoziranja sedativima, 6. Sindrom predoziranja anestetikom, 7. Sindrom predoziranja opioidima, 8. Sindrom predoziranja katekolaminima, 9. Sindrom predoziranja amfetaminima, 10. Sindrom predoziranja kokainom, 11. Sindrom predoziranja nikotinom, 12. Sindrom predoziranja kofeinom, 13. Sindrom predoziranja kalcijevim antagonistima, 14. Sindrom predoziranja beta blokatorima, 15. Sindrom predoziranja sedativima, 16. Sindrom predoziranja anestetikom, 17. Sindrom predoziranja opioidima, 18. Sindrom predoziranja katekolaminima, 19. Sindrom predoziranja amfetaminima, 20. Sindrom predoziranja kokainom, 21. Sindrom predoziranja nikotinom, 22. Sindrom predoziranja kofeinom.	
L05BA05	A02BA05	telmisartan	Telmisartan	901 08040	031 - 20 mg, 032 - 40 mg, 033 - 80 mg	Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland	Switzerland	0.050 mg	0.050 mg	0.050 mg	40%	1. Hipertenzija, 2. Sindrom napada panike, 3. Sindrom predoziranja beta blokatorima, 4. Sindrom predoziranja kalcijevim antagonistima, 5. Sindrom predoziranja sedativima, 6. Sindrom predoziranja anestetikom, 7. Sindrom predoziranja opioidima, 8. Sindrom predoziranja katekolaminima, 9. Sindrom predoziranja amfetaminima, 10. Sindrom predoziranja kokainom, 11. Sindrom predoziranja nikotinom, 12. Sindrom predoziranja kofeinom, 13. Sindrom predoziranja kalcijevim antagonistima, 14. Sindrom predoziranja beta blokatorima, 15. Sindrom predoziranja sedativima, 16. Sindrom predoziranja anestetikom, 17. Sindrom predoziranja opioidima, 18. Sindrom predoziranja katekolaminima, 19. Sindrom predoziranja amfetaminima, 20. Sindrom predoziranja kokainom, 21. Sindrom predoziranja nikotinom, 22. Sindrom predoziranja kofeinom.	

Листе А1. Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта

JHL	ATC	INN	Zaštićeno ime lek	FO	Pakovanje i jačina leka	Назив производа лека	Оргинални произвођач лека	Цена лека на велико задовољење	ДДО	Цена лека на велико по ДДО	Participacija u postupku leka	индикатор	Напомена
L02AB06	A02BA02	Salicylat		901.00.00	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
L02AB07	A02BA02	Salicylat		901.00.00	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
L02AB08	A02BA02	Salicylat		901.00.00	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
L02AB09	A02BA02	Salicylat		901.00.00	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
L02AB10	A02BA02	Salicylat		901.00.00	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
L02AB11	A02BA02	Salicylat		901.00.00	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
L02AB12	A02BA02	Salicylat		901.00.00	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
L02AB13	A02BA02	Salicylat		901.00.00	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
L02AB14	A02BA02	Salicylat		901.00.00	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
L02AB15	A02BA02	Salicylat		901.00.00	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00 mg/1000	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		



Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JML	ATC	INN	Zastupno ime lek	FO	Pravovne jedinice	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Смена лека на veliko za pakovanje	DDD	Смена лека на veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indicija	Napomena
P20042	B01AC06	clonazepam	Clonazepam	00138004	100 mg / 20 komada	Zdravko d.o.o.	Србија	100 mg	0,125	100 mg	0 mg	1. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 2. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 3. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada.	
P20043	B01AC06	clonazepam	Clonazepam	00138005	10 mg / 20 komada	Zdravko d.o.o.	Србија	10 mg	0,125	10 mg	0 mg	1. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 2. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 3. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada.	
P20044	B01AC06	clonazepam	Clonazepam	00138006	10 mg / 20 komada	Zdravko d.o.o.	Србија	10 mg	0,125	10 mg	0 mg	1. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 2. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 3. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada.	
P20045	B01AC06	clonazepam	Clonazepam	00138007	10 mg / 20 komada	Zdravko d.o.o.	Србија	10 mg	0,125	10 mg	0 mg	1. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 2. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 3. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada.	
P20046	B01AC06	clonazepam	Clonazepam	00138008	10 mg / 20 komada	Zdravko d.o.o.	Србија	10 mg	0,125	10 mg	0 mg	1. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 2. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 3. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada.	
P20047	B01AC06	clonazepam	Clonazepam	00138009	10 mg / 20 komada	Zdravko d.o.o.	Србија	10 mg	0,125	10 mg	0 mg	1. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 2. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 3. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada.	
P20048	B01AC06	clonazepam	Clonazepam	00138010	10 mg / 20 komada	Zdravko d.o.o.	Србија	10 mg	0,125	10 mg	0 mg	1. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 2. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 3. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada.	
P20049	B01AC06	clonazepam	Clonazepam	00138011	10 mg / 20 komada	Zdravko d.o.o.	Србија	10 mg	0,125	10 mg	0 mg	1. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 2. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 3. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada.	
P20050	B01AC06	clonazepam	Clonazepam	00138012	10 mg / 20 komada	Zdravko d.o.o.	Србија	10 mg	0,125	10 mg	0 mg	1. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 2. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada. 3. Otklon od 25% u odnosu na 100 mg / 20 komada.	



Liste A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu izdajackog recepta

JIL	ATC	INN	Zeljkeno ime leka	FO	Pakovanje i jaina leka	Naziv proizvođača leka	Oznaka proizvođača leka	Смена лека на велико за рачување	DDO	Смена лека на велико по DDO	Participacija pacijenta	Indikacija	Parosmeta
123702	A01FA05	AMOXICILIN	AMOXICILIN	AMOXICILIN 300mg/5ml 100mg/5ml	100mg/5ml, 300mg/5ml	AMOXICILIN	B.1.3	100,00	0,00	0,00	0,00	1. Akutna infekcija gornjih puteva dišnog sistema. 2. Akutna infekcija donjih puteva dišnog sistema. 3. Akutna infekcija uvošnice. 4. Akutna infekcija srednjeg uva. 5. Akutna infekcija stomatitisa. 6. Akutna infekcija tonziloiditisa. 7. Akutna infekcija faringitisa. 8. Akutna infekcija sinusitisa. 9. Akutna infekcija otitisa. 10. Akutna infekcija cervikofaringitisa. 11. Akutna infekcija epiglotitisa. 12. Akutna infekcija peritonsilarnog abscesa. 13. Akutna infekcija laringitisa. 14. Akutna infekcija traheitisa. 15. Akutna infekcija bronhitisa. 16. Akutna infekcija pluća. 17. Akutna infekcija katarakta. 18. Akutna infekcija konjunktivitisa. 19. Akutna infekcija otitisa. 20. Akutna infekcija sinusitisa. 21. Akutna infekcija faringitisa. 22. Akutna infekcija tonziloiditisa. 23. Akutna infekcija epiglotitisa. 24. Akutna infekcija peritonsilarnog abscesa. 25. Akutna infekcija laringitisa. 26. Akutna infekcija traheitisa. 27. Akutna infekcija bronhitisa. 28. Akutna infekcija pluća.	
123703	A01FA06	AMOXICILIN	AMOXICILIN	AMOXICILIN 300mg/5ml 100mg/5ml	100mg/5ml, 300mg/5ml	AMOXICILIN	B.1.3	100,00	0,00	0,00	0,00	1. Akutna infekcija gornjih puteva dišnog sistema. 2. Akutna infekcija donjih puteva dišnog sistema. 3. Akutna infekcija uvošnice. 4. Akutna infekcija srednjeg uva. 5. Akutna infekcija stomatitisa. 6. Akutna infekcija tonziloiditisa. 7. Akutna infekcija faringitisa. 8. Akutna infekcija sinusitisa. 9. Akutna infekcija otitisa. 10. Akutna infekcija cervikofaringitisa. 11. Akutna infekcija epiglotitisa. 12. Akutna infekcija peritonsilarnog abscesa. 13. Akutna infekcija laringitisa. 14. Akutna infekcija traheitisa. 15. Akutna infekcija bronhitisa. 16. Akutna infekcija pluća. 17. Akutna infekcija katarakta. 18. Akutna infekcija konjunktivitisa. 19. Akutna infekcija otitisa. 20. Akutna infekcija sinusitisa. 21. Akutna infekcija faringitisa. 22. Akutna infekcija tonziloiditisa. 23. Akutna infekcija epiglotitisa. 24. Akutna infekcija peritonsilarnog abscesa. 25. Akutna infekcija laringitisa. 26. Akutna infekcija traheitisa. 27. Akutna infekcija bronhitisa. 28. Akutna infekcija pluća.	
123704	A01FA06	AMOXICILIN	AMOXICILIN	AMOXICILIN 300mg/5ml 100mg/5ml	100mg/5ml, 300mg/5ml	AMOXICILIN	B.1.3	100,00	0,00	0,00	0,00	1. Akutna infekcija gornjih puteva dišnog sistema. 2. Akutna infekcija donjih puteva dišnog sistema. 3. Akutna infekcija uvošnice. 4. Akutna infekcija srednjeg uva. 5. Akutna infekcija stomatitisa. 6. Akutna infekcija tonziloiditisa. 7. Akutna infekcija faringitisa. 8. Akutna infekcija sinusitisa. 9. Akutna infekcija otitisa. 10. Akutna infekcija cervikofaringitisa. 11. Akutna infekcija epiglotitisa. 12. Akutna infekcija peritonsilarnog abscesa. 13. Akutna infekcija laringitisa. 14. Akutna infekcija traheitisa. 15. Akutna infekcija bronhitisa. 16. Akutna infekcija pluća. 17. Akutna infekcija katarakta. 18. Akutna infekcija konjunktivitisa. 19. Akutna infekcija otitisa. 20. Akutna infekcija sinusitisa. 21. Akutna infekcija faringitisa. 22. Akutna infekcija tonziloiditisa. 23. Akutna infekcija epiglotitisa. 24. Akutna infekcija peritonsilarnog abscesa. 25. Akutna infekcija laringitisa. 26. Akutna infekcija traheitisa. 27. Akutna infekcija bronhitisa. 28. Akutna infekcija pluća.	
123705	A01FA06	AMOXICILIN	AMOXICILIN	AMOXICILIN 300mg/5ml 100mg/5ml	100mg/5ml, 300mg/5ml	AMOXICILIN	B.1.3	100,00	0,00	0,00	0,00	1. Akutna infekcija gornjih puteva dišnog sistema. 2. Akutna infekcija donjih puteva dišnog sistema. 3. Akutna infekcija uvošnice. 4. Akutna infekcija srednjeg uva. 5. Akutna infekcija stomatitisa. 6. Akutna infekcija tonziloiditisa. 7. Akutna infekcija faringitisa. 8. Akutna infekcija sinusitisa. 9. Akutna infekcija otitisa. 10. Akutna infekcija cervikofaringitisa. 11. Akutna infekcija epiglotitisa. 12. Akutna infekcija peritonsilarnog abscesa. 13. Akutna infekcija laringitisa. 14. Akutna infekcija traheitisa. 15. Akutna infekcija bronhitisa. 16. Akutna infekcija pluća. 17. Akutna infekcija katarakta. 18. Akutna infekcija konjunktivitisa. 19. Akutna infekcija otitisa. 20. Akutna infekcija sinusitisa. 21. Akutna infekcija faringitisa. 22. Akutna infekcija tonziloiditisa. 23. Akutna infekcija epiglotitisa. 24. Akutna infekcija peritonsilarnog abscesa. 25. Akutna infekcija laringitisa. 26. Akutna infekcija traheitisa. 27. Akutna infekcija bronhitisa. 28. Akutna infekcija pluća.	







Листе A1. Лекови који се прописују и издају на основу лекашког рецепта

JUL	ATC	INN	Zastupno ime leka	FO	Rakovanje i jaina leka	Naзи производа лека	Drzava произвођача лека	Cena лека на veliko за pakovanje	DDD	Cena лека на veliko po DDD	Participacija ostvarenoг лека	Indicija	Napomena
A10AD01	A10AD01	metformin	Metformin	Metformin	1,5g/100ml, 300g	Metformin	Srbija	380,00	41,11	402,50	75%	1. Izbacivanje šećera u urin, kao i izboljšanje osjetljivosti na insulin, što može dovesti do smanjenja koncentracije šećera u krvi. 2. Smanjenje koncentracije lipida u krvi. 3. Smanjenje koncentracije homocisteina u krvi. 4. Smanjenje koncentracije triglicerida u krvi. 5. Smanjenje koncentracije krvnog pritiska.	
A10AC06	A10AC06	insulin	Humulin	Humulin	100 IU/ml	Humulin	Srbija	200,00	1,00	200,00	75%	1. Zbog rizika od hipoglikemije, treba biti oprezan pri primeni insulina. 2. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 3. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 4. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 5. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama.	
A10AD02	A10AD02	metformin	Metformin	Metformin	1,5g/100ml, 300g	Metformin	Srbija	380,00	41,11	402,50	75%	1. Izbacivanje šećera u urin, kao i izboljšanje osjetljivosti na insulin, što može dovesti do smanjenja koncentracije šećera u krvi. 2. Smanjenje koncentracije lipida u krvi. 3. Smanjenje koncentracije homocisteina u krvi. 4. Smanjenje koncentracije triglicerida u krvi. 5. Smanjenje koncentracije krvnog pritiska.	
A10AC06	A10AC06	insulin	Humulin	Humulin	100 IU/ml	Humulin	Srbija	200,00	1,00	200,00	75%	1. Zbog rizika od hipoglikemije, treba biti oprezan pri primeni insulina. 2. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 3. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 4. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 5. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama.	
A10AC06	A10AC06	insulin	Humulin	Humulin	100 IU/ml	Humulin	Srbija	200,00	1,00	200,00	75%	1. Zbog rizika od hipoglikemije, treba biti oprezan pri primeni insulina. 2. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 3. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 4. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 5. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama.	
A10AC06	A10AC06	insulin	Humulin	Humulin	100 IU/ml	Humulin	Srbija	200,00	1,00	200,00	75%	1. Zbog rizika od hipoglikemije, treba biti oprezan pri primeni insulina. 2. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 3. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 4. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 5. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama.	
A10AC06	A10AC06	insulin	Humulin	Humulin	100 IU/ml	Humulin	Srbija	200,00	1,00	200,00	75%	1. Zbog rizika od hipoglikemije, treba biti oprezan pri primeni insulina. 2. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 3. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 4. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 5. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama.	
A10AC06	A10AC06	insulin	Humulin	Humulin	100 IU/ml	Humulin	Srbija	200,00	1,00	200,00	75%	1. Zbog rizika od hipoglikemije, treba biti oprezan pri primeni insulina. 2. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 3. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 4. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 5. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama.	
A10AC06	A10AC06	insulin	Humulin	Humulin	100 IU/ml	Humulin	Srbija	200,00	1,00	200,00	75%	1. Zbog rizika od hipoglikemije, treba biti oprezan pri primeni insulina. 2. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 3. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 4. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 5. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama.	
A10AC06	A10AC06	insulin	Humulin	Humulin	100 IU/ml	Humulin	Srbija	200,00	1,00	200,00	75%	1. Zbog rizika od hipoglikemije, treba biti oprezan pri primeni insulina. 2. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 3. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 4. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 5. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama.	
A10AC06	A10AC06	insulin	Humulin	Humulin	100 IU/ml	Humulin	Srbija	200,00	1,00	200,00	75%	1. Zbog rizika od hipoglikemije, treba biti oprezan pri primeni insulina. 2. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 3. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 4. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 5. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama.	
A10AC06	A10AC06	insulin	Humulin	Humulin	100 IU/ml	Humulin	Srbija	200,00	1,00	200,00	75%	1. Zbog rizika od hipoglikemije, treba biti oprezan pri primeni insulina. 2. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 3. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 4. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 5. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama.	

1. Zbog rizika od hipoglikemije, treba biti oprezan pri primeni insulina. 2. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 3. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 4. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama. 5. Insulin treba primeniti na vreme i u odgovarajućim dozama.













Liste A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu izdarskog recepta

JIL	ATC	INN	Zštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Ostala proizvođača leka	Sredstva na veliko za pakovanje	DDD	Sredstva na veliko po DDD	Participacija ostajućeg leka	Indikacija	Napomena
B1A.02.01	M04AA05	levamisole	LEVAMISOL	990.00.000	1.000.000 (1.000.000 mg)	Novartis, Beograd	Novartis, Beograd	500.000	1.000.000	100%	Uz prethodno savetovanje lekara, kod pacijenata sa alergijom na penicilin, kao i kod pacijenata sa alergijom na ampicilin, treba biti oprezni pri primeni ovog leka.		
B1A.02.02	M04AA05	levamisole	LEVAMISOL	1.000.000	1.000.000 (1.000.000 mg)	Novartis, Beograd	Novartis, Beograd	500.000	1.000.000	100%	Uz prethodno savetovanje lekara, kod pacijenata sa alergijom na penicilin, kao i kod pacijenata sa alergijom na ampicilin, treba biti oprezni pri primeni ovog leka.		
B2A.02.01	H02BA01	levamisole	LEVAMISOL	1.000.000	1.000.000 (1.000.000 mg)	Novartis, Beograd	Novartis, Beograd	500.000	1.000.000	100%	Uz prethodno savetovanje lekara, kod pacijenata sa alergijom na penicilin, kao i kod pacijenata sa alergijom na ampicilin, treba biti oprezni pri primeni ovog leka.		
B2A.02.02	H02BA01	levamisole	LEVAMISOL	1.000.000	1.000.000 (1.000.000 mg)	Novartis, Beograd	Novartis, Beograd	500.000	1.000.000	100%	Uz prethodno savetovanje lekara, kod pacijenata sa alergijom na penicilin, kao i kod pacijenata sa alergijom na ampicilin, treba biti oprezni pri primeni ovog leka.		





























Liste A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JUL	ATC	INN	Zastupnik imena	FO	Rakovanje i jaina leta	Naiz proizvedena leta	Drzava proizodilasa	Сена лека на велно за патовање	DDD	Сена лека на велно по DDD	Participacija ostigunatog lica	Indicesta	Napomena
B01AC06	B01AC06	clonazepam	Торифарма	Торифарма	СРБИЈА	СРБИЈА	СРБИЈА	2,5 mg	1,0 mg	1,0 mg	0,0000	2,5 mg	1,0 mg
B01AC07	B01AC07	clonazepam	Торифарма	Торифарма	СРБИЈА	СРБИЈА	СРБИЈА	2,5 mg	1,0 mg	1,0 mg	0,0000	2,5 mg	1,0 mg
B01AC08	B01AC08	clonazepam	Торифарма	Торифарма	СРБИЈА	СРБИЈА	СРБИЈА	2,5 mg	1,0 mg	1,0 mg	0,0000	2,5 mg	1,0 mg











Листа А1. Лекови који се прописују и издају на основу лекашког рецепта

JML	ATC	INN	Zastupno ime lek	FO	Rakovlje i jaina lek	Назва производа лека	Drzava proizvođača	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indicekta	Napomena
P01AD06		omeprazole	OMEPRAZOL	AMBROFARM	AMPRO 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	AMPRO 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	SRB	442,000	1,000	12,570,000	100%		OPREZ: Lek se koristi samo za lečenje ulkusa želuca i dvanaestopalačnika uz pomoć drugih lekova, kao što je H <sub>2</sub> blokator. Ne treba ga koristiti duže od 14 dana bez nadzora lekara.
P01AD07		esomeprazole	ESOMEPRAZOL	AMBROFARM	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	SRB	1,040,000	1,000	24,500,000	100%		OPREZ: Lek se koristi samo za lečenje ulkusa želuca i dvanaestopalačnika uz pomoć drugih lekova, kao što je H <sub>2</sub> blokator. Ne treba ga koristiti duže od 14 dana bez nadzora lekara.
P01AD08		lansoprazole	LANSOPRAZOL	AMBROFARM	LANSOPRAZOL 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg tableti	LANSOPRAZOL 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg tableti	SRB	488,000	1,000	12,200,000	100%		OPREZ: Lek se koristi samo za lečenje ulkusa želuca i dvanaestopalačnika uz pomoć drugih lekova, kao što je H <sub>2</sub> blokator. Ne treba ga koristiti duže od 14 dana bez nadzora lekara.
P01AD09		rabeprazole	RABEPRAZOL	AMBROFARM	RABEPRAZOL 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg tableti	RABEPRAZOL 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg tableti	SRB	400,000	1,000	10,000,000	100%		OPREZ: Lek se koristi samo za lečenje ulkusa želuca i dvanaestopalačnika uz pomoć drugih lekova, kao što je H <sub>2</sub> blokator. Ne treba ga koristiti duže od 14 dana bez nadzora lekara.
P01AD10		dexlansoprazole	DEXLANSOPRAZOL	AMBROFARM	DEXLANSOPRAZOL 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg tableti	DEXLANSOPRAZOL 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg tableti	SRB	520,000	1,000	13,000,000	100%		OPREZ: Lek se koristi samo za lečenje ulkusa želuca i dvanaestopalačnika uz pomoć drugih lekova, kao što je H <sub>2</sub> blokator. Ne treba ga koristiti duže od 14 dana bez nadzora lekara.
P01AD11		levamisole	LEVAMISOL	AMBROFARM	LEVAMISOL 150 mg tableti	LEVAMISOL 150 mg tableti	SRB	300,000	1,000	7,500,000	100%		OPREZ: Lek se koristi samo za lečenje ulkusa želuca i dvanaestopalačnika uz pomoć drugih lekova, kao što je H <sub>2</sub> blokator. Ne treba ga koristiti duže od 14 dana bez nadzora lekara.
P01AD12		esomeprazole	ESOMEPRAZOL	AMBROFARM	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	SRB	1,040,000	1,000	24,500,000	100%		OPREZ: Lek se koristi samo za lečenje ulkusa želuca i dvanaestopalačnika uz pomoć drugih lekova, kao što je H <sub>2</sub> blokator. Ne treba ga koristiti duže od 14 dana bez nadzora lekara.
P01AD13		esomeprazole	ESOMEPRAZOL	AMBROFARM	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	SRB	1,040,000	1,000	24,500,000	100%		OPREZ: Lek se koristi samo za lečenje ulkusa želuca i dvanaestopalačnika uz pomoć drugih lekova, kao što je H <sub>2</sub> blokator. Ne treba ga koristiti duže od 14 dana bez nadzora lekara.
P01AD14		esomeprazole	ESOMEPRAZOL	AMBROFARM	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	SRB	1,040,000	1,000	24,500,000	100%		OPREZ: Lek se koristi samo za lečenje ulkusa želuca i dvanaestopalačnika uz pomoć drugih lekova, kao što je H <sub>2</sub> blokator. Ne treba ga koristiti duže od 14 dana bez nadzora lekara.
P01AD15		esomeprazole	ESOMEPRAZOL	AMBROFARM	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	SRB	1,040,000	1,000	24,500,000	100%		OPREZ: Lek se koristi samo za lečenje ulkusa želuca i dvanaestopalačnika uz pomoć drugih lekova, kao što je H <sub>2</sub> blokator. Ne treba ga koristiti duže od 14 dana bez nadzora lekara.
P01AD16		esomeprazole	ESOMEPRAZOL	AMBROFARM	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	SRB	1,040,000	1,000	24,500,000	100%		OPREZ: Lek se koristi samo za lečenje ulkusa želuca i dvanaestopalačnika uz pomoć drugih lekova, kao što je H <sub>2</sub> blokator. Ne treba ga koristiti duže od 14 dana bez nadzora lekara.
P01AD17		esomeprazole	ESOMEPRAZOL	AMBROFARM	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	SRB	1,040,000	1,000	24,500,000	100%		OPREZ: Lek se koristi samo za lečenje ulkusa želuca i dvanaestopalačnika uz pomoć drugih lekova, kao što je H <sub>2</sub> blokator. Ne treba ga koristiti duže od 14 dana bez nadzora lekara.
P01AD18		esomeprazole	ESOMEPRAZOL	AMBROFARM	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	ESOM 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tableti	SRB	1,040,000	1,000	24,500,000	100%		OPREZ: Lek se koristi samo za lečenje ulkusa želuca i dvanaestopalačnika uz pomoć drugih lekova, kao što je H <sub>2</sub> blokator. Ne treba ga koristiti duže od 14 dana bez nadzora lekara.



Листе А1. Лекови који се прописују и издају на основу лекашког рецепта

Table with columns: JML, ATC, INN, Zastupeno ime leka, FO, Pakovanje i jaina leka, Naziv proizvođača leka, Država proizvođača leka, Cena leka na veliko za pakovanje, DDD, Cena leka na veliko po DDD, Participacija osiguranog lica, Indeksja, and Napomena.





Листа А1. Лекови који се прописују и издају на основу лекашког рецепта

JML	ATC	INN	Zastupno ime lek	FO	Pakovanje i jačina leka	Način proizvodnje leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija ostvarenog leka	Indicija	Napomena
P2242	B1A.04.01	amoxicillin	AMOXICILIN	Biofarm d.o.o. Beograd	Pakovanje: 120 tableta Jačina: 500 mg	Amoxicillinum Biosphera d.o.o. Beograd	Bosna i Hercegovina	108,00	0,90	108,00	25,00	Amoxicillinum, biosphera d.o.o. Beograd	Amoxicillinum, biosphera d.o.o. Beograd
P2243	B1A.04.01	amoxicillin	AMOXICILIN	Biofarm d.o.o. Beograd	Pakovanje: 120 tableta Jačina: 500 mg	Amoxicillinum Biosphera d.o.o. Beograd	Bosna i Hercegovina	108,00	0,90	108,00	25,00	Amoxicillinum, biosphera d.o.o. Beograd	Amoxicillinum, biosphera d.o.o. Beograd
P2244	B1A.04.01	amoxicillin	AMOXICILIN	Biofarm d.o.o. Beograd	Pakovanje: 120 tableta Jačina: 500 mg	Amoxicillinum Biosphera d.o.o. Beograd	Bosna i Hercegovina	108,00	0,90	108,00	25,00	Amoxicillinum, biosphera d.o.o. Beograd	Amoxicillinum, biosphera d.o.o. Beograd
P2245	B1A.04.01	amoxicillin	AMOXICILIN	Biofarm d.o.o. Beograd	Pakovanje: 120 tableta Jačina: 500 mg	Amoxicillinum Biosphera d.o.o. Beograd	Bosna i Hercegovina	108,00	0,90	108,00	25,00	Amoxicillinum, biosphera d.o.o. Beograd	Amoxicillinum, biosphera d.o.o. Beograd
P2246	B1A.04.01	amoxicillin	AMOXICILIN	Biofarm d.o.o. Beograd	Pakovanje: 120 tableta Jačina: 500 mg	Amoxicillinum Biosphera d.o.o. Beograd	Bosna i Hercegovina	108,00	0,90	108,00	25,00	Amoxicillinum, biosphera d.o.o. Beograd	Amoxicillinum, biosphera d.o.o. Beograd





Листа А1. Лекови који се прописују и издају на основу лекашког рецепта

JHL	ATC	INN	Zastupno ime lek	FO	Rakovnje i jaina lek	Naзи производа лека	Drzava proizvoђilа	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija ostigunog lica	Indicija	Napomena
L12.12.12	B01AC06	clonazepam	KLONIPIN	300 mg, 600 mg	300 mg, 600 mg, 1200 mg	300 mg, 600 mg, 1200 mg	Srbija	300 mg, 600 mg, 1200 mg	3 DDD	300 mg, 600 mg, 1200 mg	44,7	1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg. 1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg.	1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg.
L12.12.13	B01AC06	clonazepam	KLONIPIN	300 mg, 600 mg	300 mg, 600 mg, 1200 mg	300 mg, 600 mg, 1200 mg	Srbija	300 mg, 600 mg, 1200 mg	3 DDD	300 mg, 600 mg, 1200 mg	44,7	1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg. 1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg.	1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg.
L12.12.14	B01AC06	clonazepam	KLONIPIN	300 mg, 600 mg	300 mg, 600 mg, 1200 mg	300 mg, 600 mg, 1200 mg	Srbija	300 mg, 600 mg, 1200 mg	3 DDD	300 mg, 600 mg, 1200 mg	44,7	1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg. 1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg.	1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg.
L12.12.15	B01AC06	clonazepam	KLONIPIN	300 mg, 600 mg	300 mg, 600 mg, 1200 mg	300 mg, 600 mg, 1200 mg	Srbija	300 mg, 600 mg, 1200 mg	3 DDD	300 mg, 600 mg, 1200 mg	44,7	1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg. 1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg.	1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg.
L12.12.16	B01AC06	clonazepam	KLONIPIN	300 mg, 600 mg	300 mg, 600 mg, 1200 mg	300 mg, 600 mg, 1200 mg	Srbija	300 mg, 600 mg, 1200 mg	3 DDD	300 mg, 600 mg, 1200 mg	44,7	1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg. 1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg.	1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg.
L12.12.17	B01AC06	clonazepam	KLONIPIN	300 mg, 600 mg	300 mg, 600 mg, 1200 mg	300 mg, 600 mg, 1200 mg	Srbija	300 mg, 600 mg, 1200 mg	3 DDD	300 mg, 600 mg, 1200 mg	44,7	1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg. 1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg.	1. DDD: 1.000 mg, 2. DDD: 1.000 mg, 3. DDD: 1.000 mg.

Листа А1. Лекови који се прописују и издају на основу издавачког рецепта

JUL	ATC	INN	Zdravstveno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Назив произвођача лека	Ординар произвођача лека	Смена лека на велико задовољавање	ДДО	Смена лека на велико по ДОО	Републичка институција за задовољавање	Индикација	Напомена
P27.25.3	B01AC06	ASPIRIN	ASPIRIN 100 mg/100 mg	30 x 100 mg	30 x 100 mg/100 mg	Терајска фабрика лекова	Терајска фабрика лекова	1,000,00	1,000,00	0,00		1. Болести срца и судова 2. Болести крвних судова 3. Болести крви 4. Болести мишића и тетива	
P27.25.3	B01AC06	ASPIRIN	ASPIRIN 100 mg/100 mg	30 x 100 mg	30 x 100 mg/100 mg	Терајска фабрика лекова	Терајска фабрика лекова	1,000,00	1,000,00	0,00		1. Болести срца и судова 2. Болести крвних судова 3. Болести крви 4. Болести мишића и тетива	
P27.25.3	B01AC06	ASPIRIN	ASPIRIN 100 mg/100 mg	30 x 100 mg	30 x 100 mg/100 mg	Терајска фабрика лекова	Терајска фабрика лекова	1,000,00	1,000,00	0,00		1. Болести срца и судова 2. Болести крвних судова 3. Болести крви 4. Болести мишића и тетива	
P27.25.3	B01AC06	ASPIRIN	ASPIRIN 100 mg/100 mg	30 x 100 mg	30 x 100 mg/100 mg	Терајска фабрика лекова	Терајска фабрика лекова	1,000,00	1,000,00	0,00		1. Болести срца и судова 2. Болести крвних судова 3. Болести крви 4. Болести мишића и тетива	
P27.25.3	B01AC06	ASPIRIN	ASPIRIN 100 mg/100 mg	30 x 100 mg	30 x 100 mg/100 mg	Терајска фабрика лекова	Терајска фабрика лекова	1,000,00	1,000,00	0,00		1. Болести срца и судова 2. Болести крвних судова 3. Болести крви 4. Болести мишића и тетива	
P27.25.3	B01AC06	ASPIRIN	ASPIRIN 100 mg/100 mg	30 x 100 mg	30 x 100 mg/100 mg	Терајска фабрика лекова	Терајска фабрика лекова	1,000,00	1,000,00	0,00		1. Болести срца и судова 2. Болести крвних судова 3. Болести крви 4. Болести мишића и тетива	
P27.25.3	B01AC06	ASPIRIN	ASPIRIN 100 mg/100 mg	30 x 100 mg	30 x 100 mg/100 mg	Терајска фабрика лекова	Терајска фабрика лекова	1,000,00	1,000,00	0,00		1. Болести срца и судова 2. Болести крвних судова 3. Болести крви 4. Болести мишића и тетива	
P27.25.3	B01AC06	ASPIRIN	ASPIRIN 100 mg/100 mg	30 x 100 mg	30 x 100 mg/100 mg	Терајска фабрика лекова	Терајска фабрика лекова	1,000,00	1,000,00	0,00		1. Болести срца и судова 2. Болести крвних судова 3. Болести крви 4. Болести мишића и тетива	
P27.25.3	B01AC06	ASPIRIN	ASPIRIN 100 mg/100 mg	30 x 100 mg	30 x 100 mg/100 mg	Терајска фабрика лекова	Терајска фабрика лекова	1,000,00	1,000,00	0,00		1. Болести срца и судова 2. Болести крвних судова 3. Болести крви 4. Болести мишића и тетива	
P27.25.3	B01AC06	ASPIRIN	ASPIRIN 100 mg/100 mg	30 x 100 mg	30 x 100 mg/100 mg	Терајска фабрика лекова	Терајска фабрика лекова	1,000,00	1,000,00	0,00		1. Болести срца и судова 2. Болести крвних судова 3. Болести крви 4. Болести мишића и тетива	











Liste A1: Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu Izbirskog recepta

JMBG	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jedna leka	Naziv proizvođača leka	Ostala proizvođača leka	Смена лека на велико паковање	DDO	Смена лека на велико по DDG	Република изабирног лека	Indicija	Parostava
B01AC06	B01AC06	Azidna so	Azidna so	Azidna so	Azidna so	Azidna so	Azidna so					Druga grupa azidna so	
B01AC07	B01AC07	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon					Druga grupa amilofenon	
B01AC08	B01AC08	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon					Druga grupa amilofenon	
B01AC09	B01AC09	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon					Druga grupa amilofenon	
B01AC10	B01AC10	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon					Druga grupa amilofenon	
B01AC11	B01AC11	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon					Druga grupa amilofenon	
B01AC12	B01AC12	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon					Druga grupa amilofenon	
B01AC13	B01AC13	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon					Druga grupa amilofenon	
B01AC14	B01AC14	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon					Druga grupa amilofenon	
B01AC15	B01AC15	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon					Druga grupa amilofenon	
B01AC16	B01AC16	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon					Druga grupa amilofenon	
B01AC17	B01AC17	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon					Druga grupa amilofenon	
B01AC18	B01AC18	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon					Druga grupa amilofenon	
B01AC19	B01AC19	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon					Druga grupa amilofenon	
B01AC20	B01AC20	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon	Amilofenon					Druga grupa amilofenon	



Lista A1. Lekovi koji se propisuju i nalazi na obrascu lekarskog recepta

JUL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jaina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravateljica	indeksa	Napomena
B01AB01	B01AB01	aspirin	Aspirin	30 x 500 mg	1 x 1000 mg	Novartis	Švajcarska	22,28	22,28	22,28	100%	Aspirin, 1000 mg, tablete	Aspirin, 1000 mg, tablete, 1000 mg, 1000 mg
B01AC06	B01AC06	acetaminofen	Acetaminofen	30 x 500 mg	1 x 1000 mg	Novartis	Švajcarska	22,28	22,28	22,28	100%	Acetaminofen, 1000 mg, tablete	Acetaminofen, 1000 mg, tablete, 1000 mg, 1000 mg
B01AD08	B01AD08	diclofenak	Diclofenak	30 x 75 mg	1 x 225 mg	Novartis	Švajcarska	22,28	22,28	22,28	100%	Diclofenak, 75 mg, tablete	Diclofenak, 75 mg, tablete, 75 mg, 75 mg
B01AC06	B01AC06	acetaminofen	Acetaminofen	30 x 500 mg	1 x 1000 mg	Novartis	Švajcarska	22,28	22,28	22,28	100%	Acetaminofen, 1000 mg, tablete	Acetaminofen, 1000 mg, tablete, 1000 mg, 1000 mg
B01AD08	B01AD08	diclofenak	Diclofenak	30 x 75 mg	1 x 225 mg	Novartis	Švajcarska	22,28	22,28	22,28	100%	Diclofenak, 75 mg, tablete	Diclofenak, 75 mg, tablete, 75 mg, 75 mg
B01AC06	B01AC06	acetaminofen	Acetaminofen	30 x 500 mg	1 x 1000 mg	Novartis	Švajcarska	22,28	22,28	22,28	100%	Acetaminofen, 1000 mg, tablete	Acetaminofen, 1000 mg, tablete, 1000 mg, 1000 mg
B01AD08	B01AD08	diclofenak	Diclofenak	30 x 75 mg	1 x 225 mg	Novartis	Švajcarska	22,28	22,28	22,28	100%	Diclofenak, 75 mg, tablete	Diclofenak, 75 mg, tablete, 75 mg, 75 mg
B01AC06	B01AC06	acetaminofen	Acetaminofen	30 x 500 mg	1 x 1000 mg	Novartis	Švajcarska	22,28	22,28	22,28	100%	Acetaminofen, 1000 mg, tablete	Acetaminofen, 1000 mg, tablete, 1000 mg, 1000 mg
B01AD08	B01AD08	diclofenak	Diclofenak	30 x 75 mg	1 x 225 mg	Novartis	Švajcarska	22,28	22,28	22,28	100%	Diclofenak, 75 mg, tablete	Diclofenak, 75 mg, tablete, 75 mg, 75 mg



Liste A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu Izdajackog recepta

JMBG	ATC	INN	Zastupitelno ime leka	FO	Pakovanje i jedina leka	Naziv proizvođača leka	Oznaka proizvođača leka	Sredstva na veličinu za pakovanje	DDO	Sredstva na veličinu po DDO	Participacija istraživačkog leka	Indicija	Napomena
P-14338	P01BA03	oxycodone	P-14338	P-14338/01/1000	1000 mg, tablete, 1000 mg	Novartis (Novartis Pharma AG)	03715	1000 mg	1000 mg	1000 mg	6,75%	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja
P-14338	P01BA03	oxycodone	P-14338	P-14338/01/1000	1000 mg, tablete, 1000 mg	Novartis (Novartis Pharma AG)	03715	1000 mg	1000 mg	1000 mg	6,75%	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja
P-14338	P01BA03	oxycodone	P-14338	P-14338/01/1000	1000 mg, tablete, 1000 mg	Novartis (Novartis Pharma AG)	03715	1000 mg	1000 mg	1000 mg	6,75%	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja
P-14338	P01BA03	oxycodone	P-14338	P-14338/01/1000	1000 mg, tablete, 1000 mg	Novartis (Novartis Pharma AG)	03715	1000 mg	1000 mg	1000 mg	6,75%	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja
P-14338	P01BA03	oxycodone	P-14338	P-14338/01/1000	1000 mg, tablete, 1000 mg	Novartis (Novartis Pharma AG)	03715	1000 mg	1000 mg	1000 mg	6,75%	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja
P-14338	P01BA03	oxycodone	P-14338	P-14338/01/1000	1000 mg, tablete, 1000 mg	Novartis (Novartis Pharma AG)	03715	1000 mg	1000 mg	1000 mg	6,75%	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja
P-14338	P01BA03	oxycodone	P-14338	P-14338/01/1000	1000 mg, tablete, 1000 mg	Novartis (Novartis Pharma AG)	03715	1000 mg	1000 mg	1000 mg	6,75%	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja
P-14338	P01BA03	oxycodone	P-14338	P-14338/01/1000	1000 mg, tablete, 1000 mg	Novartis (Novartis Pharma AG)	03715	1000 mg	1000 mg	1000 mg	6,75%	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja
P-14338	P01BA03	oxycodone	P-14338	P-14338/01/1000	1000 mg, tablete, 1000 mg	Novartis (Novartis Pharma AG)	03715	1000 mg	1000 mg	1000 mg	6,75%	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja
P-14338	P01BA03	oxycodone	P-14338	P-14338/01/1000	1000 mg, tablete, 1000 mg	Novartis (Novartis Pharma AG)	03715	1000 mg	1000 mg	1000 mg	6,75%	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja
P-14338	P01BA03	oxycodone	P-14338	P-14338/01/1000	1000 mg, tablete, 1000 mg	Novartis (Novartis Pharma AG)	03715	1000 mg	1000 mg	1000 mg	6,75%	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja	obimno istraživački lek, u okviru zdravstvenog osiguranja

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrazac lekarskog recepta

JML	ATC	INN	Zastupno ime leka	FO	Rakovanje i jastva leka	Naiz proizvedena leka	Drzava proizvođača leka	Смена лека на велно за ратковање	DDD	Смена лека на велно по DDD	Ратипација остигнутог лека	Indicekta	Марковања
B01AC06	B01AC06	clonazepam	Clonazepam, 0,5 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,5 mg, tablete	Србија	0,5 mg	0,5 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC07	B01AC07	clonazepam	Clonazepam, 0,25 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,25 mg, tablete	Србија	0,25 mg	0,25 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC08	B01AC08	clonazepam	Clonazepam, 0,125 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,125 mg, tablete	Србија	0,125 mg	0,125 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC09	B01AC09	clonazepam	Clonazepam, 0,0625 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,0625 mg, tablete	Србија	0,0625 mg	0,0625 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC10	B01AC10	clonazepam	Clonazepam, 0,03125 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,03125 mg, tablete	Србија	0,03125 mg	0,03125 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC11	B01AC11	clonazepam	Clonazepam, 0,015625 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,015625 mg, tablete	Србија	0,015625 mg	0,015625 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC12	B01AC12	clonazepam	Clonazepam, 0,0078125 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,0078125 mg, tablete	Србија	0,0078125 mg	0,0078125 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC13	B01AC13	clonazepam	Clonazepam, 0,00390625 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,00390625 mg, tablete	Србија	0,00390625 mg	0,00390625 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC14	B01AC14	clonazepam	Clonazepam, 0,001953125 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,001953125 mg, tablete	Србија	0,001953125 mg	0,001953125 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC15	B01AC15	clonazepam	Clonazepam, 0,0009765625 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,0009765625 mg, tablete	Србија	0,0009765625 mg	0,0009765625 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC16	B01AC16	clonazepam	Clonazepam, 0,00048828125 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,00048828125 mg, tablete	Србија	0,00048828125 mg	0,00048828125 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC17	B01AC17	clonazepam	Clonazepam, 0,000244140625 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,000244140625 mg, tablete	Србија	0,000244140625 mg	0,000244140625 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC18	B01AC18	clonazepam	Clonazepam, 0,0001220703125 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,0001220703125 mg, tablete	Србија	0,0001220703125 mg	0,0001220703125 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC19	B01AC19	clonazepam	Clonazepam, 0,00006103515625 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,00006103515625 mg, tablete	Србија	0,00006103515625 mg	0,00006103515625 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC20	B01AC20	clonazepam	Clonazepam, 0,000030517578125 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,000030517578125 mg, tablete	Србија	0,000030517578125 mg	0,000030517578125 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.
B01AC21	B01AC21	clonazepam	Clonazepam, 0,0000152587890625 mg, tablete	Таблета лека	Болести срца, епилепсија	Clonazepam, 0,0000152587890625 mg, tablete	Србија	0,0000152587890625 mg	0,0000152587890625 mg	100%	100%	100%	Лекарство које се користи у лечењу епилепсије и анксиозних поремећаја.







Liste A1. Lekovi koji se propisuju i ispuju na obrascu Izdarskog recepta

JML	ATC	INN	Zelazeno ime leka	FO	Pakovanje i jedna leka	Ime proizvođača leka	Oznaka proizvođača leka	Sredstva na veličinu za pakovanje	DDO	Sredstva na veličinu po DDO	Participacija osiguranika	Indikacija	Parozna
000001	B01AC06	clonazepam	clonazepam	000001	0,5 mg, 100 komada	Pharm. Ind. Sava, Beograd	000001	0,5 mg, 100 komada	0,0000	0,0000	0,0000	epileptički napadaji, migrena, anksioznost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost	000001
000002	B01AC06	clonazepam	clonazepam	000002	0,5 mg, 100 komada	Pharm. Ind. Sava, Beograd	000002	0,5 mg, 100 komada	0,0000	0,0000	0,0000	epileptički napadaji, migrena, anksioznost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost	000002
000003	B01AC06	clonazepam	clonazepam	000003	0,5 mg, 100 komada	Pharm. Ind. Sava, Beograd	000003	0,5 mg, 100 komada	0,0000	0,0000	0,0000	epileptički napadaji, migrena, anksioznost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost	000003
000004	B01AC06	clonazepam	clonazepam	000004	0,5 mg, 100 komada	Pharm. Ind. Sava, Beograd	000004	0,5 mg, 100 komada	0,0000	0,0000	0,0000	epileptički napadaji, migrena, anksioznost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost	000004
000005	B01AC06	clonazepam	clonazepam	000005	0,5 mg, 100 komada	Pharm. Ind. Sava, Beograd	000005	0,5 mg, 100 komada	0,0000	0,0000	0,0000	epileptički napadaji, migrena, anksioznost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost	000005
000006	B01AC06	clonazepam	clonazepam	000006	0,5 mg, 100 komada	Pharm. Ind. Sava, Beograd	000006	0,5 mg, 100 komada	0,0000	0,0000	0,0000	epileptički napadaji, migrena, anksioznost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost	000006
000007	B01AC06	clonazepam	clonazepam	000007	0,5 mg, 100 komada	Pharm. Ind. Sava, Beograd	000007	0,5 mg, 100 komada	0,0000	0,0000	0,0000	epileptički napadaji, migrena, anksioznost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost	000007
000008	B01AC06	clonazepam	clonazepam	000008	0,5 mg, 100 komada	Pharm. Ind. Sava, Beograd	000008	0,5 mg, 100 komada	0,0000	0,0000	0,0000	epileptički napadaji, migrena, anksioznost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost	000008
000009	B01AC06	clonazepam	clonazepam	000009	0,5 mg, 100 komada	Pharm. Ind. Sava, Beograd	000009	0,5 mg, 100 komada	0,0000	0,0000	0,0000	epileptički napadaji, migrena, anksioznost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost	000009
000010	B01AC06	clonazepam	clonazepam	000010	0,5 mg, 100 komada	Pharm. Ind. Sava, Beograd	000010	0,5 mg, 100 komada	0,0000	0,0000	0,0000	epileptički napadaji, migrena, anksioznost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost, opijumski zavrsnost	000010









Листа A1. Лекови који се прописују и издају на образцу лекарашког рецепта

JUL	ATC	INN	Zaštitno ime leka	FO	Ракорне / јачина лека	Назив произвођача лека	Држава произвођача лека	Цена лека на вешто за паковање	DDD	Цена лека на велико по DDD	Participacija osiguranog lica	Indicija	Напомена
L11AA05	B01AC06	Cloxacillin	Clavoxil	300, 450, 600, 900, 1200 mg	1,000 mg 12x12h	Зенито Фарма ДООО	Србија	1,000	12,000	800	80%	Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем.	
L11AA05	B01AC06	Cloxacillin	Clavoxil	300, 450, 600, 900, 1200 mg	1,000 mg 12x12h	Зенито Фарма ДООО	Србија	1,000	12,000	800	80%	Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем.	
L11AA05	B01AC06	Cloxacillin	Clavoxil	300, 450, 600, 900, 1200 mg	1,000 mg 12x12h	Зенито Фарма ДООО	Србија	1,000	12,000	800	80%	Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем.	
L11AA05	B01AC06	Cloxacillin	Clavoxil	300, 450, 600, 900, 1200 mg	1,000 mg 12x12h	Зенито Фарма ДООО	Србија	1,000	12,000	800	80%	Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем.	
L11AA05	B01AC06	Cloxacillin	Clavoxil	300, 450, 600, 900, 1200 mg	1,000 mg 12x12h	Зенито Фарма ДООО	Србија	1,000	12,000	800	80%	Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем. Инфекције које се третирају клемаксилем.	



Lista A1. Lekovi koji se propisuju i nalazi na obrascu lekarskog recepta

JNL	ATC	INN	Zastupnik ime i na	FO	Rakovanje i jaina iats	Naaz proizvodaa iats	Drzava proizodnjs iats	Cena iats na veliko za pakovanje	DDO	Cena iats na veliko po DDO	Participacija osiguranog lica	Indicija	Napomena
P01A01	B01AD01	Ibuprofen			30 tableta po pakovanju	Ibuprofen	HRVATSKA	0,1100	11,00	0,1100	100%	Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme. Dugotrajna upotreba može izazvati nefropatiju, hipertenziju, i krvarenje iz želudca. Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme.	
P01A02	B01AD02	Aspirin			30 tableta po pakovanju	Aspirin	HRVATSKA	0,1100	11,00	0,1100	100%	Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme. Dugotrajna upotreba može izazvati nefropatiju, hipertenziju, i krvarenje iz želudca. Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme.	
P01A03	B01AD03	Paracetamol			30 tableta po pakovanju	Paracetamol	HRVATSKA	0,1100	11,00	0,1100	100%	Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme. Dugotrajna upotreba može izazvati nefropatiju, hipertenziju, i krvarenje iz želudca. Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme.	
P01A04	B01AD04	Acetilsalicilna kiselina			30 tableta po pakovanju	Acetilsalicilna kiselina	HRVATSKA	0,1100	11,00	0,1100	100%	Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme. Dugotrajna upotreba može izazvati nefropatiju, hipertenziju, i krvarenje iz želudca. Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme.	
P01A05	B01AD05	Acetilsalicilna kiselina i ibuprofen			30 tableta po pakovanju	Acetilsalicilna kiselina i ibuprofen	HRVATSKA	0,1100	11,00	0,1100	100%	Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme. Dugotrajna upotreba može izazvati nefropatiju, hipertenziju, i krvarenje iz želudca. Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme.	
P01A06	B01AD06	Acetilsalicilna kiselina i paracetamol			30 tableta po pakovanju	Acetilsalicilna kiselina i paracetamol	HRVATSKA	0,1100	11,00	0,1100	100%	Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme. Dugotrajna upotreba može izazvati nefropatiju, hipertenziju, i krvarenje iz želudca. Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme.	
P01A07	B01AD07	Acetilsalicilna kiselina i paracetamol i ibuprofen			30 tableta po pakovanju	Acetilsalicilna kiselina i paracetamol i ibuprofen	HRVATSKA	0,1100	11,00	0,1100	100%	Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme. Dugotrajna upotreba može izazvati nefropatiju, hipertenziju, i krvarenje iz želudca. Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme.	
P01A08	B01AD08	Acetilsalicilna kiselina i paracetamol i ibuprofen i acetilsalicilna kiselina			30 tableta po pakovanju	Acetilsalicilna kiselina i paracetamol i ibuprofen i acetilsalicilna kiselina	HRVATSKA	0,1100	11,00	0,1100	100%	Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme. Dugotrajna upotreba može izazvati nefropatiju, hipertenziju, i krvarenje iz želudca. Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme.	
P01A09	B01AD09	Acetilsalicilna kiselina i paracetamol i ibuprofen i acetilsalicilna kiselina i paracetamol			30 tableta po pakovanju	Acetilsalicilna kiselina i paracetamol i ibuprofen i acetilsalicilna kiselina i paracetamol	HRVATSKA	0,1100	11,00	0,1100	100%	Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme. Dugotrajna upotreba može izazvati nefropatiju, hipertenziju, i krvarenje iz želudca. Upotreba treba biti ograničena na najduže vreme.	





Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambuliranja, od osnovnog i dobrog lekova a zavisno od indikacije

JBL	ATC	INN	Zadovoljena lek	FO	Pakovanje i jzbitna lek	Među proizvođačima leka	Ostava proizvođača leka	Cena lekovi vredno za pakovanje	DDD	Cena leka od vredno po DDD	Osposobljena lica	Indikacija	Prostorna
202022	D11BA04	Calcitriol	200 mcg, 100 mcg	100 mcg, 200 mcg	100 mcg, 200 mcg			3,12	1,99	10,00			
202024	D11BA04	Calcitriol	100 mcg	100 mcg	100 mcg			3,12	1,99	10,00			
202025	D11BA04	Calcitriol	200 mcg	200 mcg	200 mcg			3,12	1,99	10,00			
202026	D11BA04	Calcitriol	100 mcg	100 mcg	100 mcg			3,12	1,99	10,00			
202027	D11BA04	Calcitriol	200 mcg	200 mcg	200 mcg			3,12	1,99	10,00			
202028	D11BA04	Calcitriol	100 mcg	100 mcg	100 mcg			3,12	1,99	10,00			
202029	D11BA04	Calcitriol	200 mcg	200 mcg	200 mcg			3,12	1,99	10,00			
202030	D11BA04	Calcitriol	100 mcg	100 mcg	100 mcg			3,12	1,99	10,00			
202031	D11BA04	Calcitriol	200 mcg	200 mcg	200 mcg			3,12	1,99	10,00			
202032	D11BA04	Calcitriol	100 mcg	100 mcg	100 mcg			3,12	1,99	10,00			
202033	D11BA04	Calcitriol	200 mcg	200 mcg	200 mcg			3,12	1,99	10,00			
202034	D11BA04	Calcitriol	100 mcg	100 mcg	100 mcg			3,12	1,99	10,00			
202035	D11BA04	Calcitriol	200 mcg	200 mcg	200 mcg			3,12	1,99	10,00			
202036	D11BA04	Calcitriol	100 mcg	100 mcg	100 mcg			3,12	1,99	10,00			
202037	D11BA04	Calcitriol	200 mcg	200 mcg	200 mcg			3,12	1,99	10,00			
202038	D11BA04	Calcitriol	100 mcg	100 mcg	100 mcg			3,12	1,99	10,00			
202039	D11BA04	Calcitriol	200 mcg	200 mcg	200 mcg			3,12	1,99	10,00			
202040	D11BA04	Calcitriol	100 mcg	100 mcg	100 mcg			3,12	1,99	10,00			
202041	D11BA04	Calcitriol	200 mcg	200 mcg	200 mcg			3,12	1,99	10,00			
202042	D11BA04	Calcitriol	100 mcg	100 mcg	100 mcg			3,12	1,99	10,00			
202043	D11BA04	Calcitriol	200 mcg	200 mcg	200 mcg			3,12	1,99	10,00			
202044	D11BA04	Calcitriol	100 mcg	100 mcg	100 mcg			3,12	1,99	10,00			
202045	D11BA04	Calcitriol	200 mcg	200 mcg	200 mcg			3,12	1,99	10,00			
202046	D11BA04	Calcitriol	100 mcg	100 mcg	100 mcg			3,12	1,99	10,00			
202047	D11BA04	Calcitriol	200 mcg	200 mcg	200 mcg			3,12	1,99	10,00			
202048	D11BA04	Calcitriol	100 mcg	100 mcg	100 mcg			3,12	1,99	10,00			
202049	D11BA04	Calcitriol	200 mcg	200 mcg	200 mcg			3,12	1,99	10,00			
202050	D11BA04	Calcitriol	100 mcg	100 mcg	100 mcg			3,12	1,99	10,00			

















Устава, Закон о кој се примењује и у случајембулантног одбора болничког лекара и здравствених радника

JBL	ATC	INN	Zabolevanje	FO	Pakovanje i jedna lista	Međunarodni naziv lekova	Ordnja	Cena lista za lekove za pakovanje	DDD	Cena lista za lekove po DDD	Opisno-količina lista	Indikacija	Naziv lekara
02001	B01AC06	aspirin	02001.01.01	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02002	B01AC06	aspirin	02001.01.02	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02003	B01AC06	aspirin	02001.01.03	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02004	B01AC06	aspirin	02001.01.04	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02005	B01AC06	aspirin	02001.01.05	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02006	B01AC06	aspirin	02001.01.06	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02007	B01AC06	aspirin	02001.01.07	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02008	B01AC06	aspirin	02001.01.08	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02009	B01AC06	aspirin	02001.01.09	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02010	B01AC06	aspirin	02001.01.10	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02011	B01AC06	aspirin	02001.01.11	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02012	B01AC06	aspirin	02001.01.12	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02013	B01AC06	aspirin	02001.01.13	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02014	B01AC06	aspirin	02001.01.14	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02015	B01AC06	aspirin	02001.01.15	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02016	B01AC06	aspirin	02001.01.16	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02017	B01AC06	aspirin	02001.01.17	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02018	B01AC06	aspirin	02001.01.18	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02019	B01AC06	aspirin	02001.01.19	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02020	B01AC06	aspirin	02001.01.20	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02021	B01AC06	aspirin	02001.01.21	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02022	B01AC06	aspirin	02001.01.22	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02023	B01AC06	aspirin	02001.01.23	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02024	B01AC06	aspirin	02001.01.24	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02025	B01AC06	aspirin	02001.01.25	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02026	B01AC06	aspirin	02001.01.26	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02027	B01AC06	aspirin	02001.01.27	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02028	B01AC06	aspirin	02001.01.28	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02029	B01AC06	aspirin	02001.01.29	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02030	B01AC06	aspirin	02001.01.30	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		
02031	B01AC06	aspirin	02001.01.31	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	100 mg tablete	4,400,00	200	880,00	100 mg tablete		









Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulancnog, odnosno hitnog lekarskog i zivotinjskog uzastavne

JBL	ATC	INN	Zabljena imena	FO	Pakovanja i jedinice	Međunarodni naziv	Ordnja	Centi lek za pakovanje	DDD	Centi lek za jedno po DDD	Indikacija	Uputstva
13134	B32BA02	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13135	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13136	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13137	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13138	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13139	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13140	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13141	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13142	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13143	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13144	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13145	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13146	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13147	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13148	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13149	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13150	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13151	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13152	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13153	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13154	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13155	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13156	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13157	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13158	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13159	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				
13160	B32BA03	amoxicillinum	Amoxicillinum	020224155000	100 x 250mg (100 x 250mg)	Amoxicillinum	100mg	1.250,00				

















Улица, локал који се прикључује и локал амбулантног одељена у здравственим установима

ЈКЛ	АТЦ	ИНН	Забележавање	ФО	Рачунице / Јаблака	Имени рачуница / Јаблака	Одшта / Рачунице / Јаблака	Одељена / Јаблака / Рачунице	ДД	Одељена / Јаблака / Рачунице	Одељена / Јаблака / Рачунице	Одељена / Јаблака / Рачунице	Индикатор	Имена
30720	B0703	30720	30720	30720	30720	30720	30720	30720						
30730	B0703	30730	30730	30730	30730	30730	30730	30730						
30740	B0703	30740	30740	30740	30740	30740	30740	30740						
30750	B0703	30750	30750	30750	30750	30750	30750	30750						
30760	B0703	30760	30760	30760	30760	30760	30760	30760						
30770	B0703	30770	30770	30770	30770	30770	30770	30770						
30780	B0703	30780	30780	30780	30780	30780	30780	30780						
30790	B0703	30790	30790	30790	30790	30790	30790	30790						
30800	B0703	30800	30800	30800	30800	30800	30800	30800						
30810	B0703	30810	30810	30810	30810	30810	30810	30810						
30820	B0703	30820	30820	30820	30820	30820	30820	30820						
30830	B0703	30830	30830	30830	30830	30830	30830	30830						
30840	B0703	30840	30840	30840	30840	30840	30840	30840						
30850	B0703	30850	30850	30850	30850	30850	30850	30850						
30860	B0703	30860	30860	30860	30860	30860	30860	30860						
30870	B0703	30870	30870	30870	30870	30870	30870	30870						
30880	B0703	30880	30880	30880	30880	30880	30880	30880						
30890	B0703	30890	30890	30890	30890	30890	30890	30890						
30900	B0703	30900	30900	30900	30900	30900	30900	30900						
30910	B0703	30910	30910	30910	30910	30910	30910	30910						
30920	B0703	30920	30920	30920	30920	30920	30920	30920						
30930	B0703	30930	30930	30930	30930	30930	30930	30930						
30940	B0703	30940	30940	30940	30940	30940	30940	30940						
30950	B0703	30950	30950	30950	30950	30950	30950	30950						
30960	B0703	30960	30960	30960	30960	30960	30960	30960						
30970	B0703	30970	30970	30970	30970	30970	30970	30970						
30980	B0703	30980	30980	30980	30980	30980	30980	30980						
30990	B0703	30990	30990	30990	30990	30990	30990	30990						
31000	B0703	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000						











Liste B, članovi koji se primjenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

Table with columns: JMBG, ATC, INN, Zastupna imena, FO, Pakovanje i jedinica, Kategorizacija lekova, Ocena, Ocena lekova u skladu sa pravilima, DDO, Ocena lekova u skladu sa DDO, Indikacija, Napomena







Lista B. Lijekovi se primjenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JBL	ATC	INN	Zadovoljena imena	FO	Pakovanje i jedinica mera	Ime proizvođača i adresa	Ordnja po proizvođaču (let)	Čeni lista za vredno za pakovanje	DDD	Čeni lista za vredno po DDD	Šifra proizvođača	Indeksija	Normama
2105	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2106	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2107	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2108	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2109	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2110	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2111	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2112	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2113	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2114	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2115	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2116	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2117	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2118	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2119	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			
2120	01L1	ambucorin	AMBUCORIN	10000000000000000000	10000000000000000000	W. L. Pharm. d.o.o. Beograd	1000	1000	1000	1000			

















Устав, Закон којим се привремено уклања одговарајући одбори болничког лечења и здравствени установи

JBL	ATC	INN	Зачињено лијево	FO	Ракламне јабучице	Извоз промишленог лијева	Број на државног произвођача лијева	Свој лијево извозна правина	DDO	Свој лијево извозна DDO	Република извозно лијево	Индикатор	Напомена
08011	B01AC06	clonazepam	080111101	080111101	080111101	080111101	080111101	080111101					
08011	B01AC06	clonazepam	080111102	080111102	080111102	080111102	080111102	080111102					
08011	B01AC06	clonazepam	080111103	080111103	080111103	080111103	080111103	080111103					
08011	B01AC06	clonazepam	080111104	080111104	080111104	080111104	080111104	080111104					
08011	B01AC06	clonazepam	080111105	080111105	080111105	080111105	080111105	080111105					
08011	B01AC06	clonazepam	080111106	080111106	080111106	080111106	080111106	080111106					
08011	B01AC06	clonazepam	080111107	080111107	080111107	080111107	080111107	080111107					
08011	B01AC06	clonazepam	080111108	080111108	080111108	080111108	080111108	080111108					
08011	B01AC06	clonazepam	080111109	080111109	080111109	080111109	080111109	080111109					
08011	B01AC06	clonazepam	080111110	080111110	080111110	080111110	080111110	080111110					
08011	B01AC06	clonazepam	080111111	080111111	080111111	080111111	080111111	080111111					
08011	B01AC06	clonazepam	080111112	080111112	080111112	080111112	080111112	080111112					
08011	B01AC06	clonazepam	080111113	080111113	080111113	080111113	080111113	080111113					
08011	B01AC06	clonazepam	080111114	080111114	080111114	080111114	080111114	080111114					
08011	B01AC06	clonazepam	080111115	080111115	080111115	080111115	080111115	080111115					
08011	B01AC06	clonazepam	080111116	080111116	080111116	080111116	080111116	080111116					
08011	B01AC06	clonazepam	080111117	080111117	080111117	080111117	080111117	080111117					
08011	B01AC06	clonazepam	080111118	080111118	080111118	080111118	080111118	080111118					
08011	B01AC06	clonazepam	080111119	080111119	080111119	080111119	080111119	080111119					
08011	B01AC06	clonazepam	080111120	080111120	080111120	080111120	080111120	080111120					
08011	B01AC06	clonazepam	080111121	080111121	080111121	080111121	080111121	080111121					
08011	B01AC06	clonazepam	080111122	080111122	080111122	080111122	080111122	080111122					
08011	B01AC06	clonazepam	080111123	080111123	080111123	080111123	080111123	080111123					
08011	B01AC06	clonazepam	080111124	080111124	080111124	080111124	080111124	080111124					
08011	B01AC06	clonazepam	080111125	080111125	080111125	080111125	080111125	080111125					

Lista B. I. lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKP	ATC	INN	Zaštitni lekovi	FO	Pažnja! Izbava lekova	Međunarodni naziv lekova	Ordnja proizvoda (gd)	Čeni lekovi u vrednosti proizvoda	DDD	Čeni lekovi u vrednosti po DDD	Antropozna lica	Inicijali	Opisna
020301	B01AC06	amoxicillinum	Amoxicillinum	02030101	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020302	B01AC07	amoxicillinum	Amoxicillinum	02030201	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020303	B01AC08	amoxicillinum	Amoxicillinum	02030301	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020304	B01AC09	amoxicillinum	Amoxicillinum	02030401	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020305	B01AC10	amoxicillinum	Amoxicillinum	02030501	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020306	B01AC11	amoxicillinum	Amoxicillinum	02030601	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020307	B01AC12	amoxicillinum	Amoxicillinum	02030701	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020308	B01AC13	amoxicillinum	Amoxicillinum	02030801	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020309	B01AC14	amoxicillinum	Amoxicillinum	02030901	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020310	B01AC15	amoxicillinum	Amoxicillinum	02031001	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020311	B01AC16	amoxicillinum	Amoxicillinum	02031101	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020312	B01AC17	amoxicillinum	Amoxicillinum	02031201	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020313	B01AC18	amoxicillinum	Amoxicillinum	02031301	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020314	B01AC19	amoxicillinum	Amoxicillinum	02031401	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020315	B01AC20	amoxicillinum	Amoxicillinum	02031501	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020316	B01AC21	amoxicillinum	Amoxicillinum	02031601	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020317	B01AC22	amoxicillinum	Amoxicillinum	02031701	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020318	B01AC23	amoxicillinum	Amoxicillinum	02031801	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020319	B01AC24	amoxicillinum	Amoxicillinum	02031901	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020320	B01AC25	amoxicillinum	Amoxicillinum	02032001	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020321	B01AC26	amoxicillinum	Amoxicillinum	02032101	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020322	B01AC27	amoxicillinum	Amoxicillinum	02032201	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020323	B01AC28	amoxicillinum	Amoxicillinum	02032301	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020324	B01AC29	amoxicillinum	Amoxicillinum	02032401	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020325	B01AC30	amoxicillinum	Amoxicillinum	02032501	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020326	B01AC31	amoxicillinum	Amoxicillinum	02032601	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020327	B01AC32	amoxicillinum	Amoxicillinum	02032701	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020328	B01AC33	amoxicillinum	Amoxicillinum	02032801	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020329	B01AC34	amoxicillinum	Amoxicillinum	02032901	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020330	B01AC35	amoxicillinum	Amoxicillinum	02033001	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020331	B01AC36	amoxicillinum	Amoxicillinum	02033101	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020332	B01AC37	amoxicillinum	Amoxicillinum	02033201	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020333	B01AC38	amoxicillinum	Amoxicillinum	02033301	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020334	B01AC39	amoxicillinum	Amoxicillinum	02033401	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		
020335	B01AC40	amoxicillinum	Amoxicillinum	02033501	Amoxicillinum	Amoxicillinum	12.100.000.000	12.100.000,00	1000.000	12.100.000,00	12.100.000.000		





Уредба, којом се примењују у теку емисионим, објектно болничким лековима у здравственим установима

ЈКЛ	АТЦ	INN	Забављена имена	ФО	Ракурске јабучне лева	Класификација лека	Одображене	Одобрашен датум	Одобрашен датум	Одобрашен датум	Индикција	Корисник
0371					Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан		Илијин блатњан
0372					Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан		Илијин блатњан
0373					Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан		Илијин блатњан
0374					Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан		Илијин блатњан
0375					Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан		Илијин блатњан
0376					Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан		Илијин блатњан
0377					Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан		Илијин блатњан
0378					Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан		Илијин блатњан
0379					Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан		Илијин блатњан
0380					Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан		Илијин блатњан
0381					Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан		Илијин блатњан
0382					Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан		Илијин блатњан
0383					Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан		Илијин блатњан
0384					Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан	Илијин блатњан		Илијин блатњан

Lista B. Lijekovi se primjenjuju u svu ambulancu, od osnovnog do visokog stepena zbrinjavanja pacijenata

Table with 14 columns: JBL, ATC, INN, Zdravstvena lista, FO, Pakovanje i lista lista, Ime proizvođača (i.e.), Odstup (i.e.), Cena lista za pakovanje, DDD, Cena lista za ambulantna lica, Indikacija, Napomena



Устав Д. Устав који се примењује у току амбулантног, одомо болничког, једња и здравствених установи

ЈКЛ	АТЦ	INN	Забележа име лека	FO	Ракурсија / Јабна лека	Имену рамиона лека	Сачиња пронаша	Сачиња ваља за равања	DDO	Сачиња ваља за DDO	Сачиња ваља за DDO	Индикација	Кремера
021301	A02BA01	amoxicillin	AMOXICILIN	AMOXICILIN	AMOXICILIN	AMOXICILIN	AMOXICILIN	AMOXICILIN					
021302	A02BA02	amoxicillin trihydrate	AMOXICILIN TRIHIDRAT	AMOXICILIN TRIHIDRAT	AMOXICILIN TRIHIDRAT	AMOXICILIN TRIHIDRAT	AMOXICILIN TRIHIDRAT	AMOXICILIN TRIHIDRAT					
021303	A02BA03	amoxicillin sodium	AMOXICILIN Natrium	AMOXICILIN Natrium	AMOXICILIN Natrium	AMOXICILIN Natrium	AMOXICILIN Natrium	AMOXICILIN Natrium					
021304	A02BA04	amoxicillin potassium	AMOXICILIN Kalium	AMOXICILIN Kalium	AMOXICILIN Kalium	AMOXICILIN Kalium	AMOXICILIN Kalium	AMOXICILIN Kalium					
021305	A02BA05	amoxicillin potassium trihydrate	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat					
021306	A02BA06	amoxicillin sodium trihydrate	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat					
021307	A02BA07	amoxicillin potassium trihydrate	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat					
021308	A02BA08	amoxicillin sodium trihydrate	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat					
021309	A02BA09	amoxicillin potassium trihydrate	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat					
021310	A02BA10	amoxicillin sodium trihydrate	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat					
021311	A02BA11	amoxicillin potassium trihydrate	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat					
021312	A02BA12	amoxicillin sodium trihydrate	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat					
021313	A02BA13	amoxicillin potassium trihydrate	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat					
021314	A02BA14	amoxicillin sodium trihydrate	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat					
021315	A02BA15	amoxicillin potassium trihydrate	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat					
021316	A02BA16	amoxicillin sodium trihydrate	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat					
021317	A02BA17	amoxicillin potassium trihydrate	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat					
021318	A02BA18	amoxicillin sodium trihydrate	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat					
021319	A02BA19	amoxicillin potassium trihydrate	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat	AMOXICILIN Kaliumtrihydrat					
021320	A02BA20	amoxicillin sodium trihydrate	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat	AMOXICILIN Natriumtrihydrat					

Устав Д. Устав који се примењује у току амбулантног, одомо болничког, једња и здравствених установи















УстаВ. Закон који се примењује у току амбулантног, одомо болничког, лежења и здравственим установама

URL	ATC	INN	Zaštitno ime lek	FO	Ракурсна јабуча лека	Имени ранивог дела лека	Сачет за индивидуалну употребу (mg)	Сачет лека за убацивање	Сачет лека за убацивање DDD	Сачет лека за убацивање DDD	Индикација	Меремеза
0000000											<p>УстаВ. Закон који се примењује у току амбулантног, одомо болничког, лежења и здравственим установама</p>	
											<p>УстаВ. Закон који се примењује у току амбулантног, одомо болничког, лежења и здравственим установама</p>	
											<p>УстаВ. Закон који се примењује у току амбулантног, одомо болничког, лежења и здравственим установама</p>	
											<p>УстаВ. Закон који се примењује у току амбулантног, одомо болничког, лежења и здравственим установама</p>	



Упутство о начину коришћења овог табела је објављено у званичној службеној веб-страници Републике Србије

JBL	ATC	INN	Забележавање	FO	Рачунарска јабучница	Број регистрационог листа	Датум истека важињања регистрационог листа	Својственик важињања регистрационог листа	DDO	Својственик важињања DDO	Датум истека важињања DDO	Индикација	Намена
010102	H01AC02	lidocaine											Лидокаин је локални анестетик који се користи за анестезирање малих хируршких интервенција, као и за анестезирање зубних процедура. Такође се користи за лечење неких облика аритмија и за анестезирање приликом интубације. Може се користити и за анестезирање приликом оперативних процедура на очима и ушима. Не препоручује се за употребу у лечењу болних стања, као ни за анестезирање приликом интубације код деце. Не препоручује се за употребу у лечењу болних стања, као ни за анестезирање приликом интубације код деце.
010102	H01AC02	lidocaine											Лидокаин је локални анестетик који се користи за анестезирање малих хируршких интервенција, као и за анестезирање зубних процедура. Такође се користи за лечење неких облика аритмија и за анестезирање приликом интубације. Може се користити и за анестезирање приликом оперативних процедура на очима и ушима. Не препоручује се за употребу у лечењу болних стања, као ни за анестезирање приликом интубације код деце. Не препоручује се за употребу у лечењу болних стања, као ни за анестезирање приликом интубације код деце.
010102	H01AC02	lidocaine											Лидокаин је локални анестетик који се користи за анестезирање малих хируршких интервенција, као и за анестезирање зубних процедура. Такође се користи за лечење неких облика аритмија и за анестезирање приликом интубације. Може се користити и за анестезирање приликом оперативних процедура на очима и ушима. Не препоручује се за употребу у лечењу болних стања, као ни за анестезирање приликом интубације код деце. Не препоручује се за употребу у лечењу болних стања, као ни за анестезирање приликом интубације код деце.
010102	H01AC02	lidocaine											Лидокаин је локални анестетик који се користи за анестезирање малих хируршких интервенција, као и за анестезирање зубних процедура. Такође се користи за лечење неких облика аритмија и за анестезирање приликом интубације. Може се користити и за анестезирање приликом оперативних процедура на очима и ушима. Не препоручује се за употребу у лечењу болних стања, као ни за анестезирање приликом интубације код деце. Не препоручује се за употребу у лечењу болних стања, као ни за анестезирање приликом интубације код деце.





Лист Б. Лекови који се примењују у току амбулантног, обично болничког, лечења у здравственом установи

JKB	ATC	INN	Zaštitno ime lek	FO	Pakovanje i jedinica lek	Ime i prezime lekara	Opština	Opština pakovanja	Opština izvoza	Opština posredničkog lica	Ime lekara	Ime lekara	Ime lekara
0323	A01AD04	clotrimazol	CLOTIMAZOL	Pozivnica	10 tableta								<p>Др Драгана Милошевић, Медицински факултет, Катедра за терапију инфекција, Клиника за кожно-венеричке болести, Медицински центар Српске академије наука и уметности, Београд.</p>
0323	A01AD05	clotrimazol	CLOTIMAZOL	Pozivnica	10 tableta								<p>Др Драгана Милошевић, Медицински факултет, Катедра за терапију инфекција, Клиника за кожно-венеричке болести, Медицински центар Српске академије наука и уметности, Београд.</p>
0323	A01AD06	clotrimazol	CLOTIMAZOL	Pozivnica	10 tableta								<p>Др Драгана Милошевић, Медицински факултет, Катедра за терапију инфекција, Клиника за кожно-венеричке болести, Медицински центар Српске академије наука и уметности, Београд.</p>
0323	A01AD07	clotrimazol	CLOTIMAZOL	Pozivnica	10 tableta								<p>Др Драгана Милошевић, Медицински факултет, Катедра за терапију инфекција, Клиника за кожно-венеричке болести, Медицински центар Српске академије наука и уметности, Београд.</p>





Lista B. U skladu koji se primenjuje u svu ambulancu, od novo izdatih lekova u zdravstvenim ustanovama

JBL	ATC	INN	Zadovoljena lek	FO	Pakovanje i jedinica lek	Međunarodni naziv lek	Ordnja	Cena lekova u vredno za pakovanje	DDD	Cena lekova u vredno po DDD	Quantitativni iznos lekova	Indikacija	Napomena
010101		Amikacin	Amikacin 500mg/5ml	Amikacin 500mg/5ml	Amikacin 500mg/5ml	Amikacin 500mg/5ml	Amikacin 500mg/5ml					Amikacin je antibiotik širokog spektra koji deluje na gram pozitivne i gram negativne bakterije. Indikacija: infekcije uzrokovane gram negativnim bakterijama, uključujući: infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na peniciline i cefalosporine, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na aminoglikozide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na tetracikline, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na makrolide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na glikopeptide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na lipopeptide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na fosfolipone, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na beta-laktame, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na glikoziltransferaze, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na citohrom P450, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na druge enzime.	Amikacin je antibiotik širokog spektra koji deluje na gram pozitivne i gram negativne bakterije. Indikacija: infekcije uzrokovane gram negativnim bakterijama, uključujući: infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na peniciline i cefalosporine, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na aminoglikozide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na tetracikline, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na makrolide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na glikopeptide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na lipopeptide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na fosfolipone, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na beta-laktame, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na glikoziltransferaze, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na citohrom P450, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na druge enzime.
010102		Amikacin	Amikacin 500mg/5ml	Amikacin 500mg/5ml	Amikacin 500mg/5ml	Amikacin 500mg/5ml	Amikacin 500mg/5ml					Amikacin je antibiotik širokog spektra koji deluje na gram pozitivne i gram negativne bakterije. Indikacija: infekcije uzrokovane gram negativnim bakterijama, uključujući: infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na peniciline i cefalosporine, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na aminoglikozide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na tetracikline, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na makrolide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na glikopeptide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na lipopeptide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na fosfolipone, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na beta-laktame, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na glikoziltransferaze, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na citohrom P450, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na druge enzime.	Amikacin je antibiotik širokog spektra koji deluje na gram pozitivne i gram negativne bakterije. Indikacija: infekcije uzrokovane gram negativnim bakterijama, uključujući: infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na peniciline i cefalosporine, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na aminoglikozide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na tetracikline, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na makrolide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na glikopeptide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na lipopeptide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na fosfolipone, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na beta-laktame, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na glikoziltransferaze, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na citohrom P450, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na druge enzime.
010103		Amikacin	Amikacin 500mg/5ml	Amikacin 500mg/5ml	Amikacin 500mg/5ml	Amikacin 500mg/5ml	Amikacin 500mg/5ml					Amikacin je antibiotik širokog spektra koji deluje na gram pozitivne i gram negativne bakterije. Indikacija: infekcije uzrokovane gram negativnim bakterijama, uključujući: infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na peniciline i cefalosporine, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na aminoglikozide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na tetracikline, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na makrolide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na glikopeptide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na lipopeptide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na fosfolipone, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na beta-laktame, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na glikoziltransferaze, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na citohrom P450, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na druge enzime.	Amikacin je antibiotik širokog spektra koji deluje na gram pozitivne i gram negativne bakterije. Indikacija: infekcije uzrokovane gram negativnim bakterijama, uključujući: infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na peniciline i cefalosporine, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na aminoglikozide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na tetracikline, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na makrolide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na glikopeptide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na lipopeptide, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na fosfolipone, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na beta-laktame, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na glikoziltransferaze, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na citohrom P450, infekcije uzrokovane bakterijama koje su otporne na druge enzime.







Lista B, lijek koji se primjenjuje u akutnom bolničkom lečenju u zdravstvenim ustanovama

Table with 13 columns: JBL, ATC, INN, Zdravstvena lista, FO, Pakovanje i jedinica lista, Ime proizvođača lista, Oznaka proizvođača lista, Cena lista za pakovanje, DDD, Cena lista od uključene lista, Indikacija, Napomena





Lista B. Lijekovi koji se primjenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JBL	ATC	INN	Zaštitna linija	FO	Pakovanje i jedinica mera	Međunarodni naziv lijeka	Ordnja	Cena lista za veliku zaštitnu pakovanja	DDD	Cena lista za veliku po DDD	Štampovanih lista	Indikacija	Napomena
010101	B01AC06	clonazepam	01010101	Prigodna za ambulantno lečenje	10 tableta u pakovanju	clonazepam	10 tableta u pakovanju	10,00				<p>U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze. U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze. U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze.</p> <p>U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze. U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze. U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze.</p>	<p>U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze. U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze. U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze.</p>
010102	B01AC06	clonazepam	01010201	Prigodna za ambulantno lečenje	10 tableta u pakovanju	clonazepam	10 tableta u pakovanju	10,00				<p>U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze. U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze. U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze.</p>	<p>U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze. U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze. U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze.</p>
010103	B01AC06	clonazepam	01010301	Prigodna za ambulantno lečenje	10 tableta u pakovanju	clonazepam	10 tableta u pakovanju	10,00				<p>U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze. U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze. U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze.</p>	<p>U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze. U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze. U slučaju epileptičkih napada, treba uzeti najmanje 10 mg dnevno, u 2-3 doze.</p>





Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulancnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JBL	ATC	INN	Zadovoljena lek	FO	Pakovanje i jedinica lek	Međunarodni naziv lek	Ordnja proizvođača (leka)	Cena lek za valdo za pakovanje	DDD	Cena lek od valdo po DDD	Entropološki leka	Indikacija	Prema
00382	A02BA01	ibuprofen	ibuprofen 200mg tablete	ibuprofen 200mg tablete	ibuprofen 200mg tablete	ibuprofen 200mg tablete	ibuprofen 200mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 200mg tablete	ibuprofen 200mg tablete
00383	A02BA02	ibuprofen	ibuprofen 400mg tablete	ibuprofen 400mg tablete	ibuprofen 400mg tablete	ibuprofen 400mg tablete	ibuprofen 400mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 400mg tablete	ibuprofen 400mg tablete
00384	A02BA03	ibuprofen	ibuprofen 600mg tablete	ibuprofen 600mg tablete	ibuprofen 600mg tablete	ibuprofen 600mg tablete	ibuprofen 600mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 600mg tablete	ibuprofen 600mg tablete
00385	A02BA04	ibuprofen	ibuprofen 800mg tablete	ibuprofen 800mg tablete	ibuprofen 800mg tablete	ibuprofen 800mg tablete	ibuprofen 800mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 800mg tablete	ibuprofen 800mg tablete
00386	A02BA05	ibuprofen	ibuprofen 1000mg tablete	ibuprofen 1000mg tablete	ibuprofen 1000mg tablete	ibuprofen 1000mg tablete	ibuprofen 1000mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 1000mg tablete	ibuprofen 1000mg tablete
00387	A02BA06	ibuprofen	ibuprofen 1200mg tablete	ibuprofen 1200mg tablete	ibuprofen 1200mg tablete	ibuprofen 1200mg tablete	ibuprofen 1200mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 1200mg tablete	ibuprofen 1200mg tablete
00388	A02BA07	ibuprofen	ibuprofen 1400mg tablete	ibuprofen 1400mg tablete	ibuprofen 1400mg tablete	ibuprofen 1400mg tablete	ibuprofen 1400mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 1400mg tablete	ibuprofen 1400mg tablete
00389	A02BA08	ibuprofen	ibuprofen 1600mg tablete	ibuprofen 1600mg tablete	ibuprofen 1600mg tablete	ibuprofen 1600mg tablete	ibuprofen 1600mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 1600mg tablete	ibuprofen 1600mg tablete
00390	A02BA09	ibuprofen	ibuprofen 1800mg tablete	ibuprofen 1800mg tablete	ibuprofen 1800mg tablete	ibuprofen 1800mg tablete	ibuprofen 1800mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 1800mg tablete	ibuprofen 1800mg tablete
00391	A02BA10	ibuprofen	ibuprofen 2000mg tablete	ibuprofen 2000mg tablete	ibuprofen 2000mg tablete	ibuprofen 2000mg tablete	ibuprofen 2000mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 2000mg tablete	ibuprofen 2000mg tablete
00392	A02BA11	ibuprofen	ibuprofen 2200mg tablete	ibuprofen 2200mg tablete	ibuprofen 2200mg tablete	ibuprofen 2200mg tablete	ibuprofen 2200mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 2200mg tablete	ibuprofen 2200mg tablete
00393	A02BA12	ibuprofen	ibuprofen 2400mg tablete	ibuprofen 2400mg tablete	ibuprofen 2400mg tablete	ibuprofen 2400mg tablete	ibuprofen 2400mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 2400mg tablete	ibuprofen 2400mg tablete
00394	A02BA13	ibuprofen	ibuprofen 2600mg tablete	ibuprofen 2600mg tablete	ibuprofen 2600mg tablete	ibuprofen 2600mg tablete	ibuprofen 2600mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 2600mg tablete	ibuprofen 2600mg tablete
00395	A02BA14	ibuprofen	ibuprofen 2800mg tablete	ibuprofen 2800mg tablete	ibuprofen 2800mg tablete	ibuprofen 2800mg tablete	ibuprofen 2800mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 2800mg tablete	ibuprofen 2800mg tablete
00396	A02BA15	ibuprofen	ibuprofen 3000mg tablete	ibuprofen 3000mg tablete	ibuprofen 3000mg tablete	ibuprofen 3000mg tablete	ibuprofen 3000mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 3000mg tablete	ibuprofen 3000mg tablete
00397	A02BA16	ibuprofen	ibuprofen 3200mg tablete	ibuprofen 3200mg tablete	ibuprofen 3200mg tablete	ibuprofen 3200mg tablete	ibuprofen 3200mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 3200mg tablete	ibuprofen 3200mg tablete
00398	A02BA17	ibuprofen	ibuprofen 3400mg tablete	ibuprofen 3400mg tablete	ibuprofen 3400mg tablete	ibuprofen 3400mg tablete	ibuprofen 3400mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 3400mg tablete	ibuprofen 3400mg tablete
00399	A02BA18	ibuprofen	ibuprofen 3600mg tablete	ibuprofen 3600mg tablete	ibuprofen 3600mg tablete	ibuprofen 3600mg tablete	ibuprofen 3600mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 3600mg tablete	ibuprofen 3600mg tablete
00400	A02BA19	ibuprofen	ibuprofen 3800mg tablete	ibuprofen 3800mg tablete	ibuprofen 3800mg tablete	ibuprofen 3800mg tablete	ibuprofen 3800mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 3800mg tablete	ibuprofen 3800mg tablete
00401	A02BA20	ibuprofen	ibuprofen 4000mg tablete	ibuprofen 4000mg tablete	ibuprofen 4000mg tablete	ibuprofen 4000mg tablete	ibuprofen 4000mg tablete	10,000	10,000	10,000	10,000	ibuprofen 4000mg tablete	ibuprofen 4000mg tablete















Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JBL	ATC	INN	Zadovoljena lek	FO	Pakovanje i jedinica lek	Međunarodni naziv lek	Ordnja	Cena lek za vredno za pakovanje	DDD	Cena lek za vredno po DDD	Quantitativna jedinica	Indikacija	Uputstva
03204	A03DA04	Amoxicillin	Amoxicillin	03204	Amoxicillin, 250 mg, tablete, 100 komada	Amoxicillin, 250 mg, tablete, 100 komada	1 komada	4,49	250 mg	17,56	100 tableta	Amoxicillin je antibiotik širokog spektra koji deluje protiv bakterija. Koristi se za lečenje različitih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije uvođenja, infekcije uha, infekcije grla, infekcije nosa, infekcije sinusa, infekcije pluća, infekcije kože i infekcije urinarnog sistema. Amoxicillin se takođe koristi za prevenciju infekcija nakon operacija i za lečenje infekcija kod životinja.	
03204	A03DA04	Amoxicillin	Amoxicillin	03204	Amoxicillin, 500 mg, tablete, 100 komada	Amoxicillin, 500 mg, tablete, 100 komada	1 komada	8,98	500 mg	35,12	100 tableta	Amoxicillin je antibiotik širokog spektra koji deluje protiv bakterija. Koristi se za lečenje različitih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije uvođenja, infekcije uha, infekcije grla, infekcije nosa, infekcije sinusa, infekcije pluća, infekcije kože i infekcije urinarnog sistema. Amoxicillin se takođe koristi za prevenciju infekcija nakon operacija i za lečenje infekcija kod životinja.	
03204	A03DA04	Amoxicillin	Amoxicillin	03204	Amoxicillin, 250 mg, tablete, 200 komada	Amoxicillin, 250 mg, tablete, 200 komada	2 komada	8,98	500 mg	35,12	200 tableta	Amoxicillin je antibiotik širokog spektra koji deluje protiv bakterija. Koristi se za lečenje različitih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije uvođenja, infekcije uha, infekcije grla, infekcije nosa, infekcije sinusa, infekcije pluća, infekcije kože i infekcije urinarnog sistema. Amoxicillin se takođe koristi za prevenciju infekcija nakon operacija i za lečenje infekcija kod životinja.	
03204	A03DA04	Amoxicillin	Amoxicillin	03204	Amoxicillin, 500 mg, tablete, 200 komada	Amoxicillin, 500 mg, tablete, 200 komada	2 komada	17,96	500 mg	70,24	200 tableta	Amoxicillin je antibiotik širokog spektra koji deluje protiv bakterija. Koristi se za lečenje različitih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije uvođenja, infekcije uha, infekcije grla, infekcije nosa, infekcije sinusa, infekcije pluća, infekcije kože i infekcije urinarnog sistema. Amoxicillin se takođe koristi za prevenciju infekcija nakon operacija i za lečenje infekcija kod životinja.	
03204	A03DA04	Amoxicillin	Amoxicillin	03204	Amoxicillin, 250 mg, tablete, 50 komada	Amoxicillin, 250 mg, tablete, 50 komada	1 komada	17,96	500 mg	70,24	50 tableta	Amoxicillin je antibiotik širokog spektra koji deluje protiv bakterija. Koristi se za lečenje različitih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije uvođenja, infekcije uha, infekcije grla, infekcije nosa, infekcije sinusa, infekcije pluća, infekcije kože i infekcije urinarnog sistema. Amoxicillin se takođe koristi za prevenciju infekcija nakon operacija i za lečenje infekcija kod životinja.	
03204	A03DA04	Amoxicillin	Amoxicillin	03204	Amoxicillin, 500 mg, tablete, 50 komada	Amoxicillin, 500 mg, tablete, 50 komada	1 komada	35,92	500 mg	140,48	50 tableta	Amoxicillin je antibiotik širokog spektra koji deluje protiv bakterija. Koristi se za lečenje različitih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije uvođenja, infekcije uha, infekcije grla, infekcije nosa, infekcije sinusa, infekcije pluća, infekcije kože i infekcije urinarnog sistema. Amoxicillin se takođe koristi za prevenciju infekcija nakon operacija i za lečenje infekcija kod životinja.	
03204	A03DA04	Amoxicillin	Amoxicillin	03204	Amoxicillin, 250 mg, tablete, 100 komada	Amoxicillin, 250 mg, tablete, 100 komada	1 komada	35,92	500 mg	140,48	100 tableta	Amoxicillin je antibiotik širokog spektra koji deluje protiv bakterija. Koristi se za lečenje različitih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije uvođenja, infekcije uha, infekcije grla, infekcije nosa, infekcije sinusa, infekcije pluća, infekcije kože i infekcije urinarnog sistema. Amoxicillin se takođe koristi za prevenciju infekcija nakon operacija i za lečenje infekcija kod životinja.	
03204	A03DA04	Amoxicillin	Amoxicillin	03204	Amoxicillin, 500 mg, tablete, 100 komada	Amoxicillin, 500 mg, tablete, 100 komada	1 komada	71,84	500 mg	280,96	100 tableta	Amoxicillin je antibiotik širokog spektra koji deluje protiv bakterija. Koristi se za lečenje različitih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije uvođenja, infekcije uha, infekcije grla, infekcije nosa, infekcije sinusa, infekcije pluća, infekcije kože i infekcije urinarnog sistema. Amoxicillin se takođe koristi za prevenciju infekcija nakon operacija i za lečenje infekcija kod životinja.	
03204	A03DA04	Amoxicillin	Amoxicillin	03204	Amoxicillin, 250 mg, tablete, 200 komada	Amoxicillin, 250 mg, tablete, 200 komada	2 komada	71,84	500 mg	280,96	200 tableta	Amoxicillin je antibiotik širokog spektra koji deluje protiv bakterija. Koristi se za lečenje različitih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije uvođenja, infekcije uha, infekcije grla, infekcije nosa, infekcije sinusa, infekcije pluća, infekcije kože i infekcije urinarnog sistema. Amoxicillin se takođe koristi za prevenciju infekcija nakon operacija i za lečenje infekcija kod životinja.	
03204	A03DA04	Amoxicillin	Amoxicillin	03204	Amoxicillin, 500 mg, tablete, 200 komada	Amoxicillin, 500 mg, tablete, 200 komada	2 komada	143,68	500 mg	561,92	200 tableta	Amoxicillin je antibiotik širokog spektra koji deluje protiv bakterija. Koristi se za lečenje različitih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije uvođenja, infekcije uha, infekcije grla, infekcije nosa, infekcije sinusa, infekcije pluća, infekcije kože i infekcije urinarnog sistema. Amoxicillin se takođe koristi za prevenciju infekcija nakon operacija i za lečenje infekcija kod životinja.	







Устав, Закон ој се спровођењу и делу емисионим, односто јединица и збираним истраживањем

JEL	ATC	INN	Zabolevanje	FO	Receptura / Jedinica	Merilo primenljivosti	Ordni broj pravilnika	Cena lekova u vrednosti pakovanja	DDD	Cena lekova u vrednosti DDD	Statističko osigurano lica	Indikacija	Uputstva
M40	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1. I, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M41	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M42	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M43	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M44	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M45	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M46	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M47	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M48	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M49	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M50	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M51	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M52	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M53	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M54	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M55	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M56	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M57	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M58	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M59	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			
M60	B01AB02	Aspirin	bolest krvnih sudova	B01AC06	Aspirin, 100 mg	1.1, 1.1.1, 1.1.1.1	115/2016	12,460	70	12,460			



Устав, Закон кој се пријављује и токү амбулантног објектног лечења у здравственим установима

ЈРЛ	АТК	ИНН	Заболело лице	ФО	Ракурска јабита лица	Извор привредног лека	Основа привредног лека	Осн. лека за привредно лечење	ДДО	Осн. лека за лекара ДОО	Индикација	Краткоца
2012.1	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.2	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.3	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.4	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.5	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.6	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.7	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.8	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.9	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.10	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.11	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.12	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.13	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.14	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.15	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.16	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.17	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.18	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.19	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				
2012.20	Р03.01.1	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000		0000000000				

Ustav, Ustav koji se primenjuje u svim situacijama, od osnovnog do visokog stepena razvijene demokratije

Table with 16 columns: JBL, ATC, INN, Zastupnik lista, FO, Pakovanje i jedinica lista, Materijal proizveden u Srbiji, Odrza proizvedena u Srbiji, Cena lista za pakovanje, DDD, Cena lista od velike po DDD, Kategorija lista, Indikacija, Napomena. Rows include entries for '181001' through '181019' with corresponding drug names and details.









JKL	ATC	INN	Zaštiteno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DOD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1069400	B02BX04	romiplostim	AMPLATE	prášak za rastvor za injekciju	bočica, 1 po 250 mcs	Amgen Europe B.V.	Holandija	42.288,50	30 mcs	7.474,62	-	Terapija refraktarne hronične imunološke trombocitopenijske purpore odraslih pacijenata (D69.3): 1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije 2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja in lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srijne - KBC Bežanijska Kosa. - Klinika za hematologiju KC Vojvodine. - Klinika za hematologiju i limfoblastičnu imunologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija
1089111	B02BX05	eltrombopag	REVOLADE	film tableta	blister, 28 po 25 mg	Glaxo Wellcome Operations, Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija, Španija	102.400,40	50 mg	7.314,31	-	Terapija refraktarne hronične imunološke trombocitopenijske purpore odraslih pacijenata (D69.3): 1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije 2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja in lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srijne - KBC Bežanijska Kosa. - Klinika za hematologiju KC Vojvodine. - Klinika za hematologiju i limfoblastičnu imunologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija
1089110	B02BX05	eltrombopag	REVOLADE	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Glaxo Wellcome Operations, Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija, Španija	204.680,50	50 mg	7.310,02	-	Terapija refraktarne hronične imunološke trombocitopenijske purpore odraslih pacijenata (D69.3): 1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije 2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja in lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srijne - KBC Bežanijska Kosa. - Klinika za hematologiju KC Vojvodine. - Klinika za hematologiju i limfoblastičnu imunologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija
1069152	B03XA01	epreptin alfa	EPREX	rastvor za injekciju špic	nepunjen injektivni špic, 6 po 0,5 ml (2000 IU/1,00 ml)	Chug AG	Švajcarska	7.299,20	1000 IU	606,27	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postavljanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa: sanitari infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru dijaliziranost bolesnika	
1069157	B03XA01	epreptin alfa	EPREX	rastvor za injekciju špic	nepunjen injektivni špic, 6 po 1 ml (1000 IU/1 ml)	Chug AG	Švajcarska	33.956,30	1000 IU	566,94	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postavljanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa: sanitari infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru dijaliziranost bolesnika.	



Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštiteno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069145	B03XA01	efepin alfa	BINOCRIT	rastvor za injekciju u napunjenom injekcijskom špricu	6 po 1ml (2000)/1ml	Sandoz GmbH	Austrija	5.142,20	1000 i.j.	428,52	-		Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza; samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depepe gvožđa, samirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliranost bolesnika.
0069165	B03XA01	efepin beta	RECCORMON	rastvor za injekciju špric	napunjeni injekcioni špric; 6 bрыз. по 2000 i.j./0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemacka	7.345,90	1000 i.j.	612,16	-		Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza; samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depepe gvožđa, samirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliranost bolesnika.
0069166	B03XA01	efepin beta	RECCORMON	rastvor za injekciju špric	napunjeni injekcioni špric; 6 bрыз. по 5000 i.j./0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemacka	22.185,40	1000 i.j.	739,51	-		Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza; samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depepe gvožđa, samirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliranost bolesnika.
0069222	B03XA01	efepin zeta	ECORALYS	rastvor za injekciju	napunjeni ml špric 6 po 0.6 ml (1000 i.j./0.3 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	3.672,00	1000 i.j.	612,17	-		Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza; samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depepe gvožđa, samirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliranost bolesnika.
0069227	B03XA01	efepin zeta	ECORALYS	rastvor za injekciju	napunjeni ml špric 6 po 0.6 ml (2000 i.j./0.6 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	7.200,30	1000 i.j.	600,03	-		Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza; samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depepe gvožđa, samirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliranost bolesnika.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštitno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Državo proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069235	B03XA01	epoetin zeta	EPORALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 6 po 0.4 ml (4000 i.j./0.4 ml)	HemoFarm a.d.	Republika Srbija	14.273,10	1000 i.j.	594,71	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depepe gvozdta, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdajljivost bolesnika.	
0069233	B03XA01	epoetin zeta	EPORALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 1 ml (10000 i.j./ml)	HemoFarm a.d.	Republika Srbija	6.121,60	1000 i.j.	612,16	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depepe gvozdta, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdajljivost bolesnika.	
0069224	B03XA01	epoetin zeta	EPORALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0.5 ml (2000 i.j./0.5 ml)	HemoFarm a.d.	Republika Srbija	12.243,30	1000 i.j.	612,16	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depepe gvozdta, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdajljivost bolesnika.	
0069228	B03XA01	epoetin zeta	EPORALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0.75 ml (30000 i.j./0.75 ml)	HemoFarm a.d.	Republika Srbija	18.364,80	1000 i.j.	612,16	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depepe gvozdta, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdajljivost bolesnika.	
0069160	B03XA01	epoetin zeta	EPORALYS	rastvor za injekciju u napunjenom injektoru špric 1,5 po 0.5ml (2000 i.j./0.5ml)	napunjen injektoru špric 1,5 po 0.5ml (2000 i.j./0.5ml)	Merckle Biotech GmbH	Nemacka	7.130,50	1000 i.j.	594,21	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depepe gvozdta, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdajljivost bolesnika.	

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastiteno ime leka	FD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Načupmena
0069161	B03XA01	eposetin teta	EPORATIO	FD	napunjen injezioni špric sa bezbedosnim sredstvom 6 po 0.5ml (2000lj / 0.5ml)	Merckle Biotech GmbH	Nemackia	7.130.50	1000lj	694.21	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depepe gvozdča, samirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliranost bolesnika	
0069162	B03XA01	eposetin teta	EPORATIO	FD	napunjen injezioni špric sa bezbedosnim sredstvom 6 po 0.5ml (5000lj / 0.5ml)	Merckle Biotech GmbH	Nemackia	22.195.40	1000lj	739.51	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depepe gvozdča, samirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliranost bolesnika	
0069163	B03XA01	eposetin teta	EPORATIO	FD	napunjen injezioni špric sa bezbedosnim sredstvom 6 po 0.5ml (5000lj / 0.5ml)	Merckle Biotech GmbH	Nemackia	22.195.40	1000lj	739.51	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene entropoetina obavezno popuniti depepe gvozdča, samirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliranost bolesnika	

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FC	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069533	B03XA02	darbapocetin afa	ARANESP	razvozi za injekciju u napunjenom injeksionom špricu	napunjen injeksioni špic, 1 po 0,4 ml (10 mcg/0,4 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	1.360,40	4,5 mcg	612,18	-	<p>1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbapocetina popuniti depeze gvožđa, samratil infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru hidrataziju bolesnika</p> <p>2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa. Za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti kirensa kreatinina &gt;50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbapocetina kongrovati sve razloge za nastanak anemije (nizakritična gvožđa, vitamin, drugih nutritivnih faktora, zadržavanje tečnosti).</p>	
0069524	B03XA02	darbapocetin afa	ARANESP	razvozi za injekciju u napunjenom injeksionom špricu	napunjen injeksioni špic, 1 po 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	2.720,70	4,5 mcg	612,18	-	<p>1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbapocetina popuniti depeze gvožđa, samratil infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru hidrataziju bolesnika</p> <p>2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa. Za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti kirensa kreatinina &gt;50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbapocetina kongrovati sve razloge za nastanak anemije (nizakritična gvožđa, vitamin, drugih nutritivnih faktora, zadržavanje tečnosti).</p>	



Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastićeno ime leka	FO	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
008928	B03A02	darbepoetin alfa	ARANESP	rešuv za injekciju u napunjenom injekcijskom špricu	napunjen injekcioni špic 1 po 0.3 ml (0.3 mg/0.3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	4.091.20	4.5 mcg	612.19	-	<p>1. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza, samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.</p> <p>2. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa, za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti kreatinina &lt;math&gt;\leq 50&lt;/math&gt; ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nedostatak gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustavljeni krvarenje).</p>	
008928	B03A02	darbepoetin alfa	ARANESP	rešuv za injekciju u napunjenom injekcijskom špricu	napunjen injekcioni špic 1 po 0.4 ml (4.0 mg/0.4 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	5.441.50	4.5 mcg	612.17	-	<p>1. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza, samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti rezerve gvožđa, samrtli infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru hidrataziju bolesnika.</p> <p>2. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa, za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti kreatinina &lt;math&gt;\leq 50&lt;/math&gt; ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nedostatak gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustavljeni krvarenje).</p>	

JKL	ATC	INN	Zaštitno ime leka	FC	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069933	B03XA02	darbapocetin afa	ARANESP	razvor za injekciju u napunjenom injeksionom špricu	napunjen injeksioni špric 1 po 0,3 ml (30 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	6.801,90	4,5 mcg	612,17	-	<p>1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbapocetina popuniti depepe gvožđa, samratil infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru hidrataziju bolesnika</p> <p>2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa. Za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti kreatinina 350 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbapocetina kongrovati sve razloge za nastanak anemije (nadmokrada gvožđa, vitaminima, dugim nutricionalnim faktorima, zadržavati krvarenje).</p>	
0069934	B03XA02	darbapocetin afa	ARANESP	razvor za injekciju u napunjenom injeksionom špricu	napunjen injeksioni špric 1 po 0,3 ml (60 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	9.162,30	4,5 mcg	612,17	-	<p>1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbapocetina popuniti depepe gvožđa, samratil infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru hidrataziju bolesnika</p> <p>2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa. Za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti kreatinina 350 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbapocetina kongrovati sve razloge za nastanak anemije (nadmokrada gvožđa, vitaminima, dugim nutricionalnim faktorima, zadržavati krvarenje).</p>	

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastićeno ime leka	FO	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0089526	B03A02	darbepoetin alfa	ARANESP	rešuv za injekciju u napunjenom injekcijskom špricu	napunjen injekcioni špic 1 po 0,4 ml (80 mcg/0,4 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	10.853,00	4,5 mcg	612,17	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nedostatak gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustavljeni krvarenje). 2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti hemoglobina 50-110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nedostatak gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustavljeni krvarenje).	
0089520	B03A02	darbepoetin alfa	ARANESP	rešuv za injekciju u napunjenom injekcijskom špricu	napunjen injekcioni špic 1 po 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	13.603,70	4,5 mcg	612,17	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nedostatak gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustavljeni krvarenje). 2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti hemoglobina 50-110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nedostatak gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustavljeni krvarenje).	



Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FC	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069022	B03XA02	darbepoetin Alfa	ARANESP	razvor za injekciju u napunjenoj injekcionom šprici	napunjen injekcionim špricom po 0,3 ml (1,50 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	20.406,70	4,5 mcg	612,17	-	<p>1. Pomenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljne vrednosti hemoglobina 110 g/l</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depono gvožđa, samrtli infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru odjitaliziranos bolesnika</p> <p>2. Pomenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a na osnovu mišljenja lekara nefrologa, za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti kiselensa kreatinina <math>\geq 50</math> ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nudekriada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).</p>	
0088926	B03XA02	darbepoetin Alfa	ARANESP	razvor za injekciju u napunjenoj injekcionom šprici	napunjen injekcionim špricom po 0,6 ml (300 mcg/0,6 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	40.611,20	4,5 mcg	612,17	-	<p>1. Pomenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depono gvožđa, samrtli infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru odjitaliziranos bolesnika</p> <p>2. Pomenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a na osnovu mišljenja lekara nefrologa, za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti kiselensa kreatinina <math>\geq 50</math> ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nudekriada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).</p>	
0069206	B03XA03	mekoksipolileng lkel - epcetin beta	MIFCERA	razvor za injekciju	1 po 50 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemacka	8.994,70	4 mcg	718,78	-	<p>1. Pomenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a na osnovu mišljenja lekara nefrologa, za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti kiselensa kreatinina <math>\geq 30</math> ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l</p> <p>- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dupoddeljivih preparata endogenih kongenitali sve razloge za nastanak anemije (nudekriada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).</p>	

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastuženo ime leka	FO	Pakovanje i jčina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069205	B03XA03	metoksipoliteneng lkol - epeetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	1 po 75 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemacka	13.447,00	4 mcg	717,17	-	1. Primerjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti hemoglobina kretnina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata entroposetina kongovati sve razloge za nastanak anemije (nadmoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti koverenje).	
0069204	B03XA03	metoksipoliteneng lkol - epeetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	1 po 100 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemacka	17.909,40	4 mcg	716,98	-	1. Primerjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti hemoglobina kretnina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata entroposetina kongovati sve razloge za nastanak anemije (nadmoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti koverenje).	
0069203	B03XA03	metoksipoliteneng lkol - epeetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	napunjen injektioni šprice, 1 po 150 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemacka	26.831,60	4 mcg	715,51	-	1. Primerjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti hemoglobina kretnina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata entroposetina kongovati sve razloge za nastanak anemije (nadmoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti koverenje).	
0069202	B03XA03	metoksipoliteneng lkol - epeetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	napunjen injektioni šprice, 1 po 200 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemacka	35.757,50	4 mcg	715,15	-	1. Primerjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti hemoglobina kretnina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata entroposetina kongovati sve razloge za nastanak anemije (nadmoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti koverenje).	

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zasticeo ime leka	FC	Pakovanje i jakina leka	Drzava proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0089201	B03AA03	metekipolesterig likol - epoeilin beta	MIRCEKA	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 250 mcg/0.3 ml	Nemačka	44.650.90	4 mcg	714.69	-	1. Primeniše se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstveni delanje na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu ostijena lekara nefrologa za lezanie pacijenata sa anemijom u bronhoro bubrežno insuficijenciji, kod kojih su vrednosti kreatinina <math>\leq 50\text{ ml/min}</math>, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina kongovati sve razloge za nastanak anemije (nadmoknata puoča, vitamin, drugih nutritivnih faktora, zaustavliti kvantite).	

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštiteno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0089213	B03XA03	metoksipoliteteng likol - epeoin beta	MIRCERA	rešev za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcion špric, 1 po 30 mg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	5.417,90	4 mcg	721,72	-	1. Primerjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa, za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti hemoglobina kretnina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata entropoetina kongovati sve razloge za nastanak anemije (makrocnada grožđa, vitamin, drugih nutritivnih faktora, zadržaviti krvarenje)	
0089214	B03XA03	metoksipoliteteng likol - epeoin beta	MIRCERA	rešev za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcion špric, 1 po 120 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	21.477,80	4 mcg	715,92	-	1. Primerjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa, za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti hemoglobina kretnina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata entropoetina kongovati sve razloge za nastanak anemije (makrocnada grožđa, vitamin, drugih nutritivnih faktora, zadržaviti krvarenje)	
0089214	B03XA03	metoksipoliteteng likol - epeoin beta	MIRCERA	rešev za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcion špric, 1 po 350 mcg/0,5 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	64.312,50	4 mcg	714,58	-	1. Primerjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa, za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti hemoglobina kretnina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l -za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata entropoetina kongovati sve razloge za nastanak anemije (makrocnada grožđa, vitamin, drugih nutritivnih faktora, zadržaviti krvarenje)	
0031002	L01AA09	benfotimust	PIBOMUSTIN	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena 5 po 25 mg	Temmler Werke GmbH, Haupt Pharma Wolfrauhausen GmbH	Nemačka, Nemačka	25.245,50	-	-	-	Piva linija u lečenju hronične infobcine leukemije (binet-stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa flutratrinom nije odgovarajuća	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja in lekara središnjeg zdravstvenog ustrova. - Klinika za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Institut za hematologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštitno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0031003	L01AA09	bendamustin	RIBOMUSTIN	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 100 mg	Teimeler-Werke GmbH, Haupt Pharma Wolftrahausen GmbH	Nemačka, Nemačka	99.605,50	-	-	-	Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za hematologiju i hematiku imunologiju KC Niš - Klinika za onkologiju KC Niš, KC Kragujevac - Vojvođeđinska akademija
0031005	L01AA09	bendamustin	BENDAMUSTINE PHARMASWISS	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 mg	PharmaSwiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	5.048,10	-	-	-	Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za hematologiju i hematiku imunologiju KC Niš - Klinika za onkologiju KC Niš, KC Kragujevac - Vojvođeđinska akademija
0031008	L01AA09	bendamustin	BENDAMUSTINE PHARMASWISS	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	19.951,70	-	-	-	Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za hematologiju i hematiku imunologiju KC Niš - Klinika za onkologiju KC Niš, KC Kragujevac - Vojvođeđinska akademija
0031006	L01AA09	bendamustin	BENDAMUSTINE PHARMASWISS	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 25 mg	PharmaSwiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	25.245,50	-	-	-	Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za hematologiju i hematiku imunologiju KC Niš - Klinika za onkologiju KC Niš, KC Kragujevac - Vojvođeđinska akademija



Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastiteno ime leka	FO	Pakovanje i jachna leka	Naзив произвођача leka	Država proizvođinje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0031009	L01AA09	bendamustin	BENDAMUSTINE PHARMASWISS	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	boćica staklena, 5 po 100mg	PharmaSwiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	99.805,50	-	-	-	Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Klinika za hematologiju KC Vojvodine - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija
0031007	L01AA09	bendamustin	BENDAMUSTINE PHARMASWISS	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	bećica staklena, 10 po 25 mg	PharmaSwiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	50.491,00	-	-	-	Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Klinika za hematologiju KC Vojvodine - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija
0031010	L01AA09	bendamustin	BENDAMUSTINE PHARMASWISS	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	boćica staklena, 10 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	199.611,00	-	-	-	Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Klinika za hematologiju KC Vojvodine - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija
1031406	L01AX03	temozomid	TEMODAL	kapsula, tvrd	boćica, 5 po 250 mg	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	30.636,90	-	-	-	Glavobolja multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metastatskim statusom MGMT PS. 0 ili (EGFR) pozitivnim statusom EGFR i negativnim statusom EGFR u kombinaciji sa irinotecanom u dozama od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učenim 3-4 nedelje posle operativnog lečenja na konzaljumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija

JKL	ATC	INN	Zastiteno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravajućica	Indikacija	Napomena
1031410	L01AX03	temozolomid	LOSTRIS	kapsula, tvrda	bočica, 5 po 20 mg	Cell Pharm GmbH, Nepharma S.r.l., Haupt Pharma GmbH, Amareg GmbH	Nemačka Italija	3.147,40	-	-	-	Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena. PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemoterapije se vrši po uvidu u MRI u dužini 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurologiju KC Srbije - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija
1031412	L01AX03	temozolomid	LOSTRIS	kapsula, tvrda	bočica, 5 po 100 mg	Cell Pharm GmbH, Nepharma S.r.l., Haupt Pharma GmbH, Amareg GmbH	Nemačka Italija	15.571,20	-	-	-	Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena. PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemoterapije se vrši po uvidu u MRI u dužini 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurologiju KC Srbije - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija
1031411	L01AX03	temozolomid	LOSTRIS	kapsula, tvrda	bočica, 5 po 250 mg	Cell Pharm GmbH, Nepharma S.r.l., Haupt Pharma GmbH, Amareg GmbH	Nemačka Italija	30.636,80	-	-	-	Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena. PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemoterapije se vrši po uvidu u MRI u dužini 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurologiju KC Srbije - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija
1031398	L01AX03	temozolomid	TEMAZOL	kapsula, tvrda	bočica, 5 po 5 mg	Nepharma S.R.L., Haupt Pharma Amareg GmbH, Privata Hvala d.o.o.	Italija, Nemačka, Privata	1.126,70	-	-	-	Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena. PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemoterapije se vrši po uvidu u MRI u dužini 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurologiju KC Srbije - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1031400	L01AX03	temozolomid	TEMAZOL	kapsula tvrd	bočica, 5 po 20 mg	Nepharma S.R.L.; Haupt Pharma Anarag GmbH, Piva Hrvatska d.o.o.	Italija; Nemačka; Hrvatska	3.147,40	-	-	-	Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena. PS 0 ili 1 (ECCO) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno istovremeno sa zračenom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Za podizanje terapije se vrši po utvrdi u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzaljumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sedišnih zdravstvenih ustanova - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za neurologiju i radiologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija
1031401	L01AX03	temozolomid	TEMAZOL	kapsula tvrd	bočica, 5 po 100 mg	Nepharma S.R.L.; Haupt Pharma Anarag GmbH, Piva Hrvatska d.o.o.	Italija; Nemačka; Hrvatska	15.571,20	-	-	-	Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena. PS 0 ili 1 (ECCO) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno istovremeno sa zračenom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Za podizanje terapije se vrši po utvrdi u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzaljumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sedišnih zdravstvenih ustanova - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za neurologiju i radiologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija
1031402	L01AX03	temozolomid	TEMAZOL	kapsula tvrd	bočica, 5 po 140 mg	Nepharma S.R.L.; Haupt Pharma Anarag GmbH, Piva Hrvatska d.o.o.	Italija; Nemačka; Hrvatska	22.753,20	-	-	-	Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena. PS 0 ili 1 (ECCO) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno istovremeno sa zračenom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Za podizanje terapije se vrši po utvrdi u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzaljumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sedišnih zdravstvenih ustanova - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za neurologiju i radiologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija
1031403	L01AX03	temozolomid	TEMAZOL	kapsula tvrd	bočica, 5 po 180 mg	Nepharma S.R.L.; Haupt Pharma Anarag GmbH, Piva Hrvatska d.o.o.	Italija; Nemačka; Hrvatska	28.271,80	-	-	-	Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena. PS 0 ili 1 (ECCO) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno istovremeno sa zračenom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Za podizanje terapije se vrši po utvrdi u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzaljumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sedišnih zdravstvenih ustanova - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za neurologiju i radiologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija

JKL	ATC	INN	Zastiteno ime leka	FO	Pakovanje i jacinma leka	Maziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravatelja	Indikacija	Napomena
1031404	L01AX03	temozolomid	TEMOZOL	kapsula tvrda	bočica, 5 po 260 mg	Nepharma S.R.L.; Haupt Pharma Anarag GmbH; Piva Hvala d.o.o.	Italija, Nemačka, Privatska	30.636,80	-	-	-	Globlastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metastaznim statusom: MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno, istovremeno sa zračenom terapijom. Po završetku zračenja, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemoterapije se vrši po uvrtu u MRI ušnjem 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledjećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija
1031430	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula tvrda	kesica 5 po 5 mg	Shering-Plough Labo N.V.	Belgija	1.126,70	-	-	-	Globlastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metastaznim statusom: MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno, istovremeno sa zračenom terapijom. Po završetku zračenja, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemoterapije se vrši po uvrtu u MRI ušnjem 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledjećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija
1031431	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula tvrda	kesica 5 po 20 mg	Shering-Plough Labo N.V.	Belgija	3.147,40	-	-	-	Globlastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metastaznim statusom: MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno, istovremeno sa zračenom terapijom. Po završetku zračenja, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemoterapije se vrši po uvrtu u MRI ušnjem 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledjećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija
1031432	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula tvrda	kesica 5 po 100 mg	Shering-Plough Labo N.V.	Belgija	15.671,20	-	-	-	Globlastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metastaznim statusom: MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno, istovremeno sa zračenom terapijom. Po završetku zračenja, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemoterapije se vrši po uvrtu u MRI ušnjem 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledjećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija
1031433	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula tvrda	kesica 5 po 260 mg	Shering-Plough Labo N.V.	Belgija	30.636,80	-	-	-	Globlastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metastaznim statusom: MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno, istovremeno sa zračenom terapijom. Po završetku zračenja, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemoterapije se vrši po uvrtu u MRI ušnjem 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledjećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zashtiteno ime leka	FD	Pakovanje i jakina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoj lica	Indikacija	Napomena
1014022	L04AX04	lenalidomid	REVLIMID	kapsula tvrd	blistar, 21 po 10 mg	Celgene Europe Limited, Penn Pharmaceuticals Services Limited	Velika Britanija, Velika Britanija	920.940,70	10mg	29.949,56	-	Revimid u kombinaciji sa deksametazonom je indikovana za tretman multiplog mijeloma kod odraslih pacijenata koji su već primili najmanje jednu prethodnu terapiju, kod pacijenata kod kojih se ne može primeniti lečenje sa talidomidom i bortezomibom	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Institut za onkologiju i radiologiju Vojvodine - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojvođinski medicinski akademija
1014024	L04AX04	lenalidomid	REVLIMID	kapsula tvrd	blistar, 21 po 25mg	Celgene Europe Limited, Penn Pharmaceuticals Services Limited	Velike Britanije, Velika Britanija	704.821,50	10mg	13.425,17	-	Revimid u kombinaciji sa deksametazonom je indikovana za tretman multiplog mijeloma kod odraslih pacijenata koji su već primili najmanje jednu prethodnu terapiju, kod pacijenata kod kojih se ne može primeniti lečenje sa talidomidom i bortezomibom	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš - Institut za onkologiju i radiologiju Vojvodine - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojvođinski medicinski akademija
0034413	L01BA04	permetreksed	ALIMTA	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 500 mg	Lilly France	Francuska	97.652,40	-	-	-	Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresekabilna bolest, PS 0 ili 1.	STAC, Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za pulmologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Institut za plućne bolesti Vojvodine - Klinika za plućne bolesti "Križ set" KC Niš - KC Kragujevac - Vojvođinski medicinski akademija
0034412	L01BA04	permetreksed	METREMAX	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100mg	Zdravie AD Lescovac	Republika Srbija	23.762,70	-	-	-	Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresekabilna bolest, PS 0 ili 1.	STAC, Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za pulmologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Institut za plućne bolesti Vojvodine - Klinika za plućne bolesti "Križ set" KC Niš - KC Kragujevac - Vojvođinski medicinski akademija

JKL	ATC	INN	Zastitno ime leka	FO	Pakovanje i jedinica leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034411	L01BA04	pemetreksed	METREMAX	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	boćica staklena, 1 po 500mg	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	84.832.90	-	-	-	Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresekabilna bolest. PS 0 ili 1.	STAC. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara svedeh zdravstvenih ustanova - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za pulmologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Institut za plućne bolesti Vojvodine - Klinika za plućne bolesti „Križ selo“ KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija
0034410	L01BA04	pemetreksed	METREMAX	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	boćica staklena, 1 po 1000mg	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	154.772.80	-	-	-	Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresekabilna bolest. PS 0 ili 1.	STAC. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara svedeh zdravstvenih ustanova - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za pulmologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Institut za plućne bolesti Vojvodine - Klinika za plućne bolesti „Križ selo“ KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija
0034667	L01BA04	pemetreksed	MARTXEL	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	boćica staklena, 1 po 500mg	Eriochem S.A	Argentina	84.832.90	-	-	-	Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresekabilna bolest. PS 0 ili 1.	STAC. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara svedeh zdravstvenih ustanova - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za pulmologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Institut za plućne bolesti Vojvodine - Klinika za plućne bolesti „Križ selo“ KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija
0034666	L01BA04	pemetreksed	MARTXEL	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	boćica staklena, 1 po 1000mg	Eriochem S.A	Argentina	23.762.70	-	-	-	Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresekabilna bolest. PS 0 ili 1.	STAC. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara svedeh zdravstvenih ustanova - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za pulmologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Institut za plućne bolesti Vojvodine - Klinika za plućne bolesti „Križ selo“ KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija

Lista C - Lekovi sa posebnim ezimnom izdavanjem

JKL	ATC	INN	Zastrieno ime leka	FD	Pakovanje i jaina leka	Naziv proizvoaia leka	Drzava proizvojni leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko za DDD	Participacija osiguranog tica	Indikacija	Naomena
0033120	L01CD04	cabazitaxel	JEVFINA	koncentrat za rastvor za infuziju	bojica sa koncentratom i bojica za rastvor po 4,5 ml (60 mg/1,5 ml)	Aventis Pharma LTD	Velika Britanija	595,396,10	-	-	-	Kardiovaskularni, metastatski karcinom dojke, terapija posle progresije na terapiju do karcinoma dojke, adjuvantna terapija karcinoma dojke. Lek se primenjuje za predmetnih ili predmetnih.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja Komisije RFZO, a na osnovu misljenja tri lekara slobodnih zdravstvenih ustanova - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za urologiju KC Srbije - KBC Bezznjska Kosa - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija
0033161	L01DB06	idarubicin	ZAVEDOS	infuzat za rastvor za infuziju	1 po 10 mg	Acevis Italy S.P.A.	Italija	12,612,00	-	-	-	Svi oblici akutnih leukemija i limfoblastni limfom.	STAC. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara slobodnih zdravstvenih ustanova - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za onkologiju KC Niš - Onkološki deo Klinika - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za hematologiju KC Vojvodine - Klinika za hematologiju i kliniku imunologiju KC Niš - KC Kragujevac - Institut za zdravstvenu zastitu majke i deteta Srbije "Dr Vukun Cuiic" - Institut za zdravstvenu zastitu dece i omladine Vojvodine - Klinika za deje interne bolesti KC Niš - Vojnomedicinska akademija
0014140	L01XC02	infliximab	MABTHERA	koncentrat za rastvor za infuziju	bojica 2 po 10 ml (100 mg/10 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	51,409,20	-	-	-	1. Metastatski limfomi, CD20 pozitivni, radikalni, difuzni limfocitarni, neovisni od terapije, koji su rezistentni na terapiju (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CB16, CB17, CB18, CB19, CB20) pozitivni, CD20 pozitivni, postoperativni, fokalni, neovisni od terapije i recidivni limfomi (CB2). 2. Reumatoidni artritis (MDS i MDS) - rukuimati u kombinaciji sa metotreksatom 3. Reumatoidni artritis (MDS i MDS) - rukuimati u kombinaciji sa metotreksatom 4. Uvod se u terapiju ukoliko su spajana oba kriterijuma i to: a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajuci kliniki odgovor ili poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili postoje elementi nepodnošljivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) i b) posle šest meseci od početka primene prethodnog biološkog leka nije postignut adekvatan kliniki odgovor ili poboljšanje (umajenje DAS28 skora za najmanje 1,2). Ukoliko je započeto lečenje makrolimom, neposredno je terapijske cikluse ponavljati tri sesti meseci ili nakon dužeg perioda, u zavisnosti od stanja bolesnika i broja limfocita u perifernoj krvi. 5. Primena limfocitna leukemija: a) u akutnu imunohepatitisa (RFC) b) u akutnu imunohepatitisa (RFC) c) u akutnu imunohepatitisa (RFC) d) u akutnu imunohepatitisa (RFC) e) ako je relaps nakon primene imunohemoterapijskog protokola RFC. f) ako je relaps nakon primene imunohemoterapije nastao nakon više od 24 meseca može se ponoviti terapija prve linije. g) ako nije primenjen u prvoj terapijskoj liniji a planira se primena u kombinaciji sa RFC - ako je nakon imunohemoterapije RFC ostao do relapsa nakon manje od 24 meseca ukoliko klinički instituciji vodiči podrzumevaju primenu R sa nekim drugim hemioterapijskim agensima različitim nego u prvoj liniji.	

JKL	ATC	INN	Zastitno ime leka	FO	Pakovanje i jacinna leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Načrtovana
0014141	L01XC02	4ftukimab	MABTHERA	Koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 ml (500 mg/50 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	126.929,20	-	-	-	<p>1. Maligni limfomi, CD20 pozitivni, podtip: difuzni kruptocitni novodijagnostikovani uz hemoterapiju (CB3.1; CB3.3; CB3.8; CB3.9).</p> <p>2. Maligni limfomi, CD20 pozitivni, podtip: folikularni, novodijagnostikovani u recidiv bolesti (CB2).</p> <p>3. Reumatoidni artritis (M05) - rasklapani u kombinaciji sa metotreksatom uvođi se u terapiju ukoliko su ispunjena oba kriterijuma i to:</p> <p>a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (DMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 u više ili postoje elementi nepodnosivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (DMTB); i</p> <p>b) postoje znakovi od početka primene prethodnih terapijskih lekova nije postignut adekvatan klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2.</p> <p>Ukoliko je zadovoljena jedna od ovih kriterijuma, terapijske odluke treba proučavati na šest meseci ili nakon dužeg perioda, u zavisnosti od vrsta bolesti i vrsta limfocita u perifernoj krvi.</p> <p>4. Hronična infektivna leukemija:</p> <p>a) prva linija;</p> <p>- u okviru imunohemoterapijskog protokola RFC;</p> <p>ili druga linija;</p> <p>- ako je relaps nakon primene imunohemoterapije nastao nakon više od 24 meseca može se ponoviti terapija prve linije;</p> <p>- ako nije primenjen u prvoj terapijskoj liniji a planira se primena u kombinaciji sa FC;</p> <p>- ako je nakon imunohemoterapije RFC uspešno do relapsa nakon manje od 24 meseca uzorkom akutni infektivni rodovi podrucimaju primenu R sa nekim od sledećih kombinacija: rituksimab, rituksimab i bendamustin, rituksimab i bendamustin u kombinaciji sa rituksimabom, rituksimab i bendamustin u kombinaciji sa rituksimabom i bendamustinom.</p> <p>a) adjuvantna hemoterapija - kao nastavak adjuvantne hemoterapije antiraciklinska kao monoterapija ili u kombinaciji sa taksaninom do ukupno 12 meseci kod nodus pozitivnih pacijenata i nodus negativnih pacijenata sa tumorom većim od 10 mm (u slučaju postojanja kontraindikacija za antiracikline, rituksimab kombinovati sa neantiraciklinskim režimima);</p> <p>b) metabolička bolest, PS 0 ili 1, prva linija posle antiraciklinske terapije, u kombinaciji sa baksanimom, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsutvu progresije bolesti;</p> <p>c) lokalno uznapredovali karcinomi dojke: primena Herceptina u kombinaciji sa baksanskim hemioterapijama, a nakon prethodne selektivne primene antiraciklinske terapije, u kombinaciji sa baksanimom, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsutvu progresije bolesti.</p> <p>Kod ove grupe nastavak primene Herceptina u adjuvantnom tretmanu, nakon operacije, do ukupno godinu dana, racunavaju i primenu Herceptina u preadjuvantnom prispuhu.</p>	<p>STAC: Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara svedskih zdravstvenih ustanova i lekara svedskih zdravstvenih ustanova za onkologiju i radiologiju Srbije.</p> <p>- Klinika za hematologiju KC Srbije;</p> <p>- KBC Bežanijska Kosa;</p> <p>- Institut za onkologiju i radiologiju Vojvodine;</p> <p>- Institut za onkologiju KC NE;</p> <p>- Klinika za hematologiju i infektivnu imunologiju KC Niš;</p> <p>- Klinika za onkologiju KC NE;</p> <p>- KC Kragujevac;</p> <p>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Ćupić“;</p> <p>- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine;</p> <p>- Klinika za dece interne bolesti KC Niš;</p> <p>- Vojvođevska akademija;</p> <p>- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara svedskih zdravstvenih ustanova i lekara svedskih zdravstvenih ustanova za onkologiju i radiologiju Srbije.</p> <p>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije;</p> <p>- KBC Bežanijska Kosa;</p> <p>- Institut za onkologiju i radiologiju Vojvodine;</p> <p>- Institut za onkologiju KC NE;</p> <p>- KC Kragujevac;</p> <p>- Vojvođevska akademija u kombinaciji sa stručnjacima iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa</p>
0039345	L01XC03	trastuzumab	HERCEPTIN	prašak i rastvor za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvorom, 1 po 20 ml (440 mg/20 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	179.224,70	-	-	-	<p>Karcinom dojke, HER2 prekomerna ekspresija (IHH 3a ili CISH+)</p> <p>a) adjuvantna hemoterapija - kao nastavak adjuvantne hemoterapije antiraciklinska kao monoterapija ili u kombinaciji sa taksaninom do ukupno 12 meseci kod nodus pozitivnih pacijenata i nodus negativnih pacijenata sa tumorom većim od 10 mm (u slučaju postojanja kontraindikacija za antiracikline, rituksimab kombinovati sa neantiraciklinskim režimima);</p> <p>b) metabolička bolest, PS 0 ili 1, prva linija posle antiraciklinske terapije, u kombinaciji sa baksanimom, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsutvu progresije bolesti;</p> <p>c) lokalno uznapredovali karcinomi dojke: primena Herceptina u kombinaciji sa baksanskim hemioterapijama, a nakon prethodne selektivne primene antiraciklinske terapije, u kombinaciji sa baksanimom, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsutvu progresije bolesti.</p> <p>Kod ove grupe nastavak primene Herceptina u adjuvantnom tretmanu, nakon operacije, do ukupno godinu dana, racunavaju i primenu Herceptina u preadjuvantnom prispuhu.</p>	<p>STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara svedskih zdravstvenih ustanova i lekara svedskih zdravstvenih ustanova za onkologiju i radiologiju Srbije.</p> <p>- Institut za onkologiju i radiologiju Vojvodine;</p> <p>- Institut za onkologiju KC NE;</p> <p>- Klinika za onkologiju KC NE;</p> <p>- KC Kragujevac;</p> <p>- Vojvođevska akademija u kombinaciji sa stručnjacima iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa</p>
0039346	L01XC03	trastuzumab	HERCEPTIN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (600mg/5ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	161.302,30	-	-	-	<p>Karcinom dojke, HER2 prekomerna ekspresija (IHH 3a ili CISH+)</p> <p>a) adjuvantna hemoterapija - kao nastavak adjuvantne hemoterapije antiraciklinska kao monoterapija ili u kombinaciji sa taksaninom do ukupno 12 meseci kod nodus pozitivnih pacijenata i nodus negativnih pacijenata sa tumorom većim od 10 mm (u slučaju postojanja kontraindikacija za antiracikline, rituksimab kombinovati sa neantiraciklinskim režimima);</p> <p>b) metabolička bolest, PS 0 ili 1, prva linija posle antiraciklinske terapije, u kombinaciji sa baksanimom, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsutvu progresije bolesti;</p> <p>c) lokalno uznapredovali karcinomi dojke: primena Herceptina u kombinaciji sa baksanskim hemioterapijama, a nakon prethodne selektivne primene antiraciklinske terapije, u kombinaciji sa baksanimom, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsutvu progresije bolesti.</p> <p>Kod ove grupe nastavak primene Herceptina u adjuvantnom tretmanu, nakon operacije, do ukupno godinu dana, racunavaju i primenu Herceptina u preadjuvantnom prispuhu.</p>	<p>STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara svedskih zdravstvenih ustanova i lekara svedskih zdravstvenih ustanova za onkologiju i radiologiju Srbije.</p> <p>- Institut za onkologiju i radiologiju Vojvodine;</p> <p>- Institut za onkologiju KC NE;</p> <p>- Klinika za onkologiju KC NE;</p> <p>- KC Kragujevac;</p> <p>- Vojvođevska akademija u kombinaciji sa stručnjacima iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa</p>



Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštitno ime leka	FG	Pakovanje i jčina leka	Naziv proizvoača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog tika	Indikacija	Napomena
0039153	L01XC08	eributinab	ERBITUX	masvor za infuziju	boćica saćekena I po 20 ml (5 mg/ml)	Merck KGaA	Nemačka	20.081,80	-	-	-	1. Karcinom kolorektuma: metastatska bolest, posle hemiterapije na bazi oksaliplatinne i irinotekana, iskljuivo za pacijente sa tumorima koji sadrže nemulikatni KRas gen. PS 0 ili 1, kao monoterapije ili u kombinaciji sa irinotekanom; a) istovremeno sa radioterapijom kod pacijenata sa PS 0 ili 1 u lokalno avansnom, inoperabilnom plinocelularnom karcinomu usne duplje i orofarinksa, kada koji je lečenje započeto maksimolnom hemiterapijom; b) lokalno uznapredoval, inoperabilna bolest u kombinaciji sa radioterapijom; c) u kombinaciji sa standardnom hemiterapijom (5FU-lektinom ili SFL) kao dodatnom linijom za rekurentni plinocelularni karcinom glave i vrata koji nije poduban za lokoregionalni tretman, bez egzulceracije. PS 0-1.	STAC: Za indikaciju podtaćkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja in lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vgvodine - KC Niš, - Vojnomedicinska akademija - KC Kragujevac. Za indikaciju pod taćkom 2. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija
0035401	L01XC07	bevacizumab	AVASTIN	konzentrat za masvor za infuziju	boćica I po 4 ml (100 mg/4 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	31.660,30	-	-	-	1. Karcinom kolorektuma: potencijalno resektabilna metastatska bolest, dominantno u jetri, kliniki stadijum IVa, prva linija sistemske terapije, u kombinaciji sa irinotekanom, a u drugu liniju sistemske terapije, u kombinaciji sa irinotekanom i FOLFOX-4, u oboje u cilju poboljšanja odgovornogusa; 2. Avastin uz standardnu hemiterapiju karboplatinom i paklitakselom za ovanjajne karcinome FIGO stadijuma IIIc (suboptimalno operisani i inoperabilni) i FIGO stadijuma IV, karcinome jajnika, primarne peritonealne karcinome, za pacijentkinje drugog opšteg stapija PS 0-1, bez značajnih komorbiditeta i bez infiltracije crevnih vjuga (C55; C57; C48).	STAC: Za indikaciju podtaćkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja in lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vgvodine - KC Niš, - Vojnomedicinska akademija - KC Kragujevac. Za indikaciju pod taćkom 2. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija
0039400	L01XC07	bevacizumab	AVASTIN	konzentrat za masvor za infuziju	boćica I po 16 ml (400 mg/16 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	129.799,20	-	-	-	1. Karcinom kolorektuma: potencijalno resektabilna metastatska bolest, dominantno u jetri, kliniki stadijum IVa, prva linija sistemske terapije, u kombinaciji sa irinotekanom, a u koliku se postigne resektabilnost metastaza i odgovornogusa operacija isli, u postoperativno ukupno maksimalno 10 ciklusa; 2. Avastin uz standardnu hemiterapiju karboplatinom i paklitakselom za ovanjajne karcinome FIGO stadijuma IIIc (suboptimalno operisani i inoperabilni) i FIGO stadijuma IV, karcinome jajnika, primarne peritonealne karcinome, za pacijentkinje drugog opšteg stapija PS 0-1, bez značajnih komorbiditeta i bez infiltracije crevnih vjuga (C55; C57; C48).	STAC: Za indikaciju podtaćkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja in lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vgvodine - KC Niš, - Vojnomedicinska akademija - KC Kragujevac. Za indikaciju pod taćkom 2. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija

JKL	ATC	JMN	Zastuženo ime leka	FO	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039595	L01XC08	panitumumab	VECTIBIX	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5ml (20mg/ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	43.423,80	-	-	-	Karcinom kolorektuma: metastatska bolest, posle hemioterapije na bazi oksaliplatinne i irinotekana, isključivo za pacijente sa tumorima koji sadrže nemutirani KRas gen, PS 0 ili 1, kao monoterapija.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja in lekara sledićih zdravstvenih ustanova: - Klinika za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Institut za onkologiju Vojvodine - KC Niš - KC Kragujevac; - Vojnomedicinska akademija
0014400	L01XC12	brentuximab vesolín	ADCETRIS	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50mg	Takeda Italia S.P.A.	Italija	391.875,40	-	-	-	Lečenje odraslih bolesnika sa relapsom ili rekurentnim CD30 pozitivnim Hodgkin limfomom (C81.0-C81.4) 1, nakon autologe transplantacije malinih ćelija hematozoze ili 2, nakon najmanje dva prethodna ciklusa lečenja kod bolesnika, kod kojih je autologa transplantacija kontraindikovana.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja in lekara sledićih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju Vojvodine - Institut za hematologiju i kimiju imunologiju KC Niš - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac; - Vojnomedicinska akademija
00395402	L01XC18	pembrolizumab	KEYTRUDA	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 mg	Schering Plough Labs N.V.	Belgija	202.099,00	-	-	-	Lečenje uznapredovalog inereskabilnog ili metastatskog, melanoma odraslih koji nemaju BRAF mutaciju, kao monoterapija PS 0-1 (C43)	Odobrava se oimena četiri ciklusa lečenja, nakon čega je obavezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocene stepena tumorskog odgovora i ponovljiviost lečenja. Nastavak lečenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na sprovedeno lečenje (kompletna ili delimična remisija stabilna bolest), do progresije bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja in lekara sledićih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac; - Vojnomedicinska akademija

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	JNN	Zastiteno ime leka	PD	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039384	L01XE01	imatmb	ANZOVIP	film tableta	blister, 120 po 100 mg	Zdravje s.d.	Republika Srbija	98.572,80	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom (t(11;22) (q23;q34) BCR-ABL1) sa potrebni reorganizacijom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti. P.S.0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Univerzitetska dečja klinika - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac; - Institut za decu i omladnu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukun Čupić“. Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac; - Institut za decu i omladnu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukun Čupić“. - Vojnomedicinska akademija
1039385	L01XE01	imatmb	ANZOVIP	film tableta	brster, 30 po 400 mg	Zdravje s.d.	Republika Srbija	98.772,10	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom (t(11;22) (q23;q34) BCR-ABL1) sa potrebni reorganizacijom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti. P.S.0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Univerzitetska dečja klinika - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac; - Institut za decu i omladnu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukun Čupić“. - Vojnomedicinska akademija Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac; - Institut za decu i omladnu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukun Čupić“. - Vojnomedicinska akademija

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštitno ime leka	FG	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Nagometa
1039394	L01XE01	imatinib	ALYOTINIB	film tableta	blister, 120 po 100 mg	Alvogon Pharma d.o.o., Pharmabox Healthcare Ltd, Remedica Ltd	Republika Srbija, Malt, Njara	99,572.80	-	-	-	1. Lešnje pacijenta sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom u ili sa boravir rezistencijom, u svim fazama bolesti kao monoterapiji ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti. PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa. - Univerzitetska dečja klinika. - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Imunologija KC Niš. - KC Kragujevac. - Institut za dečju onkologiju, Vojvodine, Klinika za hematologiju KC Niš. - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i dečeta Srebe, Dr Vuklan Čupić. - Vojnomedicinska akademija. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija.
1039397	L01XE01	imatinib	ALYOTINIB	film tableta	blister, 30 po 400 mg	Alvogon Pharma d.o.o., Pharmabox Healthcare Ltd, Remedica Ltd	Republika Srbija, Malt, Njara	98,772.10	-	-	-	1. Lešnje pacijenta sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom u ili sa boravir rezistencijom, u svim fazama bolesti kao monoterapiji ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti. PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa. - Univerzitetska dečja klinika. - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Imunologija KC Niš. - KC Kragujevac. - Institut za dečju onkologiju, Vojvodine, Klinika za hematologiju KC Niš. - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i dečeta Srebe, Dr Vuklan Čupić. - Vojnomedicinska akademija. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastiteno ime leka	FC	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Nagomana
1039992	L01XE01	imatimb	IMATINIB PHARMASWISS	film tableta	blister, 120 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	99.572,80	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom ili sa bcr-abl rearranžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali i metastabilni oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Univerzitetška dečja klinika - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Imunologija KC Niš - Klinika za hematologiju i hematitizu KC Kragujevac. - Institut za decu i omladinu Vojvodine. - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš. - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukobratović" - Vojnomedicinska akademija Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija
1039988	L01XE01	imatimb	IMATINIB PHARMASWISS	film tableta	blister, 30 po 400 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	98.772,10	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom ili sa bcr-abl rearranžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali i metastabilni oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Univerzitetška dečja klinika - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Imunologija KC Niš - Klinika za hematologiju i hematitizu KC Kragujevac. - Institut za decu i omladinu Vojvodine. - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš. - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukobratović" - Vojnomedicinska akademija Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštitno ime leka	FG	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Nagometa
1033300	L01XE01	imatinib	ANZOVP	kapsula i tablete	blister 120 po 100 mg	Zdravlje s.d.	Republika Srbija	99,572.80	-	-	-	1. Ležanje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom u ili sa boravi razmatranom, u svim fazama bolesti kao monoterapiji ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - totalno uznapredovali i neoperabilni ili metastatski oblik bolesti. PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Univerzitetska dečja klinika - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Imunologija KC Niš - KC Kragujevac. Indikacija za deca i omladinu Vojvodine: - Klinika za hematologiju KC Niš. Indikacija za deca i omladinu KC Niš, Kragujevac i Beograd: - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srpje, Dr Vuklan Čupić. - Vojnomedicinska akademija. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija.
10339006	L01XE01	imatinib	MEAXIN	film tablete	60 po 100 mg	Krka, trgovina zdravila d.d	Slovenija	49,766.40	-	-	-	1. Ležanje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom u ili sa boravi razmatranom, u svim fazama bolesti kao monoterapiji ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - totalno uznapredovali i neoperabilni ili metastatski oblik bolesti. PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Univerzitetska dečja klinika - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Imunologija KC Niš - KC Kragujevac. Indikacija za deca i omladinu Vojvodine: - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srpje, Dr Vuklan Čupić. - Vojnomedicinska akademija. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastiteno ime leka	FC	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Nagomana
1039007	L01XE01	imatinib	MEAXIN	film tablete	120 po 100 mg	Krika, tovama zdravil d.d	Slovenija	99.572,80	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom ili sa bcr-abl rearrizacijom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali metastabilni oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Univerzitetška dečja klinika - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Imunologija KC Niš - Klinika za hematologiju i hematitizaciju KC Kragujevac. - Institut za decu i omladinu Vojvodine. - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš. - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukobratović" - Vojnomedicinska akademija Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za onkologiju i radiologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija
1039366	L01XE01	imatinib	MEAXIN	film tablete	30 po 400 mg	Krika, tovama zdravil d.d	Slovenija	98.772,10	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom ili sa bcr-abl rearrizacijom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali metastabilni oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Univerzitetška dečja klinika - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Imunologija KC Niš - Klinika za hematologiju i hematitizaciju KC Kragujevac. - Institut za decu i omladinu Vojvodine. - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš. - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukobratović" - Vojnomedicinska akademija Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za onkologiju i radiologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštitno ime leka	FG	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Nagometa
1033960	L01XE01	imatinib	IMAREM	film tableta	blister, 120 po 100 mg	Remedica Ltd.	Kipar	99,572.80	-	-	-	1. Lešnje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom u ili sa borbom rezistencijom, u svim fazama bolesti kao monoterapiji ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali i neoperabilni ili metastatski oblik bolesti. PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa. - Univerzitetska dečja klinika. - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Imunologija KC Niš. - KC Kragujevac. - Institut za dečju onkologiju, Vojvodine, Klinika za hematologiju KC Niš. - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i dečeta Srbije, Dr Vuklan Čupić. - Vojnomedicinska akademija. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija.
1033981	L01XE01	imatinib	IMAREM	film tableta	blister, 30 po 400 mg	Remedica Ltd.	Kipar	98,772.10	-	-	-	1. Lešnje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom u ili sa borbom rezistencijom, u svim fazama bolesti kao monoterapiji ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali i neoperabilni ili metastatski oblik bolesti. PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa. - Univerzitetska dečja klinika. - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Imunologija KC Niš. - KC Kragujevac. - Institut za dečju onkologiju, Vojvodine, Klinika za hematologiju KC Niš. - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i dečeta Srbije, Dr Vuklan Čupić. - Vojnomedicinska akademija. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija.



Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastiteno ime leka	FC	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Nagomana
1039388	L01XE01	imatinib	PLUVATINIB	film tableta	blister, 120 po 100 mg	Piva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	99.572,80	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom ili sa bcr-abl rearranžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali metastabilni oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Univerzitetška dečja klinika - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Imunologija KC Niš - Klinika za hematologiju i hematitizaciju KC Kragujevac - Institut za decu i omladinu Vojvodine - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukobratović" - Vojnomedicinska akademija Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za onkologiju i radiologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija
1039386	L01XE01	imatinib	PLUVATINIB	film tableta	blister, 60 po 100mg	Piva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	49.786,40	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom ili sa bcr-abl rearranžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali metastabilni oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Univerzitetška dečja klinika - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Imunologija KC Niš - KC Kragujevac - Institut za decu i omladinu Vojvodine - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukobratović" - Vojnomedicinska akademija Za indikaciju pod tačkom 2, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za onkologiju i radiologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš - KC Kragujevac - Vojnomedicinska akademija

JML	ATC	INN	Zaštitno ime leka	FO	Flakovanje i/ili leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039387	L01XE01	irinatib	PLIVATINIB	film tableta	bister, 30 po 400mg	Prva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	98.772,10	-	-	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom ili sa brzom odgovorajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastrointestinalni stromalni tumor) - ikinino uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti. PS 0 ili 1	Za indicaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije. - KBC Bežanijska Kosa - Ustav za kliničku onkologiju KC Srbije. - Klinika za hematologiju KC Vojvodine. - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Institut za decu i omladnu Vojvodine. - Klinika za obej interne bolesti KC Niš. - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“. - Vojnomedicinska akademija. Za indicaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. - Klinika za onkologiju i radiologiju KC Srbije. - KBC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Niš. - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija
1039398	L01XE02	grrfinib	IRESSA	film tableta	30 po 250 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	223.969,80	-	-	-	Medicinskijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TKI). PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. - Klinika za pulmologiju KC Srbije. - Institut za plućne bolesti Vojvodine. - Klinika za plućne bolesti „Križ selo“ KC Niš. - KBC Bežanijska Kosa. - Vojnomedicinska akademija.
1039402	L01XE03	tesatinib	TARCEVA	film tableta	bister, 30 po 25 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	47.462,40	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemsikog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1. Kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana znakajna toksičnost. 2. Neastrocitijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TKI). PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. - Klinika za pulmologiju KC Srbije. - Institut za plućne bolesti Vojvodine. - Klinika za plućne bolesti „Križ selo“ KC Niš. - KBC Bežanijska Kosa. - Vojnomedicinska akademija.



Lista C - Lekovi sa posebnim ezamnom izdavanjem

JKL	ATC	INN	Zastiteno ime leka	FO	Pakovanje i jakina leka	Maziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog	Indikacija	Napomena
1039403	L01XE03	erlotinib	TARCEVA	film tableta	blister, 30 po 100 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	163.701,90	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskeg lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost 2. Nestručnijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TKI, PS 0 ili 1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti, Vojvodine Niš - Klinika za plućne bolesti, Križ seio KC Vojvodine Niš - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija
1039404	L01XE03	erlotinib	TARCEVA	film tableta	blister, 30 po 150 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	197.386,00	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskeg lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost 2. Nestručnijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TKI, PS 0 ili 1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti, Vojvodine Niš - Klinika za plućne bolesti, Križ seio KC Vojvodine Niš - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija
1039703	L01XE04	sunitinib	SUTENT	kapsula, tvrda	blister, 28 po 12,5 mg	Pfizer Italia S R L	Italija	119.857,90	-	-	-	Lokalno odmakli ili metastatski karcinom bubreznih celija (svetloćeljske podtip), kod bolesnika dobre ili umerenije prognize sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskeg lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za urologiju KCS - Institut za onkologiju Vojvodine Niš - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija
1039704	L01XE04	sunitinib	SUTENT	kapsula, tvrda	blister, 28 po 25 mg	Pfizer Italia S R L	Italija	236.563,90	-	-	-	Lokalno odmakli ili metastatski karcinom bubreznih celija (svetloćeljske podtip), kod bolesnika dobre ili umerenije prognize sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskeg lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za urologiju KCS - Institut za onkologiju Vojvodine Niš - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija
1039706	L01XE04	sunitinib	SUTENT	kapsula, tvrda	blister, 28 po 50 mg	Pfizer Italia S R L	Italija	476.744,90	-	-	-	Lokalno odmakli ili metastatski karcinom bubreznih celija (svetloćeljske podtip), kod bolesnika dobre ili umerenije prognize sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskeg lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za urologiju KCS - Institut za onkologiju Vojvodine Niš - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija

JKL	ATC	INN	Zastitno ime leka	FO	Pakovanje i jčina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguravatelica	Indikacija	Napomena
1039151	L01XE05	scatenib	MEKAVAR	FO	blister, 112 po 200 mg	Bayer Pharma AG Leverkusen, Bayer Healthcare manufacturing	Nemačka, Italija	371.954,80	-	-	-	Lečenje primarnog karcinoma jetre (HCC) kod pacijenata sa lokalno odmaklim ili metastatskom bolešću gde nije bilo moguće primeniti hirurško rni bilo koje druge lokalno sistemske terapije (BCLC C), ili je ovo lečenje bilo neuspješno (BCLC B), a pacijenti su sa obnavljanim jetrinom funkcijom (Child-Pugh A) i u dobrom performans statusu (PS 0-1) (C22.0).	Odobrava se primena terapije za 2 meseca, nakon čega se sprovodi provera efikasnosti terapije. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije. - Klinika za gastroenterologiju KC Bežanijska Kosa. - Institut za onkologiju Vojvodine. - Klinika za onkologiju KC Nis, - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija
1039715	L01XE07	lapatinib	TYVERB		boca, 70 po 250 mg	Glaxo Wellcome Operations, Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija, Španija	126.220,80	-	-	-	Karcinom dojke - druga linija metastatskog HER2 pozitivnog karcinoma dojke, u kombinaciji sa lekom kapetabin, kod pacijenata sa progresivom osuovne bolesti PS 0-1, prethodno lešenih antineoplastičnim ili laksonimnim lekom trastuzumab, koji je primenjen u prvotnoj lečenju metastatske bolesti.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. - KBC Bežanijska Kosa. - Klinika za onkologiju KC Nis. - Klinika za onkologiju Vojvodine - KC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija uz učesće stručnjaka za oblast karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
1039710	L01XE08	nilotinib	TASI/GNA		blister, 112 po 200 mg	Novartis Pharma Stem AG	Švajcarska	582.989,30	-	-	-	Duga terapijska linija kod odraslih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom (CML) u neotorentnih na bar jednu prethodnu terapiju, uključujući imatinib mesilat.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije - KBC Bežanijska Kosa. - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i limfodu patologiju KC Nis. - Vojnomedicinska akademija
1039252	L01XE11	ipozabonib	VOTRIENT		bocića, 30 po 200mg	Glaxo Wellcome S.A., Glaxo Wellcome Operations	Španija, Velika Britanija	74.689,00	-	-	-	Lokalno odmakli ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (veliceljski podtip), kod bolesnika dobre ili umerene prognize sa PS 0 ili 1, u prvotnoj sisternskoj terapiji.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. - Klinika za urologiju KCS - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Nis, - Vojnomedicinska akademija.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastićeno ime leka	FG	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog tica	Indikacija	Napomena
1039253	L01XE13	afatinib	VOTRIENT	film tableta	boćica 60 po 400mg	Glaxo Wellcome S.A.; Glaxo Wellcome Operations	Spanija / Velika Britanija	269.986,00	-	-	-	Lokalno otkriveni ili metastatski karcinom bubregnih ćelija (sveloceljski podtip) kod bolesnika dobre ili umerenja prognize sa PS 0 ili 1, u prvotnoj sistemskeg lećenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO a na osnovu mišljenja lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za urologiju KCS - Institut za onkologiju Vojvodine - Klinika za onkologiju KC Niš - Vojnomedicinska akademija
1039276	L01XE13	afatinib	GIOTRIF	film tableta	blister, 28 po 20mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG	Nemačka	207.196,90	-	-	-	Neutilisabilni karcinom pluća u stadijumu IIb i IV u prvotnoj liniji lećenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO a na osnovu mišljenja lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za pulmonologiju KCS - Institut za plućne bolesti Vojvodine - Klinika za plućne bolesti „Križ selo“ KC Niš - KBC Bežanijska Kosa - Vojnomedicinska akademija
1039277	L01XE13	afatinib	GIOTRIF	film tableta	blister, 28 po 30mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG	Nemačka	207.196,90	-	-	-	Neutilisabilni karcinom pluća u stadijumu IIb i IV u prvotnoj liniji lećenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO a na osnovu mišljenja lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za pulmonologiju KCS - Institut za plućne bolesti Vojvodine - Klinika za plućne bolesti „Križ selo“ KC Niš - KBC Bežanijska Kosa - Vojnomedicinska akademija
1039278	L01XE13	afatinib	GIOTRIF	film tableta	blister, 28 po 40mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG	Nemačka	207.196,90	-	-	-	Neutilisabilni karcinom pluća u stadijumu IIb i IV u prvotnoj liniji lećenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO a na osnovu mišljenja lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za pulmonologiju KCS - Institut za plućne bolesti Vojvodine - Klinika za plućne bolesti „Križ selo“ KC Niš - KBC Bežanijska Kosa - Vojnomedicinska akademija
1039279	L01XE13	afatinib	GIOTRIF	film tableta	blister, 28 po 50mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG	Nemačka	207.196,90	-	-	-	Neutilisabilni karcinom pluća u stadijumu IIb i IV u prvotnoj liniji lećenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO a na osnovu mišljenja lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Klinika za pulmonologiju KCS - Institut za plućne bolesti Vojvodine - Klinika za plućne bolesti „Križ selo“ KC Niš - KBC Bežanijska Kosa - Vojnomedicinska akademija

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Pakovanje i jedna leka	Naziv proizvođača leka	Država poreklom leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039152	L01XE15	venurafenib	ZELBORAF	film tableta	bister, 56 po 240mg	Roché S.P.A	Italija	230.835,70	-	-	-	Monoterapija u primarnom sistemskom lečenju metastatski sa uznapredovalim ili metastatskim BRAF pozitivnim melanomom kod PS 0-1 (C43).	<p>Odobrava se primena ova ciklusa lečenja. Inicijalno lečenje je obavezno klinički ispitano u okviru kliničkih studija. U nastavku lečenja treba uzeti u obzir moguću nuspojavu. Nastavak lečenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na sprovedeno lečenje (kompletna ili delimična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti.</p> <p>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa</li> <li>- KBC Kragujevac</li> <li>- KBC Kragujevac</li> <li>- Vojnomedicinska akademija</li> </ul>
1039249	L01XE18	ruksolimb	JAKAVI	tableta	bister, 56 po 5mg	Novartis Pharma Stem AG	Švajcarska	186.980,70	-	-	-	<p>1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skorom pripadaju podgrupuama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4).</p> <p>2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksureom (D47.4)</p>	<p>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju KC Srbije</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa</li> <li>- Klinika za hematologiju KC Vojvodine</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš</li> <li>- KC Kragujevac</li> <li>- Vojnomedicinska akademija</li> </ul>
1039250	L01XE18	ruksolimb	JAKAVI	tableta	bister, 56 po 15mg	Novartis Pharma Stem AG	Švajcarska	376.988,30	-	-	-	<p>1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skorom pripadaju podgrupuama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4).</p> <p>2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksureom (D47.4)</p>	<p>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju KC Srbije</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa</li> <li>- Klinika za hematologiju KC Vojvodine</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš</li> <li>- KC Kragujevac</li> <li>- Vojnomedicinska akademija</li> </ul>
1039251	L01XE18	ruksolimb	JAKAVI	tableta	bister, 56 po 20mg	Novartis Pharma Stem AG	Švajcarska	376.988,30	-	-	-	<p>1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skorom pripadaju podgrupuama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4).</p> <p>2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksureom (D47.4)</p>	<p>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju KC Srbije</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa</li> <li>- Klinika za hematologiju KC Vojvodine</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš</li> <li>- KC Kragujevac</li> <li>- Vojnomedicinska akademija</li> </ul>

Lista C - Lekovi sa posebnim eznamom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastiteno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranoog lica	Indikacija	Napomena
T08Y140	L01XX14	iratinib	VESANDID	kapsula, meka	bočica staklena, 100 po 10 mg	Celgene; Cellegipham Arzneimittel GmbH	Francuska; Nemačka	30.874,40	-	-	-	Akutna mijeloidna leukemija, podtip akutna promijelocitna leukemija.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ili lekara specijalnih zdravstvenih ustanova - Klinika za hematologiju KC Srbije; - Odsjek za hematologiju i kliničku imunologiju KC Vojvodine; - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš; - KC Kragujevac; - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Dr. Vukan Ćupić; - Institut za obću i omladnu Vojvodine; - Klinika za obće interne bolesti KC Niš; - KBC Bežanijska Kosa; - Vojnomedicinska akademija
0039100	L01XX32	bortezomib	VELCADE	pršak za rasvor za injekciju	1 po 3,5 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	69.655,70	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvotnoj terapijskoj liniji kod visoko riziknih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnošćama visokog rizika /del 13, t(4, 14), t(14, 14), t(14, 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivnu bolest uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije EFZO, a na osnovu mišljenja ili lekara specijalnih zdravstvenih ustanova - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije; - Klinika za hematologiju KC Srbije; - KBC Bežanijska Kosa; - Institut za onkologiju Vojvodine; - Klinika za hematologiju KC Vojvodine; - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš; - Klinika za onkologiju KC Niš; - KC Kragujevac; - Vojnomedicinska akademija
0039101	L01XX32	bortezomib	VELCADE	pršak za rasvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	19.615,90	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvotnoj terapijskoj liniji kod visoko riziknih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnošćama visokog rizika /del 13, t(4, 14), t(14, 14), t(14, 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivnu bolest uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije EFZO, a na osnovu mišljenja ili lekara specijalnih zdravstvenih ustanova - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije; - Klinika za hematologiju KC Srbije; - KBC Bežanijska Kosa; - Institut za onkologiju Vojvodine; - Klinika za hematologiju KC Vojvodine; - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš; - Klinika za onkologiju KC Niš; - KC Kragujevac; - Vojnomedicinska akademija
0039108	L01XX32	bortezomib	BORTEZOMIB ADCC	pršak za rasvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5mg	S.C. Sinoden-Pharma S.R.L.	Rumunija	69.655,70	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvotnoj terapijskoj liniji kod visoko riziknih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnošćama visokog rizika /del 13, t(4, 14), t(14, 14), t(14, 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivnu bolest uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije EFZO, a na osnovu mišljenja ili lekara specijalnih zdravstvenih ustanova - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije; - Klinika za hematologiju KC Srbije; - KBC Bežanijska Kosa; - Institut za onkologiju Vojvodine; - Klinika za hematologiju KC Vojvodine; - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš; - Klinika za onkologiju KC Niš; - KC Kragujevac; - Vojnomedicinska akademija

JKL	ATC	INN	Zastuđeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Ime proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0033666	L01XX32	bortezomib	BORTEZOMIB	prášak za rastvor za injekciju	bočica sadrži 1 po 3.5 mg	Zorinje AD Leksvoac	Republika Srbija	69.655,70	-	-	-	<p>Multipli mijenomi</p> <p>at u prvoj terapijskoj liniji kod visoko nizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili otrogenskim abnormalnoštrna visokog rizika Adel 13, 14, 14, 14, 16/17, 17 ili sa nizikom od tromboembolijskih komplikacija:</p> <p>b) u recidivni bolesti uz odsustvo znakacije penferne polineuropatije (WHO step 2-4).</p>	<p>STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije;</li> <li>- Klinika za hematologiju KC Srbije;</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa;</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine;</li> <li>- Klinika za hematologiju KC Vojvodine;</li> <li>- Klinika za hematologiju i hematologiju KC Niš;</li> <li>- Klinika za onkologiju KC Niš;</li> <li>- KC Kragujevac;</li> <li>- Vojnomedicinska akademija</li> </ul>
1033602	L02BB04	etazulamid	XTANID	kapsula, meka	bister, 112 po 40 mg	Astellis Pharma Europe B.V.	Holandija	336.448,10	160mg	12.016,00	-	<p>Katraziono-vezasesteni metastatski karcinom prostate, terapija posle progresije na hormoterapiju docetaxelom, kod pacijenata sa PS 0-2 (GS1).</p>	<p>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije;</li> <li>- Klinika za urologiju KC Srbije;</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa;</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine;</li> <li>- Klinika za onkologiju KC Niš;</li> <li>- KC Kragujevac;</li> <li>- Vojnomedicinska akademija.</li> </ul>
1033603	L02BX03	abirateron	ZYTIGA	tableta	boica, 120 po 250 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	345.660,40	1g	11.652,01	-	<p>Katraziono-vezasesteni metastatski karcinom prostate, terapija posle progresije na hormoterapiju docetaxelom, kod pacijenata sa PS 0-2 (GS1).</p> <p>Lek se primenjuje sa prednizonom ili prednizolonom.</p>	<p>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije;</li> <li>- Klinika za urologiju KC Srbije;</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa;</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine;</li> <li>- Klinika za onkologiju KC Niš;</li> <li>- KC Kragujevac;</li> <li>- Vojnomedicinska akademija.</li> </ul>
0033604	L03AB07	interferon beta 1a	REBIF	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcionim špric sa iglom, 12 po 0,5 ml (44 mg/0,5 ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	89.621,10	-	-	-	<p>Multipia skleroza</p>	<p>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.</p>
0033605	L03AB07	interferon beta-1b	REBIF	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcionim špric sa iglom, 12 po 0,5 ml (22 mg/0,5 ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	80.661,20	-	-	-	<p>Multipia skleroza</p>	<p>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.</p>
0033606	L03AB07	interferon beta 1a	AVONEX	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcionim špric, 4 po 0,5 ml (30 mg/0,5 ml)	Biogen Idec Denmark Manufacturing AGS	Danska	72.887,80	4,3 mcg	2.604,85	-	<p>Multipia skleroza</p>	<p>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.</p>
0033607	L03AB09	interferon beta 1b	BETAIFERON	prášak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 15 po 1,2 ml (250 mcg/ml)	Bayer Pharma AG	Nemačka	84.173,10	4 ml	2.338,14	-	<p>Multipia skleroza</p>	<p>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.</p>



Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastitešno ime leka	FG	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0228630	L03AB10	peginterferon alfa 2b	PEGINTRON	prašak i rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0.5 ml (50 mcg/0.5 ml)	Schering Plough Company	Iska	8.441,30	7.5 mcg	1.266,20	-	<p>1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. virusološki profil:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkratke 6 meseci,</li> <li>- pozitivan HCV RНК i određeni genotip virusa;</li> </ul> </li> <li>b. biohemijski nalaz:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili</li> <li>- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;</li> </ul> </li> <li>c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekonflamatorna aktivnost sa ili bez fibroze);</li> <li>d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a isporučuju sevele bolesti koji apstiniraju od i.v. droga, alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdnu neuropsihijatrijsku dijagnozu;</li> <li>e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga, alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatrijske dijagnoze;</li> <li>f. isključito bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanim terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Vremena se proveravaju 24. i 72. nedelje od završetka lečenja.</li> </ul> <p>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.</p>	
0228631	L03AB10	peginterferon alfa 2b	PEGINTRON	prašak i rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0.5 ml (80 mcg/0.5 ml)	Schering Plough Company	Iska	13.463,30	7.5 mcg	1.262,30	-	<p>1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. virusološki profil:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkratke 6 meseci</li> <li>- pozitivan HCV RНК i određeni genotip virusa;</li> </ul> </li> <li>b. biohemijski nalaz:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili</li> <li>- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;</li> </ul> </li> <li>c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekonflamatorna aktivnost sa ili bez fibroze);</li> <li>d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a isporučuju sevele bolesti koji apstiniraju od i.v. droga, alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatrijske dijagnoze;</li> <li>e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga, alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatrijske dijagnoze;</li> <li>f. isključito bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanim terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Vremena se proveravaju 24. i 72. nedelje od završetka lečenja.</li> </ul> <p>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.</p>	



Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastiteno ime leka	FO	Pakovanje i jedna leka	Naзив произвођача leka	Država proizvoђilje leka	Cena lekana veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0328900	L03AB10	peginterferon alfa 2b	PEGINTRON	prafek i rastvor za injekciju	pen sa ulaskom, 1 po 0.5 ml (100 mcg/0.5 ml)	Schering Plough Company	Iska	17,059.00	7.5 mcg	1,279.43	-	<p>1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane vrusom hepatitis C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. vrusološki proti:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozitivan HCV RНК I određeni genotip vrusa,</li> </ul> </li> <li>b. histološki dokazane aktivnosti transaminaza ili fibroza, ili</li> <li>- sa fibrozom, bez površene aktivnosti transaminaza</li> <li>c. histološki dokazane hronično zapaljenje jetre (nekonflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza)</li> <li>d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;</li> <li>e. bolesnici koji apsistiraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 1.2 meseci uz potvrdu neuropshijatrije/fiziijara;</li> <li>f. isključio bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju peglivanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokoli i kriterijuma za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitis i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih vrusom hepatitis C (HCV) kombinovanim terapijom peglivanim interferonom alfa i ribavirinom). Trajanje terapije zavisi od genotipa vrusa kao i od terapijske odgovornosti koje se procenava u 12, 14, 24. nedelji lečenja. Utenjia se proverava za 172. nedelje od završetka lečenja.</li> </ul>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0328632	L03AB10	peginterferon alfa 2b	PEGINTRON	prafek i rastvor za injekciju	pen sa ulaskom, 1 po 0.5 ml (120 mcg/0.5 ml)	Schering Plough Company	Iska	19,948.10	7.5 mcg	1,246.76	-	<p>1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane vrusom hepatitis C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. vrusološki proti:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozitivan HCV RНК I određeni genotip vrusa,</li> </ul> </li> <li>b. histološki dokazane aktivnosti transaminaza ili fibroza, ili</li> <li>- sa fibrozom, bez površene aktivnosti transaminaza;</li> <li>c. histološki dokazane hronično zapaljenje jetre (nekonflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza)</li> <li>d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;</li> <li>e. bolesnici koji apsistiraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 1.2 meseci uz potvrdu neuropshijatrije/fiziijara;</li> <li>f. isključio bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju peglivanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokoli i kriterijuma za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitis i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih vrusom hepatitis C (HCV) kombinovanim terapijom peglivanim interferonom alfa i ribavirinom). Trajanje terapije zavisi od genotipa vrusa kao i od terapijske odgovornosti koje se procenava u 12, 14, 24. nedelji lečenja. Utenjia se proverava za 172. nedelje od završetka lečenja.</li> </ul>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštiteno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0128633	L03AB10	peginterferon alfa-2b	PEGASIFRON	prašak i rastvor za injekciju	pen sa uleskom, 1 po 0.5 ml (150 mcg/0.5 ml)	Schering Plough Company	Iskva	25.792.10	7.5 mcg	1.289.61	-	1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkratkije 6 meseci. - pozitivan HCV RНК u određenim genotip virusa. b. biotemijski naizak: - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza. c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekoinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroze) kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije a ispunjavaju sve ostale uslove. e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga, alkohola, najmanje 12 meseci uz putovnu neupishijatu/bishijatu. f. isključito bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokoli, prena kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Vremena se proverava 24, 172. nedelje od završetka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO
0128607	L03AB11	peginterferon alfa-2a	PEGASYS	rastvor za injekciju u napunjenom špricu sa iglom	napunjen injektor špric sa iglom, 1 po 0.5 ml (135 mcg/0.5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	13.382.70	26 mcg	2.579.33	-	1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkratkije 6 meseci. - pozitivan HCV RНК u određenim genotip virusa. b. biotemijski naizak: - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza. c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekoinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroze). d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije a ispunjavaju sve ostale uslove. e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz putovnu neupishijatu/bishijatu. f. isključito bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokoli, prena kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Vremena se proverava 24, 172. nedelje od završetka lečenja. 2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je: a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci; b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT) povišena >2.5 odnosno >100 IU/ml); c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze; d. vremena (HBV-DNK) ≤ 10 <sup>7</sup> kopija/ml kvi.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO

JKL	ATC	INN	Zastitno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Načomena
0028608	L03AB11 2a	peginterferon alfa-2a	PEGASYS	razvor za injekciju u nepunjenom injeksionom špricu	napunjen injeksion špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (100 mg) i 3 ml (150 mg) i 5 ml (250 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	17.856,90	28 mg	2.579,33	-	<p>1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ošteće jetre, uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>virusološki profil:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- anti HCV antitela pozitivna u serumu najzadnje 6 meseci</li> <li>- pozitivan HCV RНК i određen genotip virusa;</li> </ul> </li> <li>biohemijski nalaz:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili</li> <li>- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;</li> </ul> </li> <li>histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekonklatmatima aktivnost sa ili bez fibroze);</li> <li>bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije a ispunjavaju sve ostale uslove:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- bolesnici koji opstaju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropatološkog nalaza</li> <li>- i. uključiti bolesnike sa prethodnim kontraindikacijama na terapiju peglisonom interferonom i ribavirinom. Terapijski protokoli prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ošteće jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (peglisonom interferonom alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Vrenjila se proverava 24 i 72. nedelje od završetka lečenja.</li> </ul> </li> </ol> <p>2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci;</li> <li>повишена активност алуминиотрансферазе (ALT) повишена &gt; 2,5 односно &gt; 100 (U/ml);</li> <li>hronični hepatitis B, sa ili bez fibroze;</li> <li>vremija (HBV DNA) &gt; 10 Kopija/ml krvi.</li> </ol>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0028604	L03AB11 2a	peginterferon alfa-2a	PEGASYS	razvor za injekciju u peni sa uškom ml (135 mg) i 0,5 ml (135 mg) i 0,5 ml (135 mg) i 0,5 ml (135 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	13.952,70	28 mg	2.579,33	-	-	<p>1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ošteće jetre, uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>virusološki profil:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- anti HCV antitela pozitivna u serumu najzadnje 6 meseci</li> <li>- pozitivan HCV RНК i određen genotip virusa;</li> </ul> </li> <li>biohemijski nalaz:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili</li> <li>- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;</li> </ul> </li> <li>histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekonklatmatima aktivnost sa ili bez fibroze);</li> <li>bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije a ispunjavaju sve ostale uslove:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- bolesnici koji opstaju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropatološkog nalaza</li> <li>- i. uključiti bolesnike sa prethodnim kontraindikacijama na terapiju peglisonom interferonom i ribavirinom. Terapijski protokoli prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ošteće jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (peglisonom interferonom alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Vrenjila se proverava 24 i 72. nedelje od završetka lečenja.</li> </ul> </li> </ol> <p>2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci;</li> <li>повишена активност алуминиотрансферазе (ALT) повишена &gt; 2,5 односно &gt; 100 (U/ml);</li> <li>hronični hepatitis B, sa ili bez fibroze;</li> <li>vremija (HBV DNA) &gt; 10 Kopija/ml krvi.</li> </ol>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	JMN	Zaštićeno ime leka	FG	Pakovanje / jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0128603	L03AB11	peginterferon alfa-2a	PEGASYS	rastvor za injekciju u peni sa ulskom	peni sa ulskom, 1 po 0.5 ml (180 mcg/0.5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	16.138,40	20 mg	2.330,81	-	<p>1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane oboje jetre, uzrokovane virusom hepatitis C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>anti HCV antitela pozitivna u serumu najmanje 6 meseci.</li> <li>RNA HCV u nedeljen genotip virusa.</li> <li>biohemijski napor.</li> <li>bez fibroze, povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom, bez povišene aktivnosti transaminaza.</li> </ol> <p>c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroze).</p> <p>d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;</p> <p>e. bolesnici koji apsistiraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdni neuropshijatrijskihilar;</p> <p>f. isključio bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanih interferonima i ribavirinom. Terapijski protokol, prema kriterijumima za lečenje hroničnog zapaljenja jetre (hroničnog hepatitis C (HCV) hronični obojeni terapijom pegilovanim interferonom i ribavirinom. Peginterferon alfa-2a (PegASYS) treba da se koristi u kombinaciji sa ribavirinom u skladu sa sledećim kriterijumima:</p> <p>1. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci;</li> <li>повишена активност аланинаминотрансфераза (ALT) повišена &gt;2,5 односно &lt;math&gt;ULmI&lt;/math&gt;);</li> <li>hronični hepatitis, sa ili bez fibroze;</li> <li>vremena (HBV-DNK) &lt;math&gt;\le 10^7&lt;/math&gt; kopija/ml kcu.</li> </ol>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0015120	L03AX13	gabiramer acetat	COPAXONE	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom špricu	napunjen injekcionim špicom, 28 po 1 ml (20 mg/ml)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	Israel; Holandija	76.561,30	20 mg	2.735,40	-	<p>Multipla skleroza</p>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0015110	L03AX13	gabiramer acetat	COPAXONE	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom špricu	napunjen injekcionim špicom, 14 po 1ml (40mg/ml)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	Holandija	81.782,20	20 mg	3.823,43	-	<p>Multipla skleroza</p>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0015121	L03AX16	plenthsator	MOZOBIL	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 1,2ml; 20mg/ml	Genzyme Limited	Velika Britanija	860.209,00	16,8mg	462.146,30	-	<p>1. Kod pacijenata oboljelih od non-Hodgkin limfoma ili multiplog mijeloma koji su u potpunosti odgovorili na terapiju, uključujući i multiplu mijelomnu celiju hematopoeze (proliferacija &lt;math&gt;&gt;2 \times 10^3&lt;/math&gt; CD34+HLA DR+ plazeze mase) (294).</p> <p>2. Kod pacijenata oboljelih od non-Hodgkin limfoma ili multiplog mijeloma kod kojih u toku mobilizacije nakon 5 dana primene G-CSF-a broj matičnih celija hematopoeze u perifernoj krvi nije dostigao odgovarajući nivo koji je potreban za ulazak u proces aferenze (org matičnih celija hematopoeze -&gt;CD34+HLA periferne krvi) ili kod pacijenata koji su prikupili &lt;math&gt;&gt;2 \times 10^5&lt;/math&gt; CD34+ celij/kg u manje od 3 aferenzne postupka u okviru jedne mobilizacije (284).</p>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista hematologije znanstvene ustanove koja obavlja transplantaciju matičnih celija hematopoeze.

Lista C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastitno ime leka	FO	Pakovanje i jacinna leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indicija	Načomena
0014310	L04AB01	etanercept	ENBREL	prepak i reševak za injekciju	bočica sa praskom i napunjen injektorom špic sa iglom, 4 po 1ml (25mg/ml)	Wyeth Pharmaceuticals	Velika Britanija	43.712,30	7 mg	3.059,86	-	1. Juvenilni idiopatski artritis (M06) i to a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i proširen oligoartritis kod dece uzrasta od 2 godine i starijih, kod kojih postoji neodgovarajući odgovor na metotreksat i/ili fizioterapiju i/ili terapiju uz pomoć kortikosteroida; b) psorijatični artritis kod adolescenata i/ili kod dece uzrasta od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na metotreksat ili je dovela do neolerancija na metotreksat; c) artritis povezan sa encefalitom kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na ili kod kojih je dovela do neolerancija na konvencionalnu terapiju. 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor ili poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB. 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca u ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci); b) prisustvo perifernog artritisa i/ili dobiti odgovarajućeg odgovora na primenu najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL) u maksimalnoj preporučenoj dozi, u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci); 4. Psorijadni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije. 5. Pedijatrijska plak psorijaza - liska forma hronične plak psorijaze (PAS) ≥ 10 kila BSA ≥ 10 ili DLQI ≥ 10) kod dece starije od 6 godina i kod adolescenata koji nisu odgovorili ili ne podnose, ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primenjena konvencionalna leka, uključujući fototerapiju, retinoidne, metotreksat i ciklosporin (L40.DL40.3, L40.S4.L40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014312	L04AB01	etanercept	ENBREL	reševak za injekciju u napunjenom injektorom špicu	napunjen injektorom špic sa iglom, 4 po 1 ml (50 mg/ml)	Wyeth Pharmaceuticals	Velika Britanija	87.388,80	7 mg	3.057,84	-	1. Juvenilni idiopatski artritis (M06) i to: a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i proširen oligoartritis kod dece uzrasta od 2 godine i starijih, kod kojih postoji neodgovarajući odgovor na metotreksat i/ili dobiti odgovarajućeg odgovora na primenu najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL) u maksimalnoj preporučenoj dozi, u ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci); b) psorijatični artritis kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na metotreksat ili je dovela do neolerancija na konvencionalnu terapiju. 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor ili poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB. 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca u ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci); b) prisustvo perifernog artritisa i/ili dobiti odgovarajućeg odgovora na primenu najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL) u maksimalnoj preporučenoj dozi, u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci); 4. Psorijadni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije. 5. Pedijatrijska plak psorijaza - liska forma hronične plak psorijaze (PAS) ≥ 10 kila BSA ≥ 10 ili DLQI ≥ 10) kod dece starije od 6 godina i kod adolescenata koji nisu odgovorili ili ne podnose, ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primenjena konvencionalna leka, uključujući fototerapiju, retinoidne, metotreksat i ciklosporin (L40.DL40.3, L40.S4.L40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Lista C - Lekovi sa posebnim eznamom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastiteno ime leka	FC	Pakovanje i jaka leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DOD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog ica	Indikacija	Napomena
0014313	L04AB01	etanercept	ENBREL		pen sa uloškom, 4 po 1 ml (50 mg/ml)	Novartis Pharmaceuticals Corporation	Velika Britanija	87,398 80	7 mg	3,057 84	-	<p>1. Juvenilni idiopatski arnitis (M06) i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) poliartritis (povremi i trajni) i artritis (peripatetički faktor) i prošireni oligoartritis kod dece od 2 godine starosti kod kojih postoje karakterističan odgovor na metotriksat ili dokazana intolerancija na metotriksat;</li> <li>b) ranojavni arnitis kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na metotriksat, ili je dokazana netolerancija na metotriksat;</li> <li>c) arnitis povezan sa encefalitom kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na ili kod kojih je dokazana netolerancija na konvencionalnu terapiju</li> </ul> <p>2. Reumatoidni arnitis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor ili poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.</p> <p>3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prisustvo ili nedostatak odgovarajućeg odgovora na primenu najviše dve nedonekodne antiinfektivne leka (NSAID) u maksimalnoj doznoj formi tokom od po tri meseca (a ukoliko se koristi kombinacija od po tri meseca) u kombinaciji sa ukupnom primenom od po tri meseca (a) prisustvo perifernog arnitis (interfazijalni ili neinterfazijalni) ili neefikasnost ili netolerancija na maksimalnu preporučenu dozu, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);</li> <li>b) prisustvo perifernog arnitis (interfazijalni ili neinterfazijalni) nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAID) u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);</li> </ul> <p>4. Psorijazni arnitis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tj. ili više bolnih zglobova prilikom ova pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;</p> <p>5. Psorijatski plak psorijaza - teška forma kronične plak psorijaze (PASI) &gt; 10 (ili PASI &gt; 10 ili DQ3) kod dece starije od 6 godina i kod adolescenata koji nisu imali odgovarajući odgovor na primenu najviše dve nedonekodne konvencionalne leka, uključujući fototerapiju, retinoidne, metotriksat i ciklosporin (L40 O-L40.3, L40 S-L40.8).</p>	Lek se upotrebljava u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO
0014320	L02AB02	infliximab	REMICADE		bočica, 1 po 100 mg	Janssen Biologics B.V.	Holandija	50,539 40	3,75 mg	1,995 13	-	<p>1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti – inflamatorni tip, sa baz fistula kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima (ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za primenu konvencionalnu terapiju;</p> <p>2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali nezadovoljan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), obostrano koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju;</p> <p>3. Psorijazni arnitis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tj. ili više bolnih zglobova prilikom ova pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;</p> <p>4. Reumatoidni arnitis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tj. ili više bolnih zglobova prilikom ova pregleda u intervalu od po tri meseca) uz prisustvo visoke aktivnosti bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;</p> <p>5. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nedonekodne antiinflamatorna leka (NSAID), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukoliko se koristi kombinacija od po tri meseca) u kombinaciji sa ukupnom primenom od po tri meseca (a) prisustvo perifernog arnitis (interfazijalni ili neinterfazijalni) ili neefikasnost ili netolerancija na maksimalnu preporučenu dozu, u toku od po tri meseca (a ukoliko se koristi kombinacija od po tri meseca) u kombinaciji sa ukupnom primenom od po tri meseca (a) prisustvo perifernog arnitis (interfazijalni ili neinterfazijalni) ili neefikasnost ili netolerancija na maksimalnu preporučenu dozu, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).</li> </ul>	STAC. Lek se upotrebljava u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO

JKL	ATC	INN	Zastitno ime leka	FO	Pakovanje i jacinna leka	Naзив произвођача leka	Država proizvođinje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0014204	L04AB02	infliximab	REMSIMA	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	boćica staklena, 1 po 100 mg	Biotec Services International Limited	Velika Britanija	41,006.50	3,75 mg	1,537.74	-	<p>1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti – inflamatorni tip sa bez fistule kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima (ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za ponovnu konvencionalnu terapiju.</p> <p>2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali nezadovoljan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (S-meakapopirni ili azalopirni), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju.</p> <p>3. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo akutne zglobne bolesti (tj. ili više bolnih zglobnih zglobova prilikom čega pregleda u intervalu od mesec dana) u upkoj primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednom ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci konvencionalne terapije.</p> <p>4. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor, poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.</p> <p>5. Ankirozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:</p> <p>a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo peniternog artitisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAL) u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz subterapiju (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).</p>	STAC: Lek se koristi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFEO.
0014221	L04AB02	infliximab	INFLECTRA	prášak za koncentrat za rastvor za infuziju	boćica staklena, 1 po 100 mg	Hospira Enterprise S.V	Holandija	41,006.50	3,75 mg	1,537.74	-	<p>1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti – inflamatorni tip, sa bez fistule kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima (ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za ponovnu konvencionalnu terapiju.</p> <p>2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali nezadovoljan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (S-meakapopirni ili azalopirni), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju.</p> <p>3. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo akutne zglobne bolesti (tj. ili više bolnih zglobnih zglobova prilikom čega pregleda u intervalu od mesec dana) u upkoj primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednom ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci konvencionalne terapije.</p> <p>4. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor, poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.</p> <p>5. Ankirozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:</p> <p>a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo peniternog artitisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAL) u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz subterapiju (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).</p>	STAC: Lek se koristi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFEO.



Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastupeno ime leka	FO	Flakovanje i jačina leka	Način proizvodnje leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Načarenje
0014202	L04AB04	abatazumab	HUMIRA	reševor za injekciju u napunjenom i nepunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcionim špricom, 2 po 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	Abbvie Biotechnology GmbH	Nemačka	92.279,00	2,9 mg	3.345,14	-	<p>1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) poliartritis (pozitivni ili negativni reumatoidni faktor) kod dece uzrasta od 2 godine i stariji, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili je dokazana neolerancija na metotreksat</li> <li>b) artritis povezan sa entezisom kod pacijenata uzrasta 6 i više godina, koji nisu poduzli odgovarajući odgovor ili koji su intolerantni na konvencionalnu terapiju</li> </ul> <p>2. Reumatoidni artritis (M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignuo odgovarajući klinički odgovor ili poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili oboleli dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.</p> <p>3. Ankilozajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAL) u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili</li> <li>b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAL) u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz subkutanu (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);</li> </ul> <p>4. Spondilni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne bolesti (M07) u toku od po tri meseca uz subkutanu (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci) i intoleranciju ili neefikasnost nakon primene od mesec dana ukupno primene prethodnog lečenja sa najmanje jednom ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;</p> <p>5. Za lešenje teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti (K50), kod pacijenata kod kojih prethodno lešenje kortikosteroidima ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajuć odgovor ili postoji kontraindikacija za ponovnu konvencionalnu terapiju;</p> <p>6. Teški i vrlo teški oblik akutnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (8-metoksipolum ili azaloprim), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju.</p>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014205	L04AB06	glikumab	SIMPONI	reševor za injekciju u napunjenom i nepunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcionim špricom, 1 po 0,5 ml (50 mg/0,5 ml)	Janssen Biologics B.V.	Holandija	89.210,90	1,66 mg	3.293,80	-	<p>1. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (M07) u toku bolnih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana i ukupno primene prethodnog lečenja sa najmanje jednom ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;</p> <p>2. Reumatoidni artritis (M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignuo odgovarajući klinički odgovor ili poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili oboleli dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.</p> <p>3. Ankilozajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAL) u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili</li> <li>b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAL) u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz subkutanu (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);</li> </ul> <p>4. Teški i vrlo teški oblik akutnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (8-metoksipolum ili azaloprim), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju.</p>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

JKL	ATC	INN	Zastiteno ime leka	FC	Pakovanje i jakina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0014400	L04AC07	tocilizumab	ACTEMRA	konzentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)	Roche Pharma AG	Nemačka	14.788,50	20mg	3.697,13	-	1. a) Aktivni sistemski juvenilni aritis (M06.2, M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine, i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAID) i sistemskim kortikosteroidima. b) Juvenilni idiopatski poliaritis pozitivan ili negativan na reumatoidni faktor i prošireni oligoaritis (M06) kod pacijenata starih 2 godine i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju metoteksatom. 2. Reumatoidni aritis (M05, M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajuć klinički odgovor ili poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014401	L04AC07	tocilizumab	ACTEMRA	konzentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (200 mg/10 ml)	Roche Pharma AG	Nemačka	36.964,30	20mg	3.696,43	-	1. a) Aktivni sistemski juvenilni aritis (M06.2, M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine, i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAID) i sistemskim kortikosteroidima. b) Juvenilni idiopatski poliaritis pozitivan ili negativan na reumatoidni faktor i prošireni oligoaritis (M06) kod pacijenata starih 2 godine i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju metoteksatom. 2. Reumatoidni aritis (M05, M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajuć klinički odgovor ili poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014402	L04AC07	tocilizumab	ACTEMRA	konzentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (400 mg/20 ml)	Roche Pharma AG	Nemačka	74.772,20	20mg	3.739,61	-	1. a) Aktivni sistemski juvenilni aritis (M06.2, M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine, i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAID) i sistemskim kortikosteroidima. b) Juvenilni idiopatski poliaritis pozitivan ili negativan na reumatoidni faktor i prošireni oligoaritis (M06) kod pacijenata starih 2 godine i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju metoteksatom. 2. Reumatoidni aritis (M05, M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajuć klinički odgovor ili poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0059102	M05BA03	palindromska kiselina	AREDA	prahak i rastvor za rastvor za infuziju	lebočica sa rastvaračem, 2 po 10 ml (30 mg)	Novartis Pharma AG	Švajcarska	3.427,10	80 mg	3.427,10	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normalizacije tokom narednih šest meseci. 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l. 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja i lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
0059106	M05BA06	ibandronat	BONDRONAT	konzentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 6 mg/6 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	11.496,90	8 mg	11.496,90	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normalizacije tokom narednih šest meseci. 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l. 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja i lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zastitno ime leka	FC	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0059092	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVORONIC	konzentrat za rastvor za infuziju	ampula, 1 po 2 ml (2 mg/2 ml)	Pharmathen S.A.	Grčka	5,294.30	6 mg	15,882.90	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3.0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci. 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
0059093	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVORONIC	konzentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 6 ml (6 mg/6 ml)	Pharmathen S.A.	Grčka	11,486.90	6 mg	11,486.90	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3.0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
0059211	M05BA08	zoletronska kiselina	ZOMETA	prášak za rastvor za infuziju	1 po 4 mg* 5 ml rastvarača	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	5,325.20	4 mg	5,325.20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3.0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
0059222	M05BA08	zoletronska kiselina	ZOLEDRONATE PHARMASWISS	konzentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (4 mg/5 ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5,325.20	4 mg	5,325.20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3.0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
0059290	M05BA08	zoletronska kiselina	ZOLEDRONAT	konzentrat za rastvor za infuziju	1 po 5ml (4mg/5ml)	Avogeen Pharma d.o.o. Sopotnica Pharmazeutika AG	Republika Srbija, Austrija	5,325.20	4mg	5,325.20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3.0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
0059201	M05BA08	zoletronska kiselina	ZOLEDRONAT	konzentrat za rastvor za infuziju	4 po 5ml (4mg/5ml)	Avogeen Pharma d.o.o. Sopotnica Pharmazeutika AG	Republika Srbija, Austrija	21,300.90	4mg	5,325.20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3.0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
0059010	M05BA08	zoletronska kiselina	ZITOMERA	konzentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 5 ml (4mg/5ml)	Acavis Italy S.P.A	Italija	5,325.20	4mg	5,325.20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3.0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
0059011	M05BA08	zoletronska kiselina	ZITOMERA	konzentrat za rastvor za infuziju	bočica, 4 po 5 ml (4mg/5ml)	Acavis Italy S.P.A	Italija	21,300.90	4mg	5,325.20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3.0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
0059012	M05BA08	zoletronska kiselina	ZITOMERA	konzentrat za rastvor za infuziju	bočica, 10 po 5 ml (4mg/5ml)	Acavis Italy S.P.A	Italija	53,252.10	4mg	5,325.21	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3.0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

JKL	ATC	INN	Zastificeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0059202	M05BA08	zoletronska kiselina	ZOLEDRONIC ACID TEVA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5ml (4mg/5ml)	Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company, Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska: Hrvatska	5.325,20	4mg	5.325,20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0059203	M05BA08	zoletronska kiselina	ZOLEDRONIC ACID TEVA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 4 po 5ml (4mg/5ml)	Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company, Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska: Hrvatska	21.300,80	4mg	5.325,20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0059200	M05BA08	zoletronska kiselina	ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 5 ml (4mg/5ml)	Hospira Enterprises B.V.	Holandija	5.325,20	4 mg	5.325,20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0059214	M05BA08	zoletronska kiselina	ZOLEDRONAT SANDOZ	koncentrat za rastvor za infuziju	plastična bočica, 1 po 5ml (4mg/5ml)	Novartis Pharma Stein AG, Ebawe Pharma Lek Farmaceutička družba D.O.	Nemačka: Austrija: Slovenija	5.325,20	4 mg	5.325,20	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1079070	N07XX02	riluzol	RILUTEK	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	14.286,00	0,1 g	509,50	-	1. Amiotrofnia lateralna skleroza -AML (C12.2).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa ili neuropshijatra Klinike za neurologiju KCS kod pacijenata koji nisu respiratorno ugroženi.

## Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
	A				
N002410	A02AB01	aluminium hydroxide	tableta	500 mg	Terapija hiperfosfatemije u lečenju renalne osteopatije kod bolesnika sa hroničnom insuficijencijom bubrega.
N002451	A03BA01	atropine sulfate	injekcija	1 mg/1 ml	
N003822	A11EA..	vitamini B-kompleksa za parenteralnu primenu <sup>o</sup>	injekcija	-	-
N003798	A11JA..	retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol <sup>o</sup>	koncentrat za emulziju za infuziju	10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mg/ml)	Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Infant samo kod dece do 11 godina starosti. STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.
N002709	A12AA02	calcium gluconate	injekcija	10% a 10 ml	
N001016	A12CB01	zinc sulfate	tableta	20 mg	
N001024	A12CC02	magnesium sulfate	infuzija	20% a 100 ml	Wilson-ova bolest
	B				
N003616	B01AB01	heparin	rastvor za injekciju	5000 I.U./0,25 ml	
N001032	B02AA02	traneksaminska kiselina <sup>u</sup>	tableta	500 mg	
N001040	B02AA02	traneksaminska kiselina <sup>u</sup>	injekcija	100 mg/ml	
N002469	B02BX01	etamsylate <sup>o</sup>	injekcija	250 mg/2 ml	
N003772	B05BA01	alanin, arginin, aspartanska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin <sup>o</sup>	injekcija	100ml (6,3g/L+4,1g/L+4,1g/L+1g/L+7,1g/L+2,1g/L+2,1g/L+3,1g/L+7g/L+5,6g/L+1,3g/L+2,7g/L+5,6g/L+3,8g/L+300mg/L+3,6g/L+1,4g/L+500mg/L+3,6g/L)	STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.
N002105	B05BA03	glucose	rastvor za infuziju	50%	
N003624	B05XA01	kalcijum hiond <sup>o</sup>	koncentrat za rastvor za infuziju	1mmol/ml	
N003632	B05XA02	natrijum hidrogenkarbonat <sup>o</sup>	rastvor za infuziju	8,4%	
N003780	B05XC..	askorbinska kiselina, nikotinamid, natrijum-pantotenat, piridoksin, riboflavin, tiamin, folna kiselina, biotin, cijankobalamin <sup>o</sup>	prašak za rastvor za infuziju	10 ml (100mg+40mg+15mg+4mg+3,6mg+2,5mg+0,4mg+60mcg+5mcg)	STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.
	C				
N003855	C01AA05	digoksin <sup>o</sup>	rastvor za injekciju/infuziju	-	
N001065	C01BA01	quinidine sulfat	tableta	200 mg	
N001073	C01BA02	procainamide hydrochloride	injekcija	100 mg/ml	
N002477	C01BC03	propafenon	injekcija	35 mg/10 ml	
N001081	C01CA02	isoprenaline	injekcija	10 mg/5 ml	

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N001099	C01CA03	noradrenalin	injekcija	1 mg/ml	
N001107	C01CA06	phenilephrin	injekcija	10 mg/ml	
N003914	C01CA24	adrenalin hidrohlorid (epinefrin) <sup>0</sup>	rastvor za injekciju	1 mg/ml	
N002683	C01DA02	glyceryl trinitrate <sup>0</sup>	sublingvalna tableta	500 mcg	
N003004	C01DA02	glyceryl trinitrate	rastvor za injekciju	1 mg	
N003038	C01DA02	glyceryl trinitrate	rastvor za infuziju	1 mg	
N003012	C01DA02	glyceryl trinitrate <sup>0</sup>	koncentrat za rastvor za infuziju	5 mg	
N003491	C01DX12	moisidomin <sup>0</sup>	tableta	2 mg	
N003509	C01DX12	moisidomin <sup>0</sup>	tableta	4 mg	Angina pektoris koja ne reaguje na uobicajeno doziranje moisidomina.
N003517	C01DX12	moisidomin <sup>0</sup>	tableta sa produženim oslobađanjem	8 mg	Teška (ozbiljna) angina pektoris koja ne reaguje na uobicajene doze moisidomina.
N002311	C01EA01	alprostadij	injekcija	500 mcg	
N001115	C02DA01	diazoksid	kapsula	25 mg	
N001123	C02DA01	diazoksid	injekcija	15 mg/ml	
N001131	C02DD01	natrijum nitroprusid	injekcija	50 mg	terapija stanja koja se karakterisu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene
N003178	C03CA01	furosemid <sup>0</sup>	tableta	40 mg	
N003186	C03CA01	furosemid <sup>0</sup>	rastvor za injekciju	20 mg/2ml	
N001149	C03DB01	amilionid	tableta	5 mg	
N001156	C04AX02	phenoxybenzamin	kapsula	10 mg	
N001164	C04AX02	phenoxybenzamin	injekcija	50 mg/ml	
N002626	C10AC01	colestyramine	prasad	4 g	
	D				
N002485	D05BA02	methoxsalen	tableta	10 mg	
N003905	D05BB02	acitretin	kapsula	10mg	Psonijaza ( L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.6; L40.9 ). Nije indikovana za lečenje psonasis guttata.
N003913	D05BB02	acitretin	kapsula	25mg	Psonijaza ( L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.6; L40.9 ). Nije indikovana za lečenje psonasis guttata.
	G				
N003863	G02AB01	metilergometrin <sup>0</sup>	rastvor za injekciju	0,1 mg/ml	
N003871	G02AB01	metilergometrin <sup>0</sup>	rastvor za injekciju	0,2 mg/ml	
N002949	G02CB03	cabergolin	tableta	0,5 mg	Tumori hipofize - za osobe koje imaju izražene neželjne efekte na prethodnu terapiju bromokriptinom. Lek se uvodi u terapiju na osnovu konzilijarnog mišljenja tri lekara endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

## Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JACINA LEKA	INDIKACIJE
N003210	G03GB02	klomifen	tableta	50 mg	Za indukciju ovulacije kod anovulatorne i oligoovulatorne neplodnosti kod žena ( N97 ).
N003277	G04BE03	sildenafil <sup>o</sup>	tableta	20 mg	Plućna hipertenzija na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
N001206	H01AA01	corticotrophin-releasing factor-CRF	injekcija	25 IU	
N001214	H01AA02	tetrakozaktid	injekcija	1 mg/ml	
N002493	H01BA02	dezmpresin	injekcija	4 mcg/1ml	
N002501	H01BA02	dezmpresin	injekcija	20 mcg/1ml	
N001222	H01CA01	gonadorelin	injekcija	100 mcg	
N001263	H02AA02	fludrocortizon	tableta	0,1 mg	
N003731	H02AB02	deksametazon	tableta	4 mg	
N002634	H02AB09	hidrokortizon	tablete	10 mg	
N002923	H02AB09	hidrokortizon	prašak za injekciju	100 mg	
N002931	H02AB09	hidrokortizon	prašak za injekciju	500 mg	
N002121	J01BA01	hloramfenikol	injekcija	1000 mg	
N002907	J01CE01	benzilpenicilin <sup>u</sup>	prašak za injekciju	1 MIU	
N002915	J01CE01	benzilpenicilin	prašak za injekciju	5 MIU	
N001289	J01CE08	benzatinbenzilpenicilin	injekcija	1,2 MIU	
N001297	J01CE08	benzatinbenzilpenicilin	injekcija	2,4 MIU	
N001305	J01CF02	cloxacilin	injekcija	500 mg	
N003806	J01CR01	ampicilin, subkamtam	prašak za rastvor za injekciju	1000 mg + 500 mg	
N001313	J01EC02	sulfadiazin	tableta	500 mg	
N001321	J01FA01	eritromicin	injekcija	1000 mg	
N002865	J01GA01	streptomycin sulfat	prašak za injekciju	1 g	Tube/kuloza (A15)
N002139	J01GB04	kanamicin	injekcija	1000 mg	
N003657	J02AA01	amfotericin B	rastvor za infuziju (lipidni kompleks)	50 mg	
N003665	J02AA01	amfotericin B	rastvor za infuziju (lipidni kompleks)	100 mg	
N002733	J02AA01	amfotericin B	rastvor za infuziju	50 mg	
N001339	J02AA01	amfotericin B (sa liposomima)	injekcija	50 mg	
N002147	J04AA01	p - aminosalicilic acid	tableta	500 mg	
N002154	J04AA01	p - aminosalicilic acid	granula	4 g	
N002162	J04AB01	cycloserine	kapsula ili tableta	250 mg	
N002329	J04AB02	rifampicin	kapsula ili tableta	150 mg	

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JACINA LEKA	INDIKACIJE
N002170	J04AB30	capreomycin	injekcija	1000 mg	
N002337	J04AC01	izoniazid	tableta	100 mg	
N002519	J04AC01	izoniazid	tableta	300 mg	
N002188	J04AD03	ethionamide	tableta	125 mg	
N002196	J04AD03	ethionamide	tableta	250 mg	
N001347	J04AK01	pyrazinamide	tableta	400 mg	
N001354	J04AK02	etambutol	tableta	400 mg	
N002675	J04BA02	dapsone	tablete	50 mg	
N002741	J05AE03	ritonavir	oralni rastvor	80 mg/ml	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002758	J05AE07	fosamprenavir	oralna suspenzija	50 mg/ml	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002766	J05AE09	tipranavir	oralni rastvor	100 mg/ml	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002774	J05AR10	lopinavir, ritonavir	oralni rastvor	80 mg/ml + 20 mg/ml	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N003020	J05AF01	zidovudin	oralni rastvor	50 mg/5 ml	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.



## Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N002782	J05AF04	stavudin	prašak za oralnu suspenziju	1 mg/ml	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002808	J05AF05	lamivudin	oralni rastvor	10 mg/ml	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002816	J05AF06	abakavir	oralni rastvor	20 mg/ml	HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N001362	J06AA01	diphtheria antitoxin	injekcija	10000 IU	
N002204	J06AA01	diphtheria antitoxin	injekcija	20000 IU	
	L				
N001396	L01AA01	cyclophosphamide	tableta	50 mg	
N002212	L01AA02	florambucil	tableta	2 mg	
N001404	L01AA03	melfalan	injekcija	50 mg	
N002220	L01AA03	melfalan	tableta	2 mg	
N001412	L01AA05	chlormethine(carilofzin)	injekcija	10 mg	
N003699	L01AA09	bendamustin <sup>0</sup>	prašak za rastvor za infuziju	25 mg	Hronična limfocitna leukemija.
N003707	L01AA09	bendamustin <sup>0</sup>	prašak za rastvor za infuziju	100 mg	Hronična limfocitna leukemija.
N002238	L01AB01	busulfan	tableta	2 mg	
N001438	L01AC01	fliotepa	injekcija	15 mg	
N001446	L01AD01	karmustin	injekcija	100 mg	
N001453	L01AD02	lomustin	tableta	40 mg	
N002964	L01AX04	dakarbazin <sup>0</sup>	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	100 mg	
N002972	L01AX04	dakarbazin <sup>0</sup>	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	200 mg	
N002246	L01BB02	merkaptopurin	tableta	50 mg	
N003525	L01BB03	tioguanin	tableta	40 mg	Akutna leukemija, limfoblastni limfom kod dece i odraslih (C91.0; C92.0; C83.5).
N003111	L01BC02	fluorouracil <sup>0</sup>	rastvor za injekciju	50 mg/ml	

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAKINA LEKA	INDIKACIJE
N003129	L01BC02	fluorouracil <sup>0</sup>	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	250 mg/5 ml	
N003137	L01BC02	fluorouracil <sup>0</sup>	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	500 mg/10 ml	
N003152	L01BC02	fluorouracil <sup>0</sup>	rastvor za injekciju/infuziju	1000 mg/20 ml	
N003202	L01BC02	fluorouracil <sup>0</sup>	rastvor za injekciju/infuziju	5000 mg/100 ml	
N003848	L01CA01	vinblastin	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	10 mg/5 ml	
N001479	L01DA01	daktinomycin	injekcija	0,5 mg	
N003487	L01DB07	mitoksantron <sup>0</sup>	koncentrat za rastvor za infuziju	10 mg/5 ml	
N003475	L01DB07	mitoksantron <sup>0</sup>	koncentrat za rastvor za infuziju	20 mg/10 ml	
N002428	L01DC03	mitomicin	prašak za injekciju	1 po 5 mg	
N002527	L01DC03	mitomicin	prašak za injekciju	1 po 10 mg	
N002436	L01DC03	mitomicin	prašak za injekciju	1 po 20 mg	
N001487	L01XB01	procarbazine hydrochloride	kapsula	50 mg	
N001495	L01XX02	l-asparaginase	injekcija	10000 IU	
N001505	L01XX23	mitotane	tableta	500 mg	Karcinom nadbubrežne žlezde
N002253	L02AB02	medroksiprogesteron	tableta	100 mg	
N003608	L03AX03	atenuirani bacili Mycobacterium bovis, soj BCG	prašak za intravezikalni rastvor	-	
N002360	L04AX02	thalidomide	tableta	100 mg	Multipli mijelom
N001511	M01CC01	penicillamine	kapsula	250 mg	Wilson-ova bolest
N003145	M03AC01	pankuronijum	rastvor za injekciju	4 mg/2 ml	
N003285	M03BX01	baclofen	tableta	5 mg	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003283	M03BX01	baclofen	tableta	10 mg	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

## Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003301	M03BX01	baclofen	tableta	25 mg	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003319	M03BX01	baclofen	injekcija	0,05 mg	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003327	M03BX01	baclofen	infuzija	0,05 mg/2 ml	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N001529	M09AA01	quinine dihydrochloride	injekcija	600 mg/2 ml	
N001537	N01AF03	thiopental <sup>u</sup>	injekcija	0,5 g	
N001545	N01AX03	ketarhin	injekcija	50 mg/1 ml	
N001552	N01BB02	lidocain	sprej	10%	
N001560	N01BB52	lidocain, epinephrin	krema	2,50%	
N003749	N02AA01	morfin	tableta sa produženim oslobađanjem	10 mg	Samo za decu.
N003756	N02AA01	morfin	tableta sa produženim oslobađanjem	30 mg	Samo za decu.
N003764	N02AA01	morfin	tableta sa produženim oslobađanjem	60 mg	Samo za decu.
N001610	N03AB02	phenytoin	injekcija	250 mg	
N001628	N03AB02	phenytoin	kapsula ili tableta	25 mg	
N001636	N03AB02	phenytoin	kapsula ili tableta	50 mg	
N001644	N03AB02	phenytoin	kapsula ili tableta	100 mg	
N003921	N03AG01	valprolnska kiselina	injekcija/infuzija	100 mg/ml	Epilepsija na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
N002543	N03AG04	vigabatrin	kapsula	500 mg	

## Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003335	N03AX03	sufitame	tableta	50 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara u zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003343	N03AX03	sufitame	tableta	200 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara u zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003350	N03AX15	zonisamid	orodisperzibilna tableta	25 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara u zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003368	N03AX15	zonisamid	orodisperzibilna tableta	50 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara u zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003376	N03AX15	zonisamid	orodisperzibilna tableta	100mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara u zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003384	N03AX15	zonisamid	orodisperzibilna tableta	300 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara u zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N001677	N05AA02	levomepromazin	tableta	100 mg	

## Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JACINA LEKA	INDIKACIJE
N003689	N05AB02	flufenazin <sup>0</sup>	rastvor za injekciju	25 mg/ml	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
N003079	N05AN01	lijijum karbonat	kapsula	300 mg	
N002956	N05BA09	clobazam	tableta	10 mg	Epilepsija (G40)
N003392	N05BA09	clobazam	tableta	20 mg	Progressivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara u zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003400	N05CC01	chloralhydrate	oralni rastvor	100 mg/ml	Progressivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara u zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003418	N05CC01	chloralhydrate	kapsula	250 mg	Progressivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara u zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003426	N05CC01	chloralhydrate	kapsula	500 mg	Progressivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara u zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003681	N05CD08	midazolam	rastvor za bukalnu primenu	10 mg/ml	Terapija prolongiranih akutnih konvulzivnih napada kod dece starosti od 3 meseca do 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003434	N06BX03	piracetam	oralni rastvor	333mg/ml	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim značajnim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara u zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003442	N06BX03	piracetam	granule	2,4 g	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim značajnim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara u zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N002691	N07AA01	neostigmin	rastvor za injekciju	0,5 mg/ml	
N001669	N07AA01	neostigmin <sup>u</sup>	injekcija	2,5 mg/ml	
	P				
N001685	P01BA01	chloroquine phosphate ili sulphate	tableta	100 mg	
N001683	P01BA01	chloroquine phosphate ili sulphate	tableta	150 mg	
N001701	P01BA01	chloroquine phosphate ili sulphate	tableta	250 mg	
N001719	P01BA02	hydroxychloroquine	tableta	200 mg	
N001727	P01BA03	primaquin diphosphate	tableta	15 mg	
N001735	P01BB01	proguanil hydrochloride	tableta	100 mg	
N001743	P01BC01	quinine bisulfat ili sulfat	tableta	300 mg	
N001750	P01BC02	mefloquine hydrochloride	tableta	250 mg	
N001768	P01BD01	pyrimethamin sulfat	tableta	25 mg	
N001776	P01BE02	artemether	injekcija	80 mg/ml	
N001784	P01BE02	artemether	tableta	20 mg	
N001792	P01BE03	artesunat	tableta	50 mg	
N001800	P02BA01	praziquantel	tableta	150 mg	
N001818	P02BA01	praziquantel	tableta	600 mg	
N002642	P02CA01	mebendazol	tableta	100 mg	
N002659	P02CA03	albendazol	tableta	200 mg	1. Ehinokoza, 2. Cisticerkoza
N001826	P02CB02	diethylcarbamazine dihydrogen citrate	tableta	50 mg	
N002279	P02CB02	diethylcarbamazine dihydrogen citrate	tableta	100 mg	
N001834	P02CF01	ivermectin	tableta	3 mg	
N001842	P02CF01	ivermectin	tableta	6 mg	
N001859	P02DA01	niclosamid	tableta	500 mg	
N002873	P03AX01	benzil benzoate	iosion	25%	
	R				
N001867	R03BB01	ipratropium bromid	ampula za inhalaciju	0,25 mg/1 ml	
N001875	R03CC02	salbutamol	injekcija	1 mg/ml	

## Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003160	R03DA05	aminofilin	rastvor za injekciju/infuziju	250 mg/10 ml	
N003483	R03DA05	aminofilin	rastvor za injekciju/infuziju	240 mg/10 ml	
	S				
N003087	S01EB01	plikarpin <sup>0</sup>	kapi za oči	2%	
N001891	S01EC01	acetazolamide	tableta	250 mg	
N001909	S01EC01	acetazolamide	injekcija	500 mg	
N003095	S01FA01	atropin	kapi za oči, rastvor	0.50%	
N003103	S01FA01	atropin	kapi za oči, rastvor	1%	
	V				
N002535	V03AB	trientine trietilen tetramin-dihlorhid	kapsula	300 mg	Wilson-ova bolest
N003640	V03AB14	protamin <sup>0</sup>	rastvor za injekciju	50 mg/5 ml	
N001917	V03AB15	naloxon hydrochloride	injekcija	0.4 mg/ml	
N001925	V03AC01	deferoxamine mesilat	injekcija	500 mg	
N001933	V03AF01	mesna ( uromiteksan )	injekcija	400 mg	
N002584	V04CD01	metyrapone	kapsula	250 mg	Cushingov sindrom na osnovu mišljenja tri lekara Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS - Beograd.
N001941	V04CJ02	protirelin	injekcija	0.2 mg	
N001958	V04CJ02	protirelin	injekcija	0.4 mg	
N003673	V06BA02	barijum sulfat <sup>0</sup>	suspenzija	1 g/ml	

<sup>0</sup> Lek se nabavlja samo u izuzetnim slučajevima kada snabdevanje lekom istog INN, istog ili srodnog farmaceutskog oblika iste jačine sa Liste A, A1, B ili C ne zadovoljava potrebe u lečenju osiguranih lica RFZO-a.

## LEGENDA I SKRAĆENICE

**\*\*** Rezervni antibiotik propisuje se na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine koje imenuje direktor zdravstvene ustanove uz obavezan potpis načelnika odeljenja i direktora zdravstvene ustanove. Evaluaciju primenjene terapije u pisanoj formi potrebno je uraditi nakon tri dana od strane istih lekara uz obavezan potpis načelnika odeljenja i direktora zdravstvene ustanove nakon uvida u antibiogram.  
 Izuzetno, u hitnim slučajevima dežurni ili odeljenski lekar može uvesti rezervni antibiotik u terapiju, nakon čega je u obavezi da pribavi predhodno navedeni uslov za primenu rezervnog antibiotika.

**STAC** Lekovi sa ovom oznakom priznaju se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu, odnosno bolničku zdravstvenu delatnost.

**STAC\*\*** Lekovi sa ovom oznakom obeležavaju antibiotike koji se priznaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu, odnosno bolničku zdravstvenu delatnost, kao i u toku ambulatnog lečenja pod uslovom da je na opusnoj listi utvrđena dalja terapija ovim lekom.

◊ Lek primenjuju osigurana lica filijala u sledećim zdravstvenim ustanovama:

**1. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za hematologiju KC Srbije, Klinika za urologiju KC Srbije, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa**

- Mačvanski okrug sa sedištem u Šapcu; Kolubarski okrug sa sedištem u Valjevu; Podunavski okrug sa sedištem u Smederevu; Braničevski okrug sa sedištem u Požarevu; Borski okrug sa sedištem u Boru; Zlatiborski okrug sa sedištem u Užicu; Raški okrug sa sedištem u Kraljevu; Moravički okrug sa sedištem u Čačku; Južno-banatski okrug sa sedištem u Pančevu; Grad Beograd,

**2. Klinika za onkologiju KC Niš, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, Klinika za plućne bolesti „Knez Selo” KC Niš**

- Zaječarski okrug sa sedištem u Zaječaru; Rasinski okrug sa sedištem u Kruševcu; Nišavski okrug sa sedištem u Nišu; Toplički okrug sa sedištem u Prokuplju; Pirotski okrug sa sedištem u Pirotu; Jablanički okrug sa sedištem u Leskovcu; Pčinjski okrug sa sedištem u Vranju; Kosovki okrug sa sedištem u Gračanici; Kosovsko-mitrovački okrug sa sedištem u Zvečanu; Kosovsko-pomoravski okrug sa sedištem u Ranilugu,

**3. Institut za onkologiju Vojvodine, Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Klinika za urologiju KC Vojvodine**

- Srednje-banatski okrug sa sedištem u Zrenjaninu; Severno-bački okrug sa sedištem u Subotici; Severno-banatski okrug sa sedištem u Kikindi; Južno-bački okrug sa sedištem u Novom Sadu; Zapadno-bački okrug sa sedištem u Somboru; Sremski okrug sa sedištem u Sremskoj Mitrovici; Južno-banatski okrug sa sedištem u Pančevu,

**4. KC Kragujevac**

- Šumadljski okrug sa sedištem u Kragujevcu; Pomoravski okrug sa sedištem u Jagodini; Zlatiborski okrug sa sedištem u Užicu; Raški okrug sa sedištem u Kraljevu; Moravički okrug sa sedištem u Čačku,

**5. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, Univerzitetska dečja klinika, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečje interne bolesti KC Niš**

- osigurana lica do 18 godina starosti,

**6. Vojnomedicinska akademija**

- Mačvanski okrug sa sedištem u Šapcu; Kolubarski okrug sa sedištem u Valjevu; Podunavski okrug sa sedištem u Smederevu; Braničevski okrug sa sedištem u Požarevu; Borski okrug sa sedištem u Boru; Zlatiborski okrug sa sedištem u Užicu; Raški okrug sa sedištem u Kraljevu; Moravički okrug sa sedištem u Čačku; Južno-banatski okrug sa sedištem u Pančevu; Grad Beograd.”