

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА –ЗАЈЕЧАР
РАСАДНИЧКА 66, 19000 Зајечар
Тел:019/044 35 21

УПУТСТВО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

МЕТОДА:

КАПТОПРИЛ ТЕСТ - ^{99m}Tc - ДТРА

Метода служи за посредну процену евентуалног постојања сужења једне од бубрежних артерија, као могућег узрока повишеног крвног притиска, а преко промене бубрежне функције након примене лека Каптоприла.

Ако сте трудни или у то сумњате - обавестите лекара.

Потребно је са собом понети комплетну медицинску документацију.

Потребно је да из Ваше терапије привремено обуставите унос диуретика (лекова за измокравање) и АЦЕ инхибитора (врсте лекова против повишеног притиска), 3-5 дана, о чему ћете се договорити са надлежним доктором.

Испитивање се изводи у два наврата, током два дана. Може се доручковати и пола сата пре испитивања треба попити око пола литра течности (воде, чаја, сока) у оба дана.

У међувремену мокраћну бешику уредно празнити, а обавезно је испразнити пре почетка снимања у оба дана.

Првог дана испитивање почиње од тренутка када се у вену на руци убризга мала количина радиоактивности Технецијума ^{99m}Tc , којом је обележено једињење ДТРА које се излучује бубрезима.

Испитивање траје око 30 минута и изводи се у лежећем положају на леђима, помоћу гама камере која бубреге снима са задње стран – базална .

Другог дана, сат времена пре снимања биће Вам измерен крвни притисак, након чега ће Вам дати да попијете таблету Каптоприла од 25 милиграма. Накнадно се поново мери притисак, а снимање се изводи око 60 минута по попијеној таблети, на начин као и предходног дана.

Медицински радник ће Вас обавестити када је снимање завршено и када ћете добити Ваш налаз.