

СЛУЖБА НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ –ЗАЈЕЧАР
РАСАДНИЧКА 66, 19000 Зајечар
Тел: 019/44 35 21

УПУТСТВО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

МЕТОДА :

СЦИНТИГРАФИЈА СКЕЛЕТА-^{99m}Tc-DPD

Метода служи за испитивање коштано-зглобног система.

Ако сте трудни или у то сумњате- обавестите лекара.

Потребно је са собом понети комплетну медицинску документацију.

Испитивање се изводи у току једног дана, посебна припрема није потребна, можете доручковати и попити Ваше лекове.

Пацијенти који имају јаке болове треба на време да узму своје лекове против болова.

Пре испитивања ћете у вену на руци добити малу количину радиоактивности,

Технецијум ^{99m}, којим је обележено једињење које се везује за кости..

Због времена потребног да се обележивач накупи у костима, снимање се изводи након 2-4 сата од добијања ињекције.

У времену до снимања, треба попити неколико чаша течности (воде, чаја, сока) за то време пацијент треба да буде у соби за примену радиоактивности.

Непосредно пре снимања: обавезно испразнити мокраћну бешику, обавестите медицинску сестру ако имате катетер, скинути уметке и протезе, испразнити џепове (ситан новац и предмете од метала), скинути каиш, навући каљаче и сачекати медицинску сестру да Вас спреми за снимање.

Снимање се изводи у лежећем положају са предње и задње стране Гама камером и траје око пола сата, по потреби се изводе и додатна снимања.

За време снимања потребно је да лежите мирно на леђима.

Медицински радник ће Вас обавестити, када је снимање завршено и када ћете добити Ваш налаз.

Током 24 часа од испитивања пожељно је избегавати боравак у истој просторији са бебама, малом децом и трудницама, спавати одвојено, користити посебан прибор за јело и не делити храну и пиће са другима. Такође дојење није дозвољено најмање 48 сати од тренутка убризгавања радиофармака